

BERICHTE

des

naturwissenschaftlich - medizinischen

VEREINES

in

INNSBRUCK.

XXIV. Jahrgang 1897/98 und 98/99.



INNSBRUCK.

Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung.

1899.



Druck der Wagner'schen Universitäts-Buchdruckerei.

A. Vereinsnachrichten.

I. Bericht über die im Jahre 1897/98 vom Vereine abgehaltenen Sitzungen.

I. Sitzung am 26. October 1897.

Der Vorstand Herr Prof. C. Heider gedachte in einleitenden Worten des Verlustes, welchen der Verein durch die Berufung des Herrn Prof. Dr. J. Pernter nach Wien erlitten hat und würdigte hiebei eingehend die Verdienste desselben um den Verein.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolles der Jahresversammlung vom 7. Mai d. J. wurden mehrere Vereinsangelegenheiten besprochen und unter Anderem der Antrag des American Museum of Natural History, mit demselben in Tauschverkehr zu treten, angenommen. Neuangemeldet zum Eintritt in den Verein wurde durch den Vorstand Herr Prof. Dr. P. Czermak. Hierauf hielt Prof. Dr. F. Hochstetter seinen angekündigten Vortrag:

„Ueber die Schlagadern des Darmkanals der
Saurier.“

Der Vortragende bespricht, nachdem er in einer kurzen Einleitung über die bei den übrigen Wirbelthieren

IV

dem Darm das Blut zuführenden Schlagadern und deren Ursprung eine Uebersicht gegeben hat, unter Vorweisung kunstvoll ausgeführter Injections-Präparate die höchst merkwürdigen Verhältnisse des Abganges und des Verlaufes der Darmschlagadern, wie sie bei vielen Sauriern so z. B. auch bei der Blindschleiche, beim Chamäleon, bei den Leguanen u. A. vorgefunden werden. Prof. Hochstetter zeigte dabei, wie die complicirten Verhältnisse des gekreuzten Verlaufes der Schlagadern des Darmes und des Magens und die sonderbare Thatsache, dass die Magenarterien aus tieferen Theilen der Aorta entspringen als die den Darm versorgenden, von einfacheren auch bei anderen Wirbelthieren vorkommenden Verhältnissen abgeleitet werden können. Unter Hinweis auf die bei den Embryonen der Blindschleiche bestehenden Verhältnisse macht der Vortragende wahrscheinlich, dass zur Erklärung eine Spaltung der Arterien und eine damit einhergehende Drehung der Spaltungsäste in Betracht zu ziehen sei, sowie auch andere aus den eigenthümlichen Ursprungsverhältnissen der Aorta der Saurier sich ergebende Umstände.

In der Debatte, die sich an den interessanten Vortrag anschloss, fanden die angeregten Fragen und Erklärungen seitens des Herrn Prof. Dr. Heider und des Vortragenden selbst unter besonderem Hinweis auf die Analogien, welche Fische und Säugethiere darbieten, noch nähere Erörterung.

II. Sitzung am 9. November 1897.

Der Vorsitzende berichtet, dass die Rechnungsüberprüfer Hofrath Prof. v. Wieser und Prof. Klemencie die Rechnung über die Geldgebahrung im Vereinsjahre 1896/97 richtig befunden haben. Als Mitglied erscheint aufgenommen: Prof. Dr. Czermak, neu angemeldet zum Ein-

tritte wird: Docent Dr. Lode. Ferner wird vom Vorsitzenden der Dank Prof. Pernter's in Wien für die ihm in der 1. Sitzung gewidmeten Worte zur Kenntnis gebracht. Nun hielt Herr Prof. Dr. J. Müller seinen angekündigten Vortrag

„Ueber das Experiment in den physikalischen Studien der Griechen“.

Der Vortragende wendete sich zunächst gegen den Vorwurf, welchen moderne Forscher den alten Gelehrten machen, dass dieselben das Experiment nicht oder nur sehr unvollständig zur Forschung verwendeten und führte nun unter Angabe der betreffenden Quellen die verschiedenen physikalischen Versuche an, welche von den Griechen seiner Zeit ausgeführt wurden. Zunächst wurden die akustischen Versuche des Pythagoras besprochen, hierauf die Versuche des Archimedes zur Bestimmung des specifischen Gewichtes, die des Aristoteles zum Nachweise der Schwere der Luft erörtert und die Verdienste Euklid's um die Optik, insbesondere um die Gesetze der Reflexion, hervorgehoben. Auch die Refractionerscheinungen wurden von den Alten untersucht, Brenngläser waren bekannt, und wusste man, dass ein eckiges Stück Glas die Farben des Regenbogens hervorruft. Von Lucretius weiss man, dass er Versuche über Magnetismus anstellte. Leider sind in vielen Fällen die Originalarbeiten in Verlust gerathen oder nur Bruchtheile vorhanden, so dass es oft schwer ist, die richtige Deutung für die Versuche zu finden. An den interessanten Vortrag schloss sich eine Debatte, worauf dem Vortragenden der beste Dank der Versammlung für seine Mühewaltung ausgesprochen wurde.

III. Sitzung am 23. November 1897.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Heider spricht die Aufnahme des Doc. Dr. A. Lode in den Verein aus und

theilt mit, dass der in Innsbruck wohnende Entomologe Herr Heinrich Friese die seit 1866 erschienenen Bände des Archiv's der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg dem Verein geschenkt hat. Auf Aufforderung seitens des Vorsitzenden erhebt sich die Versammlung zum Ausdrucke des Dankes für diese wertvolle Schenkung von den Sitzen, und wird der Schriftführer beauftragt, den Dank des Vereines schriftlich zum Ausdrucke zu bringen. Damit die von der gespendeten Zeitschrift ferner erscheinenden Bände auch zur Verfügung stehen, beauftragt der Vorsitzende im Namen des Ausschusses den Austausch der Schriften mit dem Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg einzuleiten, was angenommen wird. Hierauf demonstrierte Prof. Dr. Klemencic einen Vorlesungsversuch

„Ueber Contrastfarben.“

Eine weisse Fläche wird mittelst eines elektrischen Bogenlichtes hell beleuchtet. Bringt man auf die weisse Fläche eine farbige Scheibe, fixiert sie einige Zeit und entfernt sie wieder rasch, so sieht das Auge nun an der Stelle der farbigen Scheibe einen Fleck von der Form der Scheibe jedoch in der complementären Farbe. Nach einer rothen Scheibe, erscheint ein grüner Fleck; nach einer blauen ein gelber u. s. w. Diese Erscheinung bezeichnet man als successiven oder nachfolgenden Contrast. Die Erscheinung des gleichzeitigen oder simultanen Contrasts wurde in folgender Weise gezeigt. In den Kegel des elektrischen Bogenlichts, der auf den weissen Schirm fällt, wird ein Blechring so gestellt, dass er ungefähr in der Mitte des weissen Schirmes einen Schatten erzeugt. Der Schirm wird überdies noch von den gewöhnlichen zur Beleuchtung des Hörsaals dienenden Lichtquellen (Gas oder Glühlicht) beleuchtet; der Ringschatten am Schirm ist infolgedessen nicht schwarz, sondern grau.

Färbt man nun den auf den Schirm fallenden Kegel des Bogenlichts mittelst eines farbigen Glases, so erscheint der Schatten des Ringes in der complementären Farbe. Bei rothem Glase, erscheint der Schatten grün auf rothem Grunde u. s. w. Die Erscheinungen der Contrastfarben erklären sich durch eine Uebermüdung des Auges für die Farbe, welche durch eine längere Zeit auf dasselbe wirkt. Dazu muss man annehmen, dass diese Uebermüdung längere Zeit anhält und dass sie auch auf Partien der Netzhaut übergreift, welche nicht direct vom Licht getroffen werden.

Weiters besprach Prof. Dr. Czermak:

„Einige Aufnahmen aus der Röntgenpraxis“.

Der Vortragende, welcher in Graz durch über ein Jahr viele Röntgenaufnahmen, insbesondere auch an Kranken, gemacht hatte, wollte den Zuhörern eine kleine Uebersicht über den jetzigen Stand der Röntgenpraxis geben. Er stellte sich als Aufgabe 1. die zwei üblichen Methoden der Durchleuchtung des menschlichen Körpers bezüglich ihrer praktischen Verwendbarkeit zu besprechen und 2. zu zeigen, welche Erfolge man mit den jetzigen Hilfsmitteln als Durchschnittsleistung erwarten kann. Er besprach die Vor- und Nachtheile der Beobachtung mit dem Fluoreszenzschirme, welche die bequemere Methode ist, da sie rasch, übersichtlich und leicht zu handhaben ist. Er gab aber trotzdem der zweiten, der photographischen Methode den Vorzug wegen der feinen Details, der Sicherheit des Studiums an dem fertigen Bilde und der Ueberlegenheit durch die grosse Empfindlichkeit. Hierauf erörterte er die Construction der transparenten Schattenbilder und machte aufmerksam auf die Vorsicht, welche bei der Interpretation dieser Bilder geübt werden muss. Er zeigte, dass zur genauen Orientierung über die Lage eines Fremdkörpers oder die Situierung von Fracturen,

eigentlich zwei Schattenbilder, die auf zwei zueinander senkrechten Ebenen entworfen sind, gemacht werden müssen. Er erörterte dann die stereoskopischen Röntgenbilder, welche, durch eine Idee von Prof. Mach in Wien angeregt, von ihm und Prof. Eder in Wien wirklich ausgeführt wurden und im Stande sind die aufgenommenen Objecte räumlich zu zeigen. Hierauf führte er die Originalnegative seiner Aufnahmen vor, unter welchen sich sowohl normale als auch klinische Fälle befanden: Verletzungen durch Fremdkörper, Verrenkungen und Brüche und krankhafte Veränderungen nicht nur an Händen und Füßen, welche die einfachsten und leichtesten Fälle bilden, sondern auch an Becken, am Rumpfe und Kopfe. Er liess auch ein Stereoskop circulieren, welches zwei plastische kleinere Aufnahmen enthielt.

Zum Schlusse der Sitzung demonstrierte Prof. Dr. Hochstetter eine Reihe von nach der Methode von Prof. O. Schultze in Würzburg von seinem Assistenten Herrn A. Greil angefertigten Präparaten. — Dieselben betreffen vollständige Gliedmassen, sowie andere Körpertheile menschlicher Embryonen, die mittelst Kalilauge so durchsichtig gemacht wurden, dass die verknöcherten Theile des Skeletes bei Untersuchung der Objecte im durchfallenden Lichte deutlich wahrgenommen werden können. —

IV. Sitzung am 7. December 1897.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Heider macht zunächst die Mittheilung, dass das hydrographische Amt der k. k. Kriegsmarine in Pola dem Vereine die 4 ersten Hefte seiner Veröffentlichungen geschenkt hat, wofür der Dank ausgesprochen wird. Die Einleitung des Tauschverkehrs wurde nicht für nöthig erachtet, da die Schriften des hydrographischen Amtes bereits in Innsbruck vorhanden

sind. Hierauf hielt Prof. Dr. J. Blaas seinen angekündigten Vortrag

„Ueber Quellen“.

In der Einleitung erörtert der Vortragende das Verhältnis von Geologie und Technik an der Hand eines Vergleiches. Der Chirurg vereint in sich zwei Wissensgebiete, er muss Bau und Lage der Organe und deren pathologische Veränderungen kennen, er muss Anatom sein; er muss aber auch die Kenntnis der Operationsmethoden besitzen und den Heilungsprozess verfolgen und leiten können, er ist „Chirurg“ im engern Sinne. Zur glücklichen Durchführung einer Operation müssen beide Wissensgebiete vereint aufgeboten worden. Die Erde ist ein sehr compliziert gebauter Körper; der Geologe ist der Anatom der Erde. Auch an ihr werden Operationen (im Bergbaue, im Strassen- und Eisenbahnbau, bei der Flussregulierung und Wildbachverbauung, bei der Ausnützung der Wasserkräfte und der Sammlung der Quellen) ausgeführt, deren Bedeutung sich in ihren Kosten ausdrückt. Der Techniker ist der Chirurg der Erde im oben gekennzeichneten, engern Sinne. Sollen die Eingriffe in den Erdkörper erfolgreich gemacht und ohne Schaden durchgeführt werden, so ist auch hier ein Zusammenwirken beider Wissenschaften unerlässlich. Die richtige Erkenntnis dieser Notwendigkeit vermisse man bislang noch vielfach bei Laien und Behörden sowohl, wie auch mitunter beim Techniker. Doch hat sich mehr und mehr die bessere Einsicht Bahn gebrochen. — Der Vortragende beleuchtet sodann an zwei lehrreichen Beispielen den ausserordentlichen Wert des Zusammenwirkens des Technikers und Geologen.

V. Sitzung am 18. Jänner 1898.

Zu Beginn der Sitzung, welche am 18. ds. stattfand, gedachte der Vorsitzende Prof. Dr. Heider des am 15. Dec. v. Js. dahingeshiedenen Prof. A. Zimmerer, der lange Jahre Vereinsmitglied und einige Zeit auch Schriftführer war, worauf die Anwesenden ihre Trauer um den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen kundgaben. Hierauf hielt Prof. Dr. Klemencic einen von hübschen Experimenten begleiteten lehrreichen Vortrag

„Ueber Telegraphie ohne Draht“.

Die erste Idee einer Telegraphie ohne Draht stammt vom englischen Naturforscher James Lindsay her, der schon im Jahre 1857 die Ausbreitung der elektrischen Ströme im Wasser benützen wollte, um Punkte der Meeresküste oder ein Schiff mit der Meeresküste telegraphisch zu verbinden. Die Idee Lindsays hat nicht durchgegriffen; offenbar waren zur selben Zeit noch nicht die empfindlichen Apparate vorhanden, die ein Telegraphieren auf weitere Strecken nach diesem Princip gestattet hätten. Erst viel später (im Jahre 1893) haben die Berliner Physiker Rubens und die Gebrüder Rathenau auf dem Wasser Versuche nach dieser Methode unter Benützung des Telephons als Zeichenempfänger gemacht und dabei insofern gute Resultate erzielt als ihnen thatsächlich eine Verständigung auf die Entfernung von 5 Kilometern gelang. Ausser diesen Versuchen, bei denen das Wasser den zeichengebenden elektrischen Strom zwischen zwei Orten übermittelt, wären als Versuche einer Telegraphie ohne Draht noch jene des Engländers Preece zu erwähnen, welcher inducierte Ströme und ein Telephon benützte. Die Ströme wurden zwischen zwei langen parallelen Leitungen induciert, und es gelang auf diese Weise ebenfalls auf einige Kilometer zu telegraphieren, ohne die beiden Orte mittelst eines Drahts zu verbinden. Die Be-

nützung inducierter Ströme liegt im wesentlichen auch der Erfindung Marconis zu Grunde; nur werden hier die Ströme unter Anwendung Hertz'scher oder Righi'scher Primärerreger induciert. Der Ausgleich der Elektrizität zwischen den beiden Hälften eines solchen Erregers ruft in den umgebenden Leitern selbst auf weite Entfernungen hin eine Gleichgewichtsstörung hervor, welche sich in verschiedener Weise kundgibt. Hertz hat sie bekanntlich mit Hilfe des elektrischen Funkens beobachtet. Ein bequemes Mittel, solche Gleichgewichtsstörungen zu beobachten, haben wir im Coherer, und dieser Apparat bildet in der That den wesentlichsten Bestandtheil der Marconischen Empfängerstation, während ein Rhighi'scher Primärerreger oder Oscillator den Hauptbestandtheil der Senderstation bildet. Ueber den Coherer hat der Vortragende bereits (vor zwei Jahren) im Verein gesprochen. Der Coherer Marconis, bestehend aus Nickel- und Silber-Feilspähnen, welche zwischen zwei Silberelektroden liegen, reagiert so wie jeder andere Coherer auf eine elektrische Erschütterung, indem durch diese zwischen den einzelnen Theilchen eine elektrische Leitung hergestellt wird; eine mechanische Erschütterung hebt die Leitung wieder auf. Marconi hat seinem Coherer eine Empfindlichkeit gegeben, die man bei anderen bisher nicht erreicht hat. Die mechanischen Erschütterungen, welche nach jedem von der Senderstation anlangenden Zeichen nothwendig sind, werden nun hier automatisch mit Hilfe einer Hilfsbatterie, welche auch die ankommenden Zeichen notiert, bewirkt.

Versuche, welche im Hafen von Spezia von der italienischen Marine, sodann von Preece in England und von Slaby bei Potsdam gemacht wurden, haben übereinstimmend ergeben, dass man nach dem Marconischen Verfahren unter günstigen Umständen eine Verständigung bis auf 18—20 Kilometern erzielen kann. Bei starken Ladungen der Luft mit atmosphärischer Elektrizität kann

der Apparat jedoch ganz versagen. Auch grössere Leiter, welche sich zwischen der Empfänger- und Senderstation befinden, können die Verständigung unmöglich machen.

VI. Sitzung am 1. Februar 1898.

Vortrag des Prof. Dr. C. Heider

„Ueber einen merkwürdigen Parasiten aus der Gruppe der Trematoden.“

Der Vortragende bespricht in der Einleitung die neuere Richtung der Zoologie, welche mehr darauf ausgeht die Kenntniss der schon bekannten Thierformen auszugestalten und zu vertiefen, als neue Species zu beschreiben. Die letzte grosse Gelegenheit, merkwürdige neue Thierformen kennen zu lernen, sei bei der Erforschung der Meeres-tiefen und der Tiefseefauna gegeben. Die Challenger-Expedition habe ein unermessliches Material zu Tage gefördert und es seien die ersten einleitenden Schritte zur Erforschung des indischen Oceans vom deutschen Reiche aus gethan. Die zoologische Systematik verfolge jetzt auch mehr den Zweck, die bekannten Formen durch bessere Beschreibungen und übersichtlichere Anordnung festzulegen, als dies bisher geschehen. Diesem Streben trage das von der Deutschen zoologischen Gesellschaft herausgegebene Fundamentalwerk, „Das Thierreich“ Rechnung, welches ein revidiertes Inventar aller bisher bekannt gewordenen, jetzt lebenden thierischen Formen darstellen solle. Auch in Innsbruck seien Mitarbeiter für dieses Unternehmen gewonnen, so vor Allem Prof. v. Dalla Torre, welcher als Redacteur für die Gruppe der Hymenopteren fungiere und Herr Friese, der auch einzelne Partien dieser Gruppe bearbeite.

Der Vortragende schildert sodann den Bau der Saugwürmer (Trematoden) im Allgemeinen, indem er *Distomum lanceolatum* seiner Beschreibung zu Grunde legt. Dann geht er auf die nach mancher Hinsicht merkwürdige und etwas abweichende Gruppe der Holostomidae näher ein und schildert sodann einen Parasiten, der in diese Gruppe gehören dürfte und von Prof. Heller im Magen des Delphins gefunden worden war. Der Parasit, der in vielen Eigenthümlichkeiten von den übrigen, bisher bekannten Trematoden abweicht, dürfte möglicher Weise eine neue Gattung repräsentieren.

VII. Sitzung am 15. Februar 1898.

Prof. Dr. Hammerl hielt einen mit Demonstrationen verbundenen Vortrag

„Ueber Transformatoren.“

In der Einleitung zeigt der Vortragende, dass eine ökonomische elektrische Kraftübertragung nur dann möglich ist, wenn dabei hochgespannte Ströme in Anwendung kommen. Die Transformatoren haben die Aufgabe den hochgespannten Strom in einen derartig niedrig gespannten zu verwandeln, dass er in keiner Weise mehr gefährlich wird und zur Speisung von Glühlampen, Bogenlampen und Elektromotoren dienen kann.

Der Transformator beruht auf der Magneto-Induction, welche dadurch erfolgt, dass eine von einem Wechselstrom durchflossene Spule ein periodisch sich änderndes Kraftlinienfeld erzeugt und die Aenderungen dieses Kraftlinienfeldes in einer zweiten Spule Wechselströme hervorrufen.

Der moderne Wechselstromtransformator besteht aus zwei feststehenden, räumlich von einander getrennten und

XIV

elektrisch von einander isolierten Spulen aus Kupferdraht, die sich zur Verstärkung der magnetischen Strömung auf einem Eisenrahmen befinden. Die eine wird Primärspule, die andere Secundärspule genannt.

Durchfließt der hochgespannte Wechselstrom die Primärspule, so magnetisiert er den Eisenkern in wechselnden Richtungen, die Aenderung dieser magnetischen Strömung ruft auch in der Secundärspule eine Spannung und wenn diese an eine Consumstelle angeschlossen ist einen Strom hervor.

Durch entsprechende Wahl der Windungszahlen ist es möglich die Spannung beliebig umzusetzen oder zu transformieren. Der Transformatör verändert eine gegebene Spannung nach oben oder nach unten, je nachdem seine primäre Windungszahl kleiner oder grösser als die secundäre, oder sein Uebersetzungsverhältnis kleiner oder grösser als Eins ist.

Der Vortragende demonstriert mit einem Transformatör vom Uebersetzungsverhältnis Eins die Vorgänge in der Primärspule bei offenem und geschlossenem secundären Stromkreis, bespricht die sogenannte Leerlaufarbeit des Transformatörs, die Energieverluste, die im Eisen und Kupfer desselben auftreten.

Die wechselnde Magnetisierung eines Eisenkernes erfordert theorethisch keine Energie, es tritt aber doch ein Energieverlust in Form von Wärme auf, welcher durch die magnetische Reibung, Hysteresis genannt, verursacht wird. Ein weiterer Verlust ist die Erwärmung der Eisenmasse durch sogenannte Wirbelströme, die jedoch durch Untertheilung des Eisens möglichst vermieden werden können. Der Eisenkern ist daher nicht massiv, sondern besteht aus dünnen durch Papiereinlagen von einander isolierten Eisenblechen.

Zu diesen Verlusten im Eisen tritt noch der Verlust im Kupfer, welcher in der Erwärmung desselben durch den Strom besteht.

Gut gebaute Transformatoren geben einen secundlichen Wirkungsgrad von 93—97%.

Zum Schlusse transformiert der Vortragende den zur Verfügung stehenden Wechselstrom von 100 Volt mit einem Kilowatt-Transformator auf 1000 Volt, womit er 10 hintereinander geschaltete Glühlampen von je 100 Volt zum Leuchten bringt.

VIII. Sitzung am 22. März 1898.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Heider theilt mit, dass im Einverständnisse mit dem Cassier für Errichtung eines Pasteurdenkmals 10 fl. dem Comité übersendet wurden und ersucht um nachträgliche Genehmigung der Versammlung. Wird genehmigt. Weiters theilt er mit, dass die University of Pennsylvania die Schrift *The Embryology of Crepidula* von E. G. Conklin zum Zwecke des Austausches mit der Vereinzeitschrift eingesendet habe. Es wird beschlossen das letzte Heft der Berichte als Gegen Geschenk einzusenden. Ferner wird die Einleitung des Tauschverkehrs mit der Leitung des botanischen Gartens in Missouri beschlossen. Hierauf hielt Prof. Dr. P. Czermak einen sehr interessanten Vortrag

„Ueber die astronomische Uhr des physikalischen Institutes vom Jahre 1775.“

In demselben wurde das Werk und die Funktionen dieser alten Uhr, welche auf 11 Zifferblättern mit 20 Zeigern die verschiedensten astronomischen und kalendarrischen Daten angibt, mit Hilfe von Zeichnungen und Modellen genau beschrieben und erklärt.

Bezüglich der historischen Daten liess sich auf Grund der eingravirten Inschrift und einiger aufgefundenen Rechnungen feststellen, dass diese Uhr von Pater Aurelius im Augustinerkloster zu Wien anno 1775 construiert und

verfertigt wurde und als Geschenk der Kaiserin Maria Theresia im September 1776 an das physikalische Museum der Universität Innsbruck gelangte. Auf der Reise hieher schien jedoch das Werk gelitten zu haben und konnte trotz öfters vorgenommener Reparaturen nicht in Gang gebracht werden. Der Vortragende hatte sich nun die grosse Mühe genommen diese hoch interessante Uhr wieder in Gang zu bringen, was Prof. Czermak auch vollkommen gelang.

Zum Schlusse der Sitzung demonstrierte Prof. Blaas Versuche, welche von Alsdorf in Saarbrücken angestellt wurden, um die Bildung der sogenannten Mondvulkane zu erklären. Leider gestattete die vorgerückte Zeit nicht näher auf die verschiedenen Ansichten und Erklärungsweisen über die Entstehung der Mondgebirge einzugehen.

IX. Sitzung am 3. Mai 1898.

(Jahresversammlung.)

Vom naturhistorischen Landesmuseum in Klagenfurt ist die Todesanzeige des Hr. Josef Canaval eingelangt, infolge dessen beschlossen wird dem „Museum“ schriftlich das Beileid des Vereines auszudrücken. Es wird der Tauschverkehr beschlossen mit den „Recueil des Memoires et des Travaux publ. p. l. Société botanique de Grand Duché de Luxembourg“ und mit dem „L'Intermédiaire des Biologistes“ in Paris.

Ferner wird beschlossen die Auflage der Berichte von 280 auf 300 zu erhöhen. Der Vorsitzende Prof. Dr. Heider theilt weiters mit, dass die für 1895 von Seite des hoh. Ministeriums f. Cultus und Unterricht in Aussicht gestellten 300 fl. zur Förderung der Herausgabe der Berichte bereits flüssig gemacht sind. Ueber Antrag des Vorsitzenden wird beschlossen dem hoh. Ministerium dafür den Dank auszusprechen und gleichzeitig für die

nächsten 3 Jahre um eine gleiche Subvention anzusuchen. Dem Diener des physikalischen Institutes werden 10 fl. Remuneration bewilligt.

Hierauf erstattet der Schriftführer, Prof. Zehenter, den Jahresbericht, der einen Ueberblick über die stattgefundenen Sitzungen, über den zur Ausgabe gelangten XXIII. Jahrgang der Berichte, über den Personalstand des Vereines und über den gepflogenen Tauschverkehr gab. Es fanden 9 Sitzungen statt, in welchen 12 Vorträge, meist mit Demonstrationen verbunden, gehalten wurden. Der veröffentlichte Bericht enthielt ausser den Versammlungsberichten u. s. w. noch eine Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder betreffend, gehören dem Vereine 4 Ehrenmitglieder und 79 ordentliche Mitglieder an, durch Tod verlor der Verein den einstigen Schriftführer Prof. Zimmerer, durch Versetzung wurden Prof. Pernter und Prof. Lukasiewicz der engern Vereinsthätigkeit entzogen. Im Tauschverkehr steht der Verein gegenwärtig mit 149 Akademien, Gesellschaften u. s. w. Zum Schlusse wurde auch der freundlichen Unterstützung der Redactionen der Innsbrucker Tagesblätter durch die unentgeltliche Aufnahme der Tagesordnungen und Berichte der Sitzungen gedacht und denselben der gebührende Dank ausgesprochen. Nach Erstattung des Kassenberichtes durch Prof. Dr. v. Dalla-Torre (die Einnahmen betrugen 367 fl. 42 kr., die Ausgaben 346 fl. 98 kr.) und der Wahl der Rechnungsrevisoren erfolgte die Neuwahl des Ausschusses, welche folgendes Ergebnis lieferte: Vorstand: Prof. Dr. F. Hochstetter, Vorstandstellvertreter: Prof. Dr. C. Heider, 1. Schriftführer: Prof. J. Zehenter, 2. Schriftführer: Prof. Dr. J. Loos und Cassier: Prof. Dr. C. v. Dalla-Torre. Prof. Dr. G. Pommer lehnte eine Wiederwahl als Schriftführer ab und wurde demselben für seine mehr-

XVIII

jährige, erspriessliche Mühewaltung um den Verein der beste Dank ausgesprochen.

Zum Schlusse der Jahresversammlung machte Prof. Dr. v. Dalla-Torre einige „Zoologische Mittheilungen“, welche von zahlreichen und interessanten Demonstrationen begleitet waren. Zunächst legte der Vortragende die Tafeln des Werkes von Brunner von Wattenwyl „Ueber die Farbenpracht der Insecten“ vor und besprach dasselbe in Bezug auf den Versuch, die Farben der Insecten naturphilosophisch zu erklären.

Dann zeigte er aus Hr. Friese's Sammlung ein Nest von *Osmia bicolor* und ein Nest von *Trigona lineata* vor, von beiden Arten die biologischen Verhältnisse erörternd, speziell im Vergleiche zur einheimischen Honigbiene.

Endlich demonstrierte er eine gynandromorphe (Zwitter) Form der Gattung *Pepsis* und gab einen kurzen historischen und statistischen Ueberblick über das Vorkommen gynandromorpher Arthropoden; bisher sind bei 400 Fälle constatirt, darunter bei 300 von Schmetterlingen allein und ungefähr 60 bei Hymenopteren. An dem vorliegenden Stücke sind rechts die männlichen, links die weiblichen secundären Geschlechtsmerkmale deutlich ausgeprägt; der Stachel verräth in der Hauptanlage ein Weibchen. Auch noch 2 andere gynandromorphe Stücke von Bienen werden vorgelegt. Die genaue Beschreibung und Abbildung dieses hochinteressanten Stückes behält sich der Vortragende für den heurigen Bericht vor. Nachdem noch Prof. Dr. Heider zum Vortrage einige Bemerkungen gemacht und dem Prof. Dr. Klemencic für die freundliche Ueberlassung des Hörsaales zu den Sitzungen den besten Dank dargebracht hatte, wurde die Jahresversammlung geschlossen.

II. Bericht über die im Jahre 1898/99 vom Vereine abgehaltenen Sitzungen.

I. Sitzung am 22. November 1898.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Hochstetter theilt mit, dass die Rechnungslegung des Cassiers für das Jahr 1897/98 von den Rechnungsrevisoren Hofrath Prof. Dr. Wieser und Prof. Dr. Klemencie für richtig befunden wurde.

Weiters wird der Tod des Dr. F. Kohn in Breslau zur Anzeige gebracht, worauf sich die Versammlung zum Zeichen der Trauer von den Sitzen erhebt.

Ferner wird das Preisausschreiben der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft von Königsberg i. Pr. vorgelesen und eine vom Lipperheide'schen Verlage in Berlin eingesendete Broschüre „Rechtsschutz der Zeitungen und Büchertitel“ vorgelegt. Von den eingelaufenen Tauschanträgen wird beschlossen den Tauschverkehr einzuleiten:

1.) mit der naturwissenschaftlichen Gesellschaft „Isis“ in Bautzen und 2.) mit dem Museo Nacional in Buenos-Aires; hingegen denselben abzulehnen mit der „Göteborg's Kungl. Vetenskaps och Vitterhetssamhälle.

Zum Eintritte in den Verein melden sich an: Univ.-Prof. Dr. Joh. Rille und die Oberrealschul-Professoren: Dr. Alois Lanner und Aug. Schletterer.

Nun hielt Prof. Dr. Klemencie einen allseitig Interesse erregenden Vortrag:

„Ueber die Elektrizitätswerke in Tirol
und Vorarlberg.“

Der Vortragende gab zunächst eine kurze Darstellung der Entwicklung der Elektrotechnik und bemerkte, dass insbesondere die Fortschritte in der Wechselstromtechnik für die Alpenländer von grosser Bedeutung sind, indem es infolge derselben möglich geworden ist, Wasserkräfte in der ausgiebigsten Weise auszunützen. Wasserfälle in den entlegensten Thalwinkeln, die man vor 15 Jahren kaum beobachtet hat, können heute zum Antriebe von Wechselstrommaschinen von hoher Spannung benützt werden und die elektrische Energie auf langen Leitungen ohne grosse Energieverluste bis zum Absatzgebiete geleitet werden. Die Nutzbarmachung der elektrischen Energie besteht sodann darin, dass man sie zu Beleuchtungszwecken verwendet, oder dass man mit derselben Motoren treibt, oder chemische Scheidungen vornimmt. Gegenwärtig stehen in Tirol 78 Elektrizitätswerke im Betriebe. Das grösste ist das Meranerwerk, welches nach dem ersten Ausbau eine Leistungsfähigkeit von 3000 P. S. (Pferdestärken) hat und später auf 6000 P. S. gebracht werden soll. Andere grössere Werke sind das Innsbrucker Elektrizitätswerk in Mühlau, das Elektrizitätswerk am Vomperbach bei Schwaz und das von Trient. Alle 78 Werke zusammen haben eine maximale Leistungsfähigkeit von 9700 P. S. Auf die Wechselstromanlagen entfallen 6700 P. S. und auf die Gleichstromanlagen 3000 P. S. Einige Elektrizitätswerke (5) werden mit Dampfmaschinen betrieben, die andern beinahe ausschliesslich mit Wasserkraft. Von der Gesamtleistung entfallen nur 4% auf die Anlagen mit Dampftrieb. Zu Beleuchtungszwecken werden 7900 P. S. und zum Antriebe von Motoren un-

gefähr 1800 P. S. verwendet. Eine Ausnützung der elektrischen Energie zum Betriebe von Bahnen ist vorläufig mit Ausnahme einer kleinen Fabrikbahn nicht zu verzeichnen. Ebenso werden für elektrochemische Zwecke nur 13 P. S. im k. k. Hüttenwerk in Brixlegg ausgenützt. Ein Vergleich mit der Schweiz und mit den französischen Alpen lehrt, dass wir hinsichtlich der Ausnützung der Wasserkräfte, insbesondere für den Betrieb von Bahnen und für die elektrochemische Industrie hinter den genannten Ländern sehr weit zurückstehen.

Mit dem Danke des Vorsitzenden an den Vortragenden für seine lehrreichen Ausführungen wurde die sehr zahlreich besuchte Sitzung geschlossen.

II. Sitzung am 6. December 1898.

Die in der letzten Sitzung zum Eintritte in den Verein angemeldeten Herren Prof. Dr. J. Rille, Prof. Dr. A. Lanner und Prof. A. Schletterer werden in den Verein aufgenommen. Der Vorsitzende verliest ein Dankschreiben der Frau P. Cohn in Breslau für das ihr anlässlich des Todes ihres Mannes ausgedrückte Beileid. Hierauf sprach Prof. Dr. E. Heinricher

„Ueber das Reviviscenz- und Regenerationsvermögen der Farne.“

Zunächst berichtete der Vortragende über Untersuchungen des schwedischen Botanikers Wittrock, der vor einigen Jahren nachgewiesen hat, dass die gegen Verdunstung so empfindlichen Blätter der Farne im hohen Grade befähigt sind, Austrocknung lange in einem latenten Lebenszustande zu überdauern. Ein abgetrenntes, wochenlang lufttrocken gelegenes Blatt unseres gemeinen Engelsüssfarnes (*Polypodium vulgare*) z. B., vermag noch eine

weitere Austrocknung im Schwefelsäureexsiccator zu ertragen und wird dann, in Wasser gebracht, wieder seinen frischen Zustand gewinnen. Eine Prüfung zeigt, dass seine Zellen lebend geblieben sind. Bestätigende Beobachtungen ähnlicher Art, die der Vortragende an Brutknospen eines Farnes machte, führten ihn zu Versuchen über das Regenerationsvermögen der Farne. Während bei den Moosen das Regenerationsvermögen sehr weitgehend ist und aus den verschiedensten abgetrennten Theilen einer Pflanze Neubildung einer solchen erfolgen kann, war für die Farne diese Erscheinung bisher unbekannt. Der Vortragende wies nach, dass aus den Niederblättern des Farnes *Cystopteris bulbifera*, ja aus Theilen solcher, ferner aus abgeschnittenen Blattgrundtheilen ausgewachsener oder junger Blätter von sämtlichen einheimischen *Cystopteris*-Arten mit Leichtigkeit durch Regeneration neue Pflanzen gewonnen werden. Diese Beobachtungen führen zu einer Reihe von Schlüssen und weiteren Versuchen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Vermuthlich wird sich eine ähnliche Regenerationsfähigkeit, wie sie bis jetzt an der allein geprüften Gattung *Cystopteris* nachgewiesen wurde, auch für andere Farne nachweisen lassen.

III. Sitzung am 17. Jänner 1899.

Ueber Antrag des Vorstandes wird beschlossen den Verein der Naturfreunde in Reichenberg anlässlich seines 50jährigen Bestehens zu beglückwünschen. Weiters theilt der Vorsitzende ein Schreiben der hoh. k. k. Statthalterei mit, in welchem die Mitglieder auf das Erscheinen des Werkes „Oesterreichs Wohlfahrtseinrichtungen“ aufmerksam gemacht werden. Zum Eintritte in den Verein wird Herr Dr. Gustav Bode, Assistent am botanischen Universitäts-Institute, angemeldet.

Hierauf sprach Prof. J. Zehenter über

„Düngungsversuche“.

Nach einer kurzen Besprechung der Stoffe, welche die Pflanze zu ihrer Ernährung braucht und der Form, in welcher dieselben von ihr aufgenommen werden, wurde auf die Nothwendigkeit hingewiesen, die durch die Ernte dem Boden entzogenen Stoffe durch eine rationell durchgeführte Düngung zu ersetzen, will man den Ertrag der Felder auf gleicher Höhe erhalten. Die Düngemittel, welche heute Verwendung finden, sind entweder allgemeine, welche dem Boden nicht nur die nötigen Nährstoffe zuführen, sondern auch im physikalischen Sinne bodenlockernd, bodenerwärmend u. s. w. einwirken und besondere oder Handelsdünger, welche meist nur den Ersatz eines oder mehrerer Nährstoffe bezwecken. Zu den ersteren gehören z. B. der Stallmist und die Jauche, zu den letzteren z. B. der Chilesalpeter, die Superphosphate, die Thomasphosphatmehle, die Kalisalze. Um nun zu erfahren, wie durch die Düngung ein möglichst hoher Ertrag zu erzielen ist, müssen Düngungsversuche ausgeführt werden, die entweder im Laboratorium im kleinen Massstabe als Topfdüngungsversuche, oder auf freiem Felde im grossen Massstabe als Felddüngungsversuche zu Durchführung gelangen. Jene haben mehr wissenschaftlichen Charakter, diese sollen auch den Bedürfnissen der Praxis dienen. Es wurden nun die Resultate einer Reihe von Topfdüngungsversuchen vorgeführt, die von Prof. Paul Wagner an der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Darmstadt zu dem Zwecke angestellt wurden, die Wirkung des Chilesalpeters auf die Entwicklung einer Reihe von unseren Culturpflanzen zu zeigen und aus denen die günstige Wirkung obigen Düngemittels, wenn selbes in richtigem Masse, zur richtigen Zeit und bei genügender Anwesenheit von Kali und Phos-

phorsäure angewendet wird, hervorgieng. Wichtig ist, dass diese im kleinen Massstabe durchgeführten Versuche auch durch Felddüngungsversuche ihre volle Bestätigung fanden. Solche Versuche wurden von Wagner u. m. A. in grosser Zahl angestellt und kamen deren Durchführung und deren Ergebnisse an einem speziellen Beispiele zur Sprache. Mit der Vorweisung der bildlich dargestellten Resultate solcher Versuche und im Hinweis auf die Wichtigkeit derselben für den Landwirt schloss der Vortragende seine Ausführungen.

IV. Sitzung am 31. Jänner 1899.

Hr. Dr. Gustav Bode wird in den Verein aufgenommen.

Prof. Dr. H. Hammerl hält einen Vortrag

„Ueber die Verflüssigung der Gase der Luft nach Linde.“

Der Vortragende wies zunächst auf die von jeher zur Verflüssigung der Gase angewendeten Mittel, Druck und Abkühlung, hin, welche jedoch lange Zeit als vollständig gleichwertig galten. Bereits 1823 wurden von Davy und Faraday eine Reihe von Gasen verflüssigt; trotz enormer Drucke war es aber nicht möglich Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff etc. zu verflüssigen. Andrews zeigte 1869, dass es für jedes Gas eine sogenannte „kritische Temperatur“ gibt, oberhalb welcher durch Druck die Verflüssigung nicht mehr vor sich geht.

Im Jahre 1877 gelang Cailletet und Pictet eine sogenannte dynamische Condensation, Nebelbildung der Gase. Messbare Mengen von verflüssigten Gasen erhielten 1883 Wrowlewski und Olzewski, die alle Gase mit Ausnahme des Wasserstoffs verflüssigten und die kritischen

Temperaturen derselben bestimmten, z. B. für Luft — 140°C . Die Verflüssigung des Wasserstoffs gelang 1898 Dewar und zwar nach einem ähnlichen Verfahren, wie es Linde bereits 1895 zur Verflüssigung der Luft verwendet hatte. Dasselbe beruht auf der Thatsache, dass ein Gas, welches von einem hohen Drucke auf einen niedrigen ohne Leistung äusserer Arbeit ausströmt, eine Abkühlung erleidet. Da nun selbst sehr grosse Druckdifferenzen nicht ausreichen, um bei einer einmaligen Ausströmung die Verflüssigung der Luft herbeizuführen, werden die Wirkungen vieler Ausströmungen so vereinigt, dass jede vorhergehende zur Abkühlung der nachfolgenden dient, was man durch Anwendung des Gegenstromprincipes erreicht. An Hand einer schematischen Zeichnung wird die Einrichtung des von Linde construierten Apparates erklärt. In demselben wird die Luft wiederholt auf 200 Atmosphären comprimiert und auf 16 Atmosphären expandiert, wobei sie sich derart abkühlt, dass sie in den flüssigen Zustand übergeht. Sie stellt nach dem Abfiltrieren geringer Mengen ausgeschiedener fester Kohlensäure eine wasserhelle, schwach bläuliche Flüssigkeit dar. Zum Schlusse des interessanten und zeitgemässen Vortrages wurde auch flüssige Luft, welche in zuvor-kommenster Weise die Gesellschaft für Linde's Eismaschinen in München beistellte, vorgezeigt.

V. Sitzung am 28. Februar 1899.

Nachdem zunächst der Tauschvertrag mit der kais. Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg angenommen wurde, sprach Prof. Dr. J. Blaas

„Ueber Wasserversorgung und Kanalisation.“

Der Vortragende weist auf das Missverhältnis hin, das an vielen Orten mit moderner Wasserversorgung

zwischen der zugeführten Wassermenge und der Art der Ableitung des Wassers nach dem Gebrauche besteht. Aeussern Anlass zur Besprechung derselben bot ein Blick auf die uns nahe liegenden Verhältnisse in Innsbruck-Wilten. Der Vortragende giebt zunächst ein übersichtliches Bild der Wasserversorgung beider Gemeinden und bespricht sodann die bestehenden Kanalisationsverhältnisse und deren Mängel, woraus hervorgeht, dass die vorhandene Kanalisierung kaum ausreichend war für die Zustände vor Einführung der neuen Wasserversorgung, nunmehr aber, unter wesentlich geänderten Verhältnissen, ganz unhaltbar geworden ist. Die Schilderung der durch die grössere und allgemeinere Wasserzufuhr und die mannigfaltigere Verwendung des Wassers hervorgerufenen Uebelstände infolge der mangelhaften Abfuhr des gebrauchten Wassers lässt darüber keinen Zweifel. Ausserordentlich klar erscheinen diese Verhältnisse bei einem Einblicke in den geologischen Aufbau des Untergrundes des Gebietes von Innsbruck-Wilten, den der Vortragende durch eine ausführliche Darlegung dieses Aufbaues unter besonderer Berücksichtigung der angeregten Frage den Zuhörern gab. Es geht daraus hervor, dass eine Kanalisation des Stadtgebietes allein durchaus nicht genügt. Sollen die gefürchteten sanitären Uebelstände vermieden werden, so muss in das Kanalisationssystem notwendig Wilten mitbezogen werden. Eine solche umfassende Kanalisation liegt in dem Entwurfe des Stadtbaurathes, Herrn Tochtermann, vor.

Diese Kanalisation wird nach der Skizze, welche der Vortragende hievon — auf Grund von freundlichen Mittheilungen, die er vom Projektanten erhalten — giebt, den weitgehendsten Anforderungen genügen und sämtliche gerügte Uebelstände heben, weshalb der Vortragende am Schlusse den Wunsch ausspricht, es möge die Ausführung desselben noch zu einer Zeit in Angriff genommen werden, solange die Infection des Bodens nicht

einen Grad erreicht hat, in welchem sie offenkundig gefährlich ist.

VI. Sitzung am 14. März 1899.

Die Tauschanträge der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Winterthur und des Clubs für Naturkunde (Section des Brünner Lehrervereines) werden angenommen. Weiters sprach Prof. Dr. A. Lode über

„Neue Versuche betreffend die Sterilisierung des Wassers durch Zusatz von Chlorkalk“.

Der Vortragende besprach zunächst die Ansichten, wie sie von Pettenkofer in München und Koch in Berlin zur Erklärung der Art der Verbreitung epidemischer Krankheiten aufgestellt wurden. Besonders die von Koch angenommene und vertretene Ansicht, dass die Verbreitung durch das mit den Krankheitskeimen verseuchte Trink- und Nutzwasser stattfindet, hat sich zur Erklärung einer Reihe von Epidemien völlig bewährt, wie die angeführten Fälle der Cholera-Epidemien in Hamburg und Nietleben u. A. auf das Bestimmteste zeigen. Es ist daher in all' jenen Fällen, wo nicht von der Natur aus ein reines, insbesondere von Krankheitskeimen freies Wasser zur Verfügung steht, sehr wichtig, das zur Verwendung gelangende Wasser von den Krankheitserregern zu befreien, was durch Sterilisation auf verschiedene Weise geschehen kann. Der Vortragende führte nun näher die Art und die Erfolge der Sterilisation des Wassers mit geringen Mengen von Chlorkalk aus, wie selbe zuerst von Traube in Berlin empfohlen und dann auch von ihm selbst im kleinen und grossem Massstabe erprobt wurde. Die Resultate waren in Bezug auf Tödtung der Krank-

XXVIII

heitsreger günstig zu nennen. Uebelstände waren, dass das behandelte Wasser eine leichte Trübung zeigte und einen etwas unangenehmen alkalischen Geschmack besass. Weitere Versuche lehrten dann, dass sich durch Zusatz geringer Mengen Salzsäure, noch besser aber durch Einleiten von Kohlensäure in das vorher mit Chlorkalk behandelte Wasser obige Uebelstände vermeiden lassen. Mit dem Danke des Vorsitzenden an Prof. Lode für seine interessanten Mittheilungen wurde die Sitzung geschlossen.

Ausserordentliche Generalversammlung am 18. April 1899.

Zweck dieser Versammlung war die Besprechung verschiedener Unannehmlichkeiten, welche sich bei dem bisherigen Gebrauche, die Mitgliederbeiträge durch einen Diener einkassieren zu lassen, herausgestellt hatten. — Um dieselben für die Zukunft unmöglich zu machen, bringt Prof. Dr. Hochstetter den Antrag ein, die Mitgliederbeiträge zunächst versuchsweise für 1 Jahr im November mittels Postsparkassascheinen einzuheben. Im Falle der Nichteinzahlung ist der Betrag mittels Postauftrages im Laufe des Monats December einzuheben. Nachdem sich Prof. Dr. O. Stolz in der wärmsten Weise für diesen Antrag ausgesprochen hatte, wurde derselbe ebenfalls einstimmig angenommen. Von diesem Beschlusse sind die Vereinsmitglieder in entsprechender Weise zu verständigen.

Der Vorsitzende macht ferner die erfreuliche Mittheilung, dass das hohe k. k. Minist. f. Cultus u. Unterricht auch für dieses Jahr eine Summe von 300 fl. dem Vereine bewilligt hat.

VII. Sitzung am 2. Mai 1899. (Jahresversammlung).

Der Vorsitzende Prof. Dr. Hochstetter stellt zunächst im Namen des Ausschusses folgende Anträge:

1. Es möge der Ausschuss ermächtigt werden, dem hoh. k. k. Ministerium f. Cultus u. Unterricht für die für das Jahr 1899 bewilligte Subvention von 300 fl. den Dank des Vereines schriftlich auszudrücken und zu Beginn des nächsten Vereinsjahres beim hoh. Ministerium um eine ähnliche Subvention für das Jahr 1900 anzusuchen.

2. Soll mit der Redaction des American Microscopical Journal in Washington und mit der Rivista di Patologia vegetale in Portici der Tauschverkehr eingeleitet werden.

3. Die Herren Prof. Dr. C. Heller in Innsbruck und Magnus in Berlin, ersteren wegen seiner Verdienste um den Verein im Allgemeinen und seiner Verdienste um Erforschung der Fauna von Tirol — letzteren wegen seiner thätigen Mitwirkung am Vereinsberichte zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

4. Dem Diener des physikalischen Institutes, Stelzig, aus den Vereinsmitteln eine Remuneration von 10 fl. zu bewilligen.

Sämmtliche Anträge werden einstimmig angenommen.

Hierauf erstattete der Secretär Prof. J. Zehenter den Jahresbericht, in welchem zunächst ein Ueberblick über die in den Sitzungen des abgelaufenen Vereinsjahres gehaltenen Vorträge gegeben wurde. Im Anschlusse daran sprach der Schriftführer allen Herren, welche Vorträge gehalten, den gebührenden Dank aus.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder betrug in diesem Jahre 81, von denen 4 Ehrenmitglieder und 77 ordentliche Mitglieder waren. Neu eingetreten sind 4; ausgetreten 6 Mitglieder.

In Tauschverbindung steht der Verein gegenwärtig mit 145 Akademien, Gesellschaften, Instituten und Redactionen.

Nicht unbeachtet darf schliesslich die wohlwollende Unterstützung der Innsbrucker Presse bleiben und wurde den Redactionen der Innsbrucker Tagesblätter für die Aufnahme der Tagesordnungen und Sitzungsberichte der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Der Cassabericht, vorgetragen vom Cassier, Prof. Dr. K. v. Dalla-Torre ergibt, dass im abgelaufenen Vereinsjahre die Einnahmen 802 fl. 53 kr., die Ausgaben 124 fl. 47 kr. betrugen, demnach ein Cassarest von 678 fl. 6 kr. bleibt.

Zu Cassarevisoren werden die Herren Hofrath Prof. Dr. Wieser und Prof. Dr. Klemencic gewählt.

Die Neuwahl des Vereinsausschusses ergab als

Vorstand: Prof. Dr. J. Klemencic,

Vorstandstellvertreter: Prof. Dr. F. Hochstetter,

1. Schriftführer: Prof. J. Zehenter,

2. Schriftführer: Prof. Dr. J. Loos,

Cassier: Prof. Dr. K. v. Dalla-Torre.

Während der Feststellung des Wahlergebnisses durch die Herren Prof. Dr. Loebisch und Prof. Dr. Czermak sprach Prof. Dr. F. Dümmer

„Ueber die Sehnervenbahnen“.

Der Vortragende beschränkt nach Darlegung des Verlaufes der Sehnervenfasern zu den optischen Centren im Gehirn sein Thema auf den ersten Theil der Bahn, nämlich auf die Sehnervenbahn vom Auge durch das Chiasma bis gegen die primären Opticusganglien. Hierauf wird eine Uebersicht der hier in Betracht kommenden Untersuchungsmethoden und der mittels derselben bei Thieren gewonnenen Resultate gegeben. Die Ansicht von J. Müller, dass die Thiere mit getrennten Gesichts-

feldern der beiden Augen auch totale Kreuzung zeigen, bestätigt sich mit Ausnahme der Eule, die trotz gemeinschaftlicher Gesichtsfelder totale Kreuzung hat.

Die Verhältnisse beim Menschen lassen nach den klinischen Befunden die Semidecussation der Sehnervenfasern im Chiasma erwarten. In seltenen Fällen von angeborenen Anomalien findet sich gar keine Kreuzung oder ein ganz gesondertes ungekreuztes Bündel.

Die Frage der totalen oder nicht totalen Kreuzung der Sehnerven im Chiasma des Menschen wurde neuerdings dadurch angeregt, dass Koelliker sich auf die Seite von Michel gestellt hat und die totale Kreuzung annimmt. Zu den neueren Beweisen für die Semidecussation beim Menschen kann Dimmer einen neuen fügen. Es ist der erste Fall, wo beim Menschen die Marchi'sche Methode zur Färbung der zerfallenen Sehnervenfasern angewendet werden konnte. Der Fall betraf einen Mann, bei dem ein sehfähiges Auge wegen einer Geschwulst entfernt wurde und der 6 Wochen nach der Operation starb. Die Untersuchung mit der Marchi'schen Methode liess deutlich die Semidecussation erkennen und das gekreuzte und ungekreuzte Bündel in die Tractus verfolgen.

Ein anderer Fall — ein Tuberkel am Chiasma mit während des Lebens nachgewiesener temporaler Hemianopie des einen und Blindheit des andern Auges — gestattete Schlüsse über die Lage des gekreuzten und ungekreuzten Bündels im Sehnerven.

Von beiden Fällen wurden Präparate mittels des Skioptikons demonstriert und auch die Verhältnisse bei Thieren, ferner jene angeborenen Anomalien beim Menschen durch Präparate und Projection von Bildern illustriert.

III. Verzeichnis

der Akademien, Gesellschaften, Institute und Redactionen, mit denen der naturwissenschaftlich-medizinische Verein in Tauschverbindung steht, sowie der letzterhaltenen Publikationen derselben.

Augsburg: Naturwissenschaftl. Verein für Schwaben und Neuburg. Berichte Jahrg. 33 (1898).

Basel: Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen XI Heft 3; XII Heft 1.

Bautzen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungsber. u. Abhandl. 1896—1897.

Bergen: Museum. Museums-Bericht 1897, 1898.

Berlin: Königl. preussische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte 1897, 26—53; 1898, 1—54.

— Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg. Verhandlungen XXXIX (1897) XL (1898).

— Medicinische Gesellschaft. Verhandlungen XXVIII (1897) XXIX (1898).

— Gesellschaft naturforschender Freunde. Sitzungsberichte 1896, 1897, 1898.

— Redaction der „Deutsche Medicinal-Zeitung“. Wochenschrift XVIII (1897) XIX (1898).

— Naturae Novitates. XVIII (1896), XIX (1897), XX (1898).

Bern: Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen 1895, 1896.

Bistritz (Siebenbürgen): Gewerbeschule. —

Bonn: Naturhistorischer Verein der preuss. Rheinlande und Westphalens. Verhandlungen LIII, 2 (1896); LIV, 1, 2 (1897); LV 1, 2 (1898); Sitzungsberichte 1898 1 u. 2.

Bordeaux: Société des sciences physiques et naturelles. Mémoires V. Ser. I (1895), II (1896), III, 1 (1898), IV (1898); Observ. 1895, 1896, 1897, 1898; et Proc. verb. 1895, 1896, 1897, 1898.

Braunschweig: Verein für Naturwissenschaft. Jahresbericht X. (1895—96), erschienen 1897.

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen XIV, 1—3 (1897); XV, 1—2; XVI, 1 (1898).

Breslau: Verein für schlesische Insectenkunde. Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge XXII (1897), XXIII (1898).

— Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Jahresbericht LXXIV für 1896; LXXV für 1897.

Brünn: Club für Naturkunde (Section des Lehrervereines) Bericht I. (1899).

— Naturforschender Verein. Verhandlungen XXXV (1896); XXXVI (1897).

Brüssel: Société entomologique de Belgique. —

— Société malacologique de Belgique. Procès verbaux des seances. —

Budapest: Ungarisches Nationalmuseum: Redaction der „Naturhistor. Hefte“ (Termeszetrayzi Füzetek). Naturhistorische Hefte Jahrgang XX, 4 (1897); XXI, 1—4 (1898).

— Königl. ungarische naturwissenschaftl. Gesellschaft. Berichte Bd. XII und diverse Publicationen.

Buenos-Aires: Museo nacional. Mem. 1894, 1895, 1896 Anal. 2. Ser. I. u. II. Comunicac. I/2.

Cassel: Verein für Naturkunde. Bericht XLII (1897); XLIII (1898).

- Chapel-Hill:** Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society XIV (1897); XV (1898), 1.
- Chemnitz:** Naturwissenschaftl. Gesellschaft. —
- Chur:** Naturforschende Gesellschaft Graubündens. Jahresbericht XL (1896—97); XLI (1897—98); 1 Beiheft.
- Cordoba (Republica Argentina):** Academia nacional des ciencias. Boletin XV, 1—4.
- Crefeld:** Verein für naturwissenschaftliches Sammelwesen. Jahresb. III (1898).
- Danzig:** Naturforschende Gesellschaft. Schriften, Neue Folge. Bd. IX, 2 (1897), 3—4 (1898).
- Darmstadt:** Verein für Erdkunde. Notizblatt XVIII (1897).
- Dorpat:** Naturforscher-Gesellschaft. Sitzungsbericht XI, Heft 3 (1898).
- Dresden:** Naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis. Sitzungsberichte Heft 2 (1896); Heft 1 u. 2 (1897).
— Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Jahresbericht 1896—97.
- Dublin:** Royal Society. Proc. VIII. P. 5; Trans. VI. P. 2—13.
— Royal Irish Academy. Proc. IV. P. 2—5 V. P. 1. Trans. Vol. XXVI P. 1—6.
- Edinburg:** Geological Society. Trans. VII. P. 3.
- Elberfeld:** Naturwissenschaftl. Verein. —
- Erlangen:** Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Sitzungsberichte Bd. XXIX (1897).
- Fiume:** Naturwissenschaftlicher Club. —
- Florenz:** Società entomologica italiana. Bulletino XXIX (1897); XXX 1, 2. (1898).
- Frankfurt a./M.:** Senkenberg'sche naturforschende Gesellschaft. Bericht 1897, 1898
— Physikal. Verein. Jahresbericht 1895—96, 1896—97.
- Frankfurt a./O.:** Naturwissenschaftlicher Verein. Monatliche Mittheilungen (Helios) XIV (1897) XV (1898). Societatum litterae X (1896) XI (1897).

- Freiburg i.Br.:** Naturforschende Gesellschaft. Berichte X (1896).
- Freiburg (Schweiz):** Société Frybourgoise des sciences naturelles. Compt. rend. VII (1893—1897).
- Giessen:** Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. —
- Görlitz:** Naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen XXII (1898).
- Göttingen:** Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. Nachrichten 1897.
- Graz:** Verein der Aerzte in Steiermark. Mittheilungen XXXII (1895); XXXIII (1896); XXXIV (1897).
— Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mittheilungen XXXIII (1896) XXXIV (1897).
- Greifswald:** Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvorpommern und Rügen. Mittheilungen XXIX (1897); XXX (1898).
— Geographische Gesellschaft. —
- Güstrow:** Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, Archiv LI (1897); LII, Heft 1, (1898).
- Halle a/S.:** K. Leopold-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher. Leopoldina XXXIII (1897), XXXIV (1898).
— Verein für Erdkunde. Mittheilungen 1897, 1898.
— Naturforschende Gesellschaft. Bericht XXI (1897).
- Hamburg:** Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. —
- Heidelberg:** Naturhistorisch - medicinischer Verein. Verhandlungen, neue Folge. Bd. VI, 1; (1898).
- Helsingfors:** Societas pro Fauna et Flora Fennica. Acta XIII. (1897—98) XIV (1898); Medd. XXIII (1898).
- Hof i.B.:** nord-oberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde. —
- Innsbruck:** Ferdinandeum, Zeitschrift. III. Folge XLI (1897), XLII (1898).
- Jena:** Geographische Gesellschaft für Thüringen. Mitth. XVI (1897), XVII (1898).

- Karlsruhe:** Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen. —
- Kiel:** Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. Schriften, XI. Heft 1 (1897).
- Klagenfurt:** Naturhistorisches Landesmuseum in Kärnten. Jahrbuch XXIV (1896).
- Klausenburg:** Medicinisch - naturwissenschaftliche Section des Siebenbürgischen Landesmuseums. Mitth. XXIII.
- Königsberg:** Kgl. physikalisch-ökonomische Gesellschaft. Schriften XXXVIII (1897).
- Kopenhagen:** Mediciniske Selskabs. —
- Laibach:** Krainischer Museal-Verein. Mittheilungen.
- Landshut:** Botanischer Verein. Bericht XV (1896—97).
- Lausanne:** Société Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin 2^{me} Série Nr. 124—130.
- Leipzig:** Naturforschende Gesellschaft. Sitzungsbericht. —
- Linz:** Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Jahresbericht XXVI (1897), XXVII (1898).
- London:** Royal Society. Proceedings Nr. 368—411.
- Lüneburg:** Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg. Jahreshefte XXIV (1896—98).
- Lüttich (Liège):** Société royal des sciences. Memoires II. Serie, XX (1898).
- Luxembourg:** Institut royal Grandducal, section des sciences naturelles. Publications XXV (1896).
- Soc. botanique, Rec. XIII des Mem. et Trav.
- Fauna, Verein Luxemburger Naturfreunde. Mittheilungen 1896 und 1897.
- Lyon:** Société Linnéenne. Annales, nouvelle Serie XLIII (1896) XLIV (1897).
- Marburg (Preussen):** Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. Sitzungsber. 1896 und 1897.
- Mailand:** Società italiana di scienze naturali. Atti XXXVII (1895).
- Milwaukee:** Public Museum. Report XV 1896—97.

Minneapolis: Minnesota Academy of Natural Sciences. Bulletin. —

Montevideo: Museo nacional Tom. III. 9 u. 10.

Moskau: Société imp. des naturalistes. Bulletin 1897 und 1898 Nr. 1, 2, 3.

München: Kgl. baier. Akademie der Wissenschaften; Mathem.-phys. Classe. Sitzungsberichte 1897 Nr. 2, 3, 1898 Nr. 1—4.

— Gesellschaft für Morphologie und Physiologie. Sitzungsberichte XII (1896), XIII (1897), XIV (1898.)

— Aerztlicher Verein. Sitzungsberichte VI (1896), VII (1897).

— Baierische botan. Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. Berichte V (1897), VI (1899).

Münster: Westphälischer Provincialverein für Wissenschaft und Kunst. Jahresbericht XXV (1896—97) XXVI (1897—98).

Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. Abhandl. X. Heft 5, XI (1897).

New-York: State Museum Report. —

Offenbach: Verein für Naturkunde. Bericht. —

Osnabrück: Naturwissenschaftl. Verein. Jahresbericht XII (1897).

Padua: Società Veneto-Trentina di scienze naturali. Atti Ser. II, Vol. III, Fasc. II, Bull. Vol. VI. Hft. 3, (1898).

Palermo: Circolo matematico. Rendiconti XII (1898) XIII 1, 2, (1899).

Paris: Société zoologique de la France. Bulletin XXI (1896) XXII (1897).

Perugia: Academia medico - chirurgica. Atti e Rendiconti IX. 2—4, X.

Petersburg: Physikalisches Central-Observatorium. Repertorium für Meteorologie. — Annal. —

Philadelphia: Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Transactions V (1898).

Portici: Rivista di Patologia vegetale. —

Prag: Königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Jahresberichte 1897 und 1898; Sitzungsberichte 1897, I. II. 1898.

— Naturhistorischer Verein „Lotos“. Jahrbuch, Neue Folge XVI (1896), XVII (1897); Abhandlungen I, Nr. 1.

— Spolek chemikny českých (Verein böhm. Chemiker). Listy chemické XXI (1897).

Regensburg: Kgl. bair. botanische Gesellschaft, Denkschriften VII (1898).

Reichenberg: Verein der Naturfreunde. Mittheilungen XXIX (1898).

Rio de Janeiro: Museo national. Archivos. —

Rom: Reale Academia dei Lincei. Atti V (1897), VI (1898).

— Società Romana per gli studi zoologici. Bulletino VII (1898).

Rovereto: Academia degli Agiati. Atti 1897 und 1898.

Saniago: Deutsch-wissenschaftlicher Verein. Verhandlungen. —

Schweizerische naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen. —

Sion (Wallis): Société Murithienne. Bulletin des travaux XXIII—XXV (1894—96), XXVI (1897).

Stavanger: Museum. Aarsberetning (1896—1897).

Strassburg: Kais. Universitäts- und Landesbibliothek. —

Stockholm: Entmologiska Föreningen. Entmologisk Tidskrift XVIII (1897), XIX (1898).

St. Louis, Mo.: Botanical Garden, Annual Report. 1—9.

Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahreshfte LIII (1897), LIV (1898).

- Thorn:** Copernicus - Verein für Wissenschaft und Kunst. Mittheilungen. —
- Trencsin:** Naturwissenschaftlicher Verein des Trencsiner Comitates. Jahreshefte XIX—XX (1898).
- Troppau:** Naturwissensch.-medizinischer Verein. Nr. 6—9.
- Tufts College (Massachusetts):** Studies V.
- Upsala:** Societas Regia scientiarum. Nova Acta. —
- Washington:** American Microscopical Journal. —
- Smithsonian Institution. Report annual. 1895.
 - United States Departement of Agriculture, Jahrbuch 1895, 1896, 1897.
- Wernigerode:** Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. Schriften. —
- Weimar:** Thüringer botan. Verein. Mittheilungen IX (1896), X, XI (1897).
- Wien:** k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. Verhandlungen XLVII (1897), XLVIII (1898).
- k. k. geologische Reichsanstalt. Verhandlungen 1896, 1897, 1898; Jahrbuch 46, 47 und 48, 1 u. 2 (1898).
 - k. k. naturhistorisches Hofmuseum. Annalen XIII (1898) 1—3.
 - Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Schriften XXXVII (1897), XXXVIII (1898).
 - Section für Naturkunde des österr. Touristenclub. Mittheilungen IX (1897), X (1898).
 - Allg. österr. Apotheker-Verein. Zeitschrift LI (1897), LII (1898).
 - Redaction der „Therapie der Gegenwart“ 1897 und 1898.
- Wiesbaden:** Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrbücher L (1897), LI (1898).
- Winterthur:** Naturwissenschaftliche Gesellschaft I, (1897—1898).

Wisconsin: Natural History Society XI (1896—1897).

Würzburg: Physikalisch-medicin. Gesellschaft. Sitzungs-
berichte 1897, 1898.

Zürich: Naturforschende Gesellschaft. Vierteljahrschrift
XLI (1896), XLII (1897), XLIII (1898) 4. Heft.

Zwickau: Verein für Naturkunde. Jahresbericht 1896,
1897.

IV. Personalstand des Vereines.

Vereinsleitung im Jahre 1899|1900.

Vorstand: Dr. J. Klemencic, k. k. Univ.-Professor.

Vorstand - Stellvertreter: Dr. F. Hochstetter,
k. k. Univ.-Professor.

Secretäre: J. Zehenter, k. k. Oberrealschul-Professor
und Dr. J. Loos, k. k. Univ.-Professor.

Cassier: Dr. K. v. Dalla-Torre, k. k. Univ.-Professor.

Mitglieder am Schlusse des Vereinsjahres 1898|99*).

A. Ehrenmitglieder:

Pfaundler Leopold Dr., k. k. Univ.-Professor in Graz.

Vintschgau Max Ritter v. Dr., k. k. Hofrath und Univ.-
Professor.

Gredler P. Vinzenz Maria, Gymnasial-Direktor in Bozen.

Tappeiner Franz von Dr., prakt. Arzt in Meran.

Heller Camill Dr. k. k. Univ.-Professor i. P.

Magnus P. Dr. Univ.-Professor in Berlin.

B. Ordentliche Mitglieder:

Akademischer Verein der Mediciner.

Blaas Josef Dr., k. k. Univ.-Professor.

Bode Gustav Dr., Assistent am botanischen Institut.

*) Diejenigen P. T. Mitglieder, bei denen der Wohnort nicht angegeben ist, wohnen in Innsbruck.

Czermak Paul Dr., k. k. Univ.-Professor.

Cziehna Carl, Kunsthändler.

Dalla Torre Carl v. Dr., k. k. Univ.-Professor.

Dannhauser Wilhelm, Fabrikant und Hausbesitzer.

Dantscher Victor Ritter v. Kollesberg Dr., k. k. Univ.-
Professor in Graz.

Dimmer Friedrich Dr., k. k. Univ.-Prof.

Edlinger Anton, Verlagsbuchhändler.

Ehrendorfer Emil Dr., k. k. Univ.-Professor und Sani-
tätsrath.

Enzenberg Graf Hugo.

Exner Carl Dr., k. k. Univ.-Professor.

Greil Wilhelm, Kaufmann und Bürgermeister.

Gremblich Julius P., Gymnasial-Professor in Hall.

Hacker Victor Ritter v. Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hammerl Hermann Dr., k. k. Oberrealschul-Professor und
Privatdocent.

Hauser Josef, Hausbesitzer.

Heider Karl Dr., k. k. Univ.-Professor.

Heinricher Emil Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hibler Emanuel v. Dr., I. Assistent am pathol.-anat.
Institut.

Hillebrand Franz Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hochstetter Ferd. Dr., k. k. Univ.-Professor.

Höfel Bernard, Juwelier.

Hopfgartner Carl Dr., Privatdocent und Assistent am
chemischen Laboratorium.

Hueber Adolf Dr., k. k. Oberrealschul-Professor.

Ipsen Carl Dr., k. k. Univ.-Professor.

Juffinger Georg Dr., k. k. Univ.-Professor.

Kaltenbrunner Ferd. Dr., k. k. Univ.-Professor.

Kerschner Ludwig Dr., k. k. Univ.-Professor.

Klemencic Ignaz Dr., k. k. Univ.-Professor.

Knoflach Carl Dr., prakt. Arzt.

Launer Alois Dr., k. k. Oberrealschul-Professor.

- Lantschner Ludwig Dr., k. k. Universitäts-Professor und Sanitätsrath.
- Linser Johann, k. k. Hofrath.
- Lode Alois Dr., k. k. Univ.-Professor und Sanitätsrath.
- Loebisch Wilhelm Dr., k. k. Univ.-Professor und Sanitätsrath.
- Loewit Moritz Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Loos Johann Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Mader Hermann Dr., prakt. Arzt.
- Malfatti Hans Dr., Assistent für angew. medic. Chemie und Privatdocent.
- Mayer Karl Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Neumayr Emanuel P., Gymnasial-Professor in Bozen.
- Nevinny Josef Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Oellacher Guido, Apotheker.
- Oellacher Hermann Dr., k. k. Bezirksrichter i. R.
- Oellacher Oswald Dr., prakt. Arzt.
- Papsch Anton Dr., Zahnarzt.
- Pechlaner Ernst, Professor an der Handels-Akademie.
- Pernter J. M. Dr., Director der Centralanstalt f. Meteorologie und Erdmagnetismus, k. k. Univ.-Professor in Wien.
- Pesendorfer Hermann Dr., Advokat.
- Pommer Gustav Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Pren Karl v. Dr., k. k. Finanz-Prokuratorssecretär.
- Rille Johann Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Rokitansky Prokop Frhr. v. Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Sarlay Philipp, k. k. Telegraphendirector i. R.
- Sauter Ferdinand Dr., k. k. Statthaltereirath und Sanitätsrath.
- Schiffner Ludwig Dr., k. k. Univ.-Professor.
- Schletterer August, k. k. Oberrealschul-Professor.
- Schober Karl, k. k. Oberrealschul-Professor und Docent an der Universität.
- Schumacher Anton v., Präsident der Handels- u. Gewerkekammer und Univ.-Buchhändler.

XLIV

Senhofer Karl Dr., k. k. Univ.-Professor.

Stanger Gustav. k. k. Landesschul-Inspector.

Steiner Karl Dr., Gemeindearzt in Wattens bei Schwaz.

Stolz Otto Dr., k. k. Univ.-Professor.

Swoboda Karl, mag. pharm.

Torggler Franz Dr., k. k. Professor in Klagenfurt.

Wagner Ferdinand, Assistent am chem. Laboratorium.

Waldner Franz Dr., prakt. Arzt und Sanitätsrath.

Weichs-Glon Friedrich Frhr. v., Dr. phil., k. k. Staats-
bahn-Inspector.

Wenin Hans Dr., 1. Vicebürgermeister und Rechtsanwalt.

Werner Franz Dr., Magistratsrath i. P.

Wieser Franz Ritter v. Dr., k. k. Hofrath und Univ.-
Professor.

Wirtinger Wilhelm Dr., k. k. Univ.-Professor.

Zehenter Josef, k. k. Oberrealschul-Professor.

B. Abhandlungen.



Die
hermaphroditen und gynandromorphen
Hymenopteren.

Von

Prof. Dr. **K. W. v. Dalla Torre** und **H. Friese**

in

Innsbruck.

Mit 1 Tafel.

I. Geschichtlicher Ueberblick.

Die erste Nachricht über das Vorkommen von gynandromorphen Hymenopteren verdanken wir der Entdeckung des Schulmeisters J. G. Lukas, welche durch Dr. B. Laubender ¹⁾ veröffentlicht wurde. Bei dem Umstande, dass die Zeitschrift, in welcher die Veröffentlichung erfolgte, keine rein naturwissenschaftliche ist und nur geringe Verbreitung besitzt *), möge es gestattet sein, den betreffenden Aufsatz, der ja zugleich eine Kritik ist, wörtlich zum Abdruck zu bringen. Er schreibt:

„Die Schriftsteller über Bienenzucht lagen in der neueren Zeit wegen der Geschlechter der Bienen gewaltig mit einander im Streite. Nach einigen war die so genannte Königin allein die vollkommene Mutter einer Bienen-Kolonie, die Arbeitsbienen aber unvollkommene Mütter, also bloss Drohnen zeugend, die Drohnen die einzigen rechtmässigen Männer. Nach andern im Gegentheile war die Königin zwar auch die rechtmässige vollkommene Mutter,

*) Wir verdanken die Einblicknahme in die gesammte Literatur der Liberalitaet der k. b. Hof- und Staats-Bibliothek in München, dem lebenswürdigen Entgegenkommen des Hr. R. Friedländer & Sohn in Berlin, sowie den Bücherschätzen der k. k. Universitäts-Bibliothek und des Ferdinandeums in Innsbruck, der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien, Hr. Dr. V. Carus in Leipzig und Hr. Dr. W. Dönitz in Berlin. — Gerade auf die wörtliche Wiedergabe der Beschreibungen aber legten wir grosses Gewicht, theils um uns selbst eine sichere Grundlage für die Eintheilung zu bieten, theils auch um künftigen Forschern auf diesem Gebiete die Möglichkeit zu geben, ohne sich lange mit dem Herbeischaffen der einschlägigen Literatur aufzuhalten, sofort in medias res zu gelangen.

die Arbeitsbienen aber verschiedenen Geschlechts, grösstentheils Männer, ein kleiner Theil unvollkommene Mütter der Drohnen, die Drohnen selbst aber nicht Bastarde, sondern monströse Varietät. Jede Partei wollte sattsame Gründe für ihre Meinung haben. Die Gründe der letzteren Partei waren so geeigenschaftet, dass sie mit jedem Jahre bisher einige neue Anhänger gewonnen zu haben schien. Ein vollkommen entscheidender Beweis fehlte noch, denn noch war die Begattung der Königin weder mit einer Arbeitsbiene noch mit einer Drohne gesehen worden. Der naive Gedanke von Beschnäbelung sollte den schwierigen Knoten endlich lösen, und für die noch mangelnde Thatsache geltend gemacht werden. Allein da sie auf keine Analogie in dem ganzen Thierreiche zurückgeführt werden konnte, so blieb sie bisher noch grösstentheils paradox. Hätte man jedes Mal in einer Bienen-Kolonie eine Stacheldrohne gefunden, d. h. eine solche Biene, die halb einer Arbeitsbiene, halb einer Drohne gleich gesehen hätte, so wäre dem obwaltenden Streite damit schon ein grösseres Licht zur mehreren Ausgleichung aufgesteckt gewesen, oder die Untersuchungen, Diskussionen hätten zum Theil eine neue, vielleicht bessere Wendung genommen. Allein diese fehlte, und damit war manchem Raisonement der feste Punkt genommen, an den es haltbarer hätte können angeknüpft werden. Was also mangelte, hat nun endlich die Zeit, und der günstige Augenblick ersetzen lassen. Der 15. des Juli-Monats 1801 war es, der dem an der Vervollkommnung der Bienenzucht rastlos arbeitenden Herrn Schulmeister Lukas eine Biene in die Hände lieferte, die bei genauer Besichtigung gerade das war, was man vielleicht längstens schon gewünscht hatte, eine Stacheldrohne. Da er sie in einem Briefe an einen guten Freund näher beschrieben hat, und er mit diesem nebst der Stacheldrohne zu mir kam, so theile ich hier die Beschreibung davon umständlich einstweilen mit, bis es ihm gefallen mag, Mehreres hiervon ins Publikum zu bringen.*

Nun folgt die Beschreibung; siehe II. Theil.

Hierauf fährt der Verfasser weiter:

„Man wird ohne mein Erinnern einsehen, dass diese Zeichnung mit der allerstrengsten Genauigkeit gemacht sei; wie man auch nichts anders von Herrn Lukas zu erwarten berechtigt ist, wenn man ihn und sein lebhaftes Interesse für Wahrheit kennt.

Allein nun fragt es sich, ob diese neue Erscheinung wirklich zur Beilegung des obwaltenden Streits etwas beitragen könne — und was —? Dass jede Partei sie zu ihrem Vortheil benutzen werde, ist leicht vor auszusehen. Ich stehe eigentlich weder für

die eine noch für die andere Partei: ich wünsche nur, dass die Wahrheit gefunden und ohne Zeitverlust geltend gemacht werde.

Man könnte freilich sagen, dass ich nicht mehr unter die Parteilosen zu zählen sei, da ich mich selbst schon für das Männerrecht der Drohnen erklärt habe (M. s. Neueste Sammlungen ökonomischer Schriften von Riem, 1799): allein ich erzählte dort weiter nichts, als was meine Augen gesehen hatten, nämlich dass von der Königin eine Drohne mehrere Minuten lang sei bestiegen gewesen, wo am Ende die Drohne gestorben und die bekannten Hörnchen aus dem hintern Theile des Leibes hervorgetreten gewesen seien. Dass eine wahre Begattung Statt gefunden gehabt habe, konnte ich nicht mit Gewissheit aussagen, wie wohl alle Umstände, die bei und nachher vorkamen, es ziemlich wahrscheinlich machten. Dessen ungeachtet aber lebte ich nach wie vor in einer dunkeln Ungewissheit, und konnte den Gründen der Gegenpartei, aufrichtig gesprochen, noch immer den gerechten Triumph zusprechen, indem sie bloss hypothetisch genommen, ungezwungener jene Erscheinungen erklärten, die die erstere Partei entweder unerklärt lassen, oder nur mit vielem Zwange erklären konnte.

Doch abgesehen von allem dem, so fragt es sich nun, was begünstigt die neu entdeckte Stacheldrohne? Nichts, antwortete mir unlängst ein Bienenfreund. Das scheint mir etwas zu rund abgesprochen. Vorerst wollen wir die Frage untersuchen: wie ist diese Bastard-Geburt entstanden? Wo unsere Augen nichts sehen, müssen wir uns an Analogie halten. Was lehrt die Analogie? wie entstehen Bastarden? Im Durchschnitte genommen sind die Bastarden am Kopfe, Brust und Rücken dem männlichen Geschlechte, und am Hintertheile der Mutter gleich, durch deren wechselseitige Begattung sie gezeugt worden sind. Das Maulthier, welches durch die Begattung eines Hengstes mit einer Eselin erzeugt wird, gleicht dem Pferde in Ansehung der Ohren, der Mähne und des Schweifes, hat aber sonst die Art des Esels. Der Bastard, der von einem männlichen Stieglitz, und einem weiblichen Kanarienvogel gezeugt ist, ist vorn dem Stieglitz und hintern dem Kanarienvogel ähnlich. Wird eine Pferdestute von einem Eselhengst belegt, so erhält man ein Thier, welches dem Vater in der Statur, grauen Farbe und dem schwarzen Kreuz auf dem Rücken ähnlich ist, aber die Art und das Betragen der Mutter hat. Wie es im Thierreiche ist, so ist es auch im Pflanzenreiche. Fällt der befruchtende Staub einer Blume auf die Narben der Blumen einer andern Art, z. B. der echten Rhabarber auf die der gemeinen, so wird Bastard-Rhabarber hervorgebracht, wo die äussere Form immer mehr dem Vater gleicht.

Wenn nun auf solche Art Bastarden entstehen, und die Charaktere der Bastarden immer, der Regel nach, in der nämlichen Form erscheinen, so dass wir alle Mal aus dieser mit Gewissheit auf den Vater und die Mutter zurück schliessen können: so folgt als ungezwungenes Resultat für den vorliegenden Fall, dass nothwendig eine Drohne als Mann mit in die Zeugung der Stachel-drohne, oder der Bienen-Bastarde Einfluss gehabt haben müsse. Ist aber diese Folgerung richtig, so ist es ja falsch, zu sagen, die Drohnen seien blosse monströse Varietäten, Geschlechtslose; und sind sie dies nicht, was hindert uns anzunehmen, dass sie, wie immer geglaubt wurde, auch die alleinigen rechtmässigen Männer für die allein vollkommene Mutter einer Bienen-Kolonie seien? Doch man giebt sich Mühe, die Erscheinung auf einem andern Wege zu erklären. Vielleicht hat sich die Bienenmutter einmal an einer Drohne versehen? — Vielleicht ist ein Drohnenei mit einem Arbeitsbienenei in einer Zelle vermischt worden? — Vielleicht ist gar durch den Futterbrei das Spiel der Natur befördert worden? O ihr superklugen Natur-Philosophen!*) Doch das Gesagte diene einstweilen bloss zum Vorläufer des Besseren, was gewiss von scharfsinnigen Bienenfreunden und Naturforschern über eben den erwähnten Gegenstand nachfolgen wird. So gern ich meine bessern Einsichten Ändern mittheile, so gern nehme ich wieder bessere von Andern an, indem ich überzeugt bin, dass nirgends weniger, als auf dem Pfade der Wissenschaft, ein Stillstand Statt finden könne.*

Lange Zeit verstrich, bis 1835 A. L e f e b u r e ²⁾) anlässlich der Beschreibung eines gynandromorphen Schmetter-

*) Darwin sagt: es ist der strengsten Analogie gemäss, wenn ich behaupte, dass bei der Geschlechtszeugung der Bastarden, ebenfalls einige Theile des neuen Embryo aus ähnlichen Theilen desjenigen von beiden Aeltern, welchen sie gleichen, getrennt oder abgesondert, in eignen Drüsen des Vaters und der Mutter besonders gesammelt, und bei der Begattung in den Fruchthälter oder Uterus dergestalt mit einander vermischt werden, dass daraus ein Embryo entsteht, welcher in einigen Theilen dem Vater, in andern der Mutter ähnlich ist, je nachdem das Verhältniss der Menge und Thätigkeit der beiderseitigen Fasern und Theilchen zur Zeit ihrer Vermischung verschieden war.

lings, des Argus Alexis auch einer ebenso gestalteten Honigbiene und B. de Romand³⁾ einer solchen *Scolia sexmaculata* erwähnte und dieselbe abbildete. Im Jahre 1836 veröffentlichte W. E. Shuckard⁴⁾ nicht weniger als 3 gynandromorphe Hymenopteren: *Anthophora retusa* (L.) von F. Smith bei Barnes gefangen, *Cimbex griffinii* und *Andrena fulvescens* Kby. aus der eigenen Sammlung und bemerkt bei der Beschreibung der erstgenannten Art:

„This Insect presents a very remarkable appearance; its face being half coloured with white and black and the difference of its legs and antennae being so marked; but it is needless to point out, that such is the case, as it will necessarily suggest itself to every one who is acquainted with the vast discrepancy of the sexes in this species. It is also remarkable from giving a positive contradiction to theory which makes the right side the nobler; and adduces in evidence that in all cases of hermaphroditism among insects the right side is the male. In my humble opinion, Sir, the collecting of facts is more valuable than the constructing of crude theories; for the latter too much resembles building upon sand, which the first tide washes away, and in as far as one word of truth is worth a million of false hoods.“

C. Wesmael⁵⁾ berichtet über einen bei Charleroy gefangenen *Ichneumon*, welcher die Merkmale des *Ichn. extensorius* als Weibchen und jene des *Ichn. luctatorius* als Männchen vereinigte. 1838 beschrieb J. Curtis⁶⁾ eine gynandromorphe *Tenthredo angulata* und bildete sie ab, ein Moment, welches J. O. Westwood^{*)} wichtig genug erschien, zum erstenmale eine Liste der bisher bekannt gewordenen gynandromorphen Hymenopteren zusammenzustellen, und ganz unmotivirterweise wird vielfach dieser Autor anstatt der vorher erwähnten als Entdecker derselben citirt^{**)}. Bereits im folgenden Jahre entdeckte C. Wesmael⁷⁾ einen zweiten gynandromorphen *Ichneumon*, welcher die Merkmale des *I. fasciatorius* als Männ-

*) Westwood J. O., Gynandromorphous Hymenopterous Insects in: Mag. Nat.-Hist. 2^d Ser. Vol. II. 1838 p. 393.

**) So e. gr. in Ph. Bertkau's auch sonst nicht durchaus verlässlicher Zusammenstellung J. i. 1889.

chen und jene des *I. quadrimaculatus* als Weibchen vereinigte; A. Förster⁸⁾ erwähnte 1845 einen Zwitter von *Diapria elegans* Nees und bildete denselben ab und C. Wesmael⁹⁾ beschrieb 1849 noch zwei weitere gynandromorphe *Ichneumon*-Arten, den *Ichn. comitator* und den *Ichn. nigratorius*. P. Tischbein¹⁰⁾ ist der erste, welcher einen Ameisenzwitter nämlich *Formica sanguinea* beschrieb, dessen Beschreibung dann J. Ch. Klug¹¹⁾ auf Grund des Original-exemplares und einer färbigen Abbildung ergänzte; derselbe berichtete zugleich auch sehr aphoristisch über einen zwitterigen „*Hylaeus*“*) aus Nordamerika, das erste exotische Stück, an welchem Gynandromorphismus beobachtet wurde. Nun folgt, so zu sagen, Beobachtung auf Beobachtung, Beschreibung auf Beschreibung: F. W. Maeklin¹²⁾ beschreibt eine hermaphrodite *Mutilla obscura* Nyl., J. Roger¹³⁾ einen Zwitter von *Tetrogmus caldarius*, J. F. Ruthe¹⁴⁾ einen solchen von *Blacus maculipes* und anlässlich der Beschreibung eines gynandromorphen *Bombus lapidarius* i. J. 1858 nahm J. Sichel¹⁵⁾ Anlass zu constatiren, dass bereits 6 Hymenopteren-Arten gynandromorph beobachtet worden seien d. h. in der Literatur vorliegen, wogegen in der That doch schon 14 bekannt gemacht worden waren. Zwei weitere Ameisen wurden 1860 durch Fr. Meinert¹⁶⁾ beschrieben; sie betreffen *Myrmica lobicornis* und *Tetramorium similimum* (= *Myrmica caldaria*). In demselben Jahre kam Dönhoff wieder auf die Frage der Bienenzwitter zurück und erhob sich insoferne über alle seine Vorgänger, als er anlässlich der Beschreibung von solchen auch nach der möglichen Entstehungsweise derselben fragt. Zunächst beschreibt er¹⁷⁾ einen Bienenzwitter vom Stande des Herrn Walter in Ohlau und gibt folgenden Erklärungsversuch:

*) *Hylaeus* bei Klug = *Halictus* Latr.

1. Es wäre möglich, dass ein Ei, aus welchem das Thier entstand, zwei Dotter gehabt hätte; der eine Dotter wäre befruchtet, der andere nicht. In dem einen Dotter hätte eine Drohne, in dem anderen eine Biene angefangen, sich zu entwickeln. Beide Thiere hätten zuletzt zu einem Thiere sich verschmolzen.

2. Nach der Dzierzon'schen Theorie von der Entstehung der Drohnen aus unbefruchteten Eiern lässt sich der Hergang bei der Entwicklung leichter erklären. Das Ei enthält nämlich das männliche Individuum *potentia*, der Samenfaden das weibliche Ei *potentia*. Die Entwicklung aller Thiere besteht darin, dass der Keim des Samenfadens und der Keim des Eies sich mit einander verschmelzen. Bei der Entwicklung der Biene prädominirt der Samenfadenkeim, so zwar, dass bei der Befruchtung dieser (das ♀) zur Entwicklung kommt. Im vorliegenden Falle haben sich beide entwickelt und zwar unvollständig, so dass der Keim des Samenfadens sich zu Kopf und Bruststück, der Keim des Eies zum Hinterleib entwickelt haben.*

Hierauf¹⁸⁾ folgt die Beschreibung einer weiteren Zwitterbiene aus dem Stande des Herrn Wittenhagen in Polchow, in welcher auch folgendes Schreiben Wittenhagens über die Entdeckungsgeschichte mitgetheilt wird:

„Am 11. August trieb ich ein drohnenbrütiges Volk, den Nachlass eines abgetriebenen gesunden Zuchtstockes aus. Beim Durchsuchen der wenigen Bienen — gegen 300 — um die etwaige Drohnenmutter oder unfruchtbare Königin herauszufinden, entdeckte ich eine Miniaturdrohne mit auffallend gewandten, nur den Bienen eigenthümlichen Bewegungen. Bei genauer Betrachtung der Bauchseite glaubte ich im ersten Augenblick beim Haschen nach derselben fehlgegriffen zu haben, indem ich eine regelmässig gebildete Biene zu erblicken vermeinte. Doch gewahrte ich auch diesen Irrthum bald genug, indem ich jetzt erst eine Abnormität darin erkannte, die sich von der Rückseite als Drohne, von der Bauchseite als Biene darstellte. Ihre weitere Untersuchung mag darüber entscheiden. Bei wiederholtem Zusehen zu ihrem Volke zeigte diese Drohnenbiene dasselbe Sterzen und freudige Flügelwedeln, wie jede andere entfernt gehaltene Biene gethan haben würde. Die übrigen Bienen kümmerten sich nicht besonders um sie. Bienen eines fremden Stockes verhielten sich gleichgiltig gegen dieselbe. Ihr Stich verursachte dieselbe Wirkung wie jeder andere Bienenstich. Leider blieb bei diesem Versuch der Stachel in meiner Haut sitzen. Der Stachel, welchen ich mit der Spitze zwischen die beiden letzten Ringe gesteckt Ihnen zusende, schien mir etwas kleiner

als gewöhnlich zu sein. Dass die angegebenen Umstände und mitgetheilten Wahrnehmungen reine Wahrheit sind und namentlich der mitfolgende Stachel mit einer Drohnenbiene organisch verwachsen gewesen ist, kann nötigenfalls durch Zeugen erhärtet werden.*

Im Jahre 1861 versuchte H. Hagen*) als der 3. eine Zusammenstellung der bekannten Insectenzwitter zu liefern und zählte unter den 119 zwitterig bekannt gewordenen Insectenarten bereits schon 15 Hymenopteren auf; 3 waren auch diesem hochverdienten Bibliographen entgangen. In demselben Jahre beschrieb auch H. Hammet¹⁹⁾ eine zwitterige Honigbiene, welche er den Bienenzüchtern erst vorgelegt hatte und regte Wittenhagen**) mit den Worten: „Wie stellt sich die Entstehung der Bienenzwitter zur Befruchtungstheorie?“ neuerdings wieder die Frage nach der Entstehung der Bienenzwitter au, indem er schreibt:

a) Entstehen die Zwitter aus besamten oder unbesamten oder bis zu welchem Grade besamten Eiern? b) Uebt die Zelle einen Einfluss auf das gelegte Ei beziehentlich der Vermischung also auch Entwicklung der Geschlechter? c) Uebt der Futterbrei einen Einfluss auf die Entwicklung — Vermischung der Geschlechter? d) Können unbesamte, event. samenlos gewordene Mütter Zwittereier legen? e) Können Aftermütter dies? f) Warum sind die Zwitter kleiner als Normaldrohnen (je grösser, je näher der Drohne, je kleiner, je näher der Biene)? g) Warum vermischt sich bei einem Zwitter das Wesen einer Drohne mit dem Wesen einer Biene, nicht auch mit dem Wesen einer Königin? — Die Beantwortung obiger Fragen scheint mir in Rücksicht auf Dzierzons Befruchtungstheorie äusserst wichtig, weshalb hierauf bezügliche Beobachtungen und Untersuchungen eine Zeitforderung sein dürften. Eine Schwierigkeit für diese Beobachtungen und Untersuchungen liegt in dem mehr zufälligen Auffinden der Bienenzwitter. Vielleicht können meine Wahrnehmungen hiezu behilflich sein. Ich habe Zwitterbienen nur kurz vor bis kurz

*) Hagen H., Insectenzwitter in: Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 259—289 resp. p. 283—285, Nr. 100—114.

**) Wittenhagen —, Ueber Bienencharakteristik und Bienenzwitter in: Bienenzeitg. 1861 p. 119—120.

nach der Schwärmzeit entdeckt und meistens todt auf dem Stande liegend, äusserst selten lebend angetroffen, bei Untersuchungen schwacher oder weiselloser Stöcke; unter letzterem Umstande auch der Hrn. Dr. Dönhoff im vorigen Jahre zugesandten. — Meine Vermuthung über ihr Entstehen ist: dass entweder die Königin ein bestimmtes hohes Stadium der Fruchtbarkeit erreicht haben müsse, in welchem ihre ursprüngliche Fähigkeit, Drohneneier zu legen, zu sehr geweckt ist und diese sich in einzelnen Fällen trotz der Besamung geltend macht, oder aber dass die Zwitter in den Uebergangszellen erbrütet werden, wo bei dem Absetzen des Eies dasselbe eine ungenügende Besamung als Keim einer Arbeitsbiene erhalten hat. Mit dieser letzten Hypothese liesse sich meine Beobachtung in Einklang bringen, nämlich: je grösser der Zwitter, desto näher der Drohne; je kleiner, desto näher der Biene.*

Weiters beschrieb in demselben Jahre C. E. Gerstaecker²⁰⁾ einen Zwitter einer unbestimmten Megachile-Art aus Sizilien, F. Smith²¹⁾ wieder einen solchen von *Apis mellifica* und A. Menzel²²⁾ einen weiteren, „die einäugige Biene“ vom Stande des Herrn Heinr. Märki, Lehrers in Lenzburg.

Waren damit auch bereits schon 5 Fälle von Bienenzwittern bekannt geworden, so waren dies eben nur vereinzelte Funde, über welche überdies noch zu bemerken, ist, dass sie sowohl alle (vielleicht jenen Hamets ausgenommen) der deutschen Rasse angehörten. Um so interessanter und wertvoller war es daher für die Bienenzucht wie für die Wissenschaft, als in demselben Jahre 1862 ein Stock aus dem Stande des Herrn Joh. Jak. Eugster in Konstanz reichliche Ausbeute an Bienenzwittern lieferte, wodurch die gleichzeitige Beobachtung und Untersuchung vieler Bienenzwitter und event. auch Beobachtungen und Untersuchungen über das Auftreten der Mischlingserscheinungen zwischen der deutschen und italienischen Rasse ermöglicht wurden. Der Erste, welcher hierüber berichtete, war wieder A. Menzel. Er schreibt de dato 30. Juli und 10. August 1862 an die Bienenzeitung:

„Wir hatten bereits den Stand des Herrn Eugster verlassen und sassen beim Mittagmahle, als Herr Eugster uns mittheilte,

einer seiner Stöcke stosse seit 3 Jahren alle Sommer in durchschnittlich 3 wochentlichen Pausen todte Bienen von Arbeitsgrösse aber mit den Augenbildungen der Drohnen aus und einzelne dieser ausgestossenen Bienen seien im Besitze eines Stachels. Diese Angaben deuteten so bestimmt auf Zwitterbildung, dass ich trotz der kurz bemessenen Zeit Herrn Eugster um nochmaligen Besuch des Standes ersuchte, auf dem der wunderbare Stock sich befindet, zumal mich derselbe des Bestimmtesten versichert hatte, dass die Zwitterbienen nur in einer Parthie einer Wabe erbrütet würden und dass diese Parthie aus regelmässig sechsseitigen Zellen bestehe, die in der Grösse die Mitte halten zwischen Arbeiter- und Drohnenzellen. Bei unserer Ankunft suchten wir nach solchen Bienen und fanden wirklich deren 3; dagegen mussten wir der kurz zugemessenen Zeit wegen auf Eröffnung des Stockes und auf Untersuchung der fraglichen Wabe verzichten^a.

Zugleich veröffentlichte derselbe *) auch einen historischen Ueberblick über die ihm bisher bekannt gewordenen Bienenzwitter. Er schreibt:

„Zwitterbienen erscheinen im Frühling und Sommer, namentlich kurz vor bis kurz nach der Schwärmerperiode, beim Eugster'schen Zwitterstock durch die ganze Periode des Brutgeschäfts. In der Regel erscheinen sie sehr vereinzelt und selten: bei dem Eugster'schen Zwitterstock in dreiwöchentlichen Brutschüben und zwar seit dreijährigem Zeitraum ohne Unterbrechung. Nach Wittenhagen sollen, was ich jedoch sehr bezweifeln möchte, Zwitter besonders gerne in weisellosen und zwar schwachen Stöcken erscheinen**), der Eugster'sche Zwitterstock ist weiselrichtig, volkreich und war noch Ende Juli im Besitze einzelner vollkommen normaler Drohnen neben zahlreicher Arbeitsbrut. Nach Wittenhagen werden die Zwitter in den Uebergangszellen erbrütet, nach Eugster in einer einzigen Wabe seines Zwitterstocks und zwar in einem begrenzten Stücke derselben, welches aus regelmässig sechseckigen Zellen besteht, die in Grösse das Mittel halten zwischen

*) Menzel A., Hymenopterologische Beobachtungen. I. Ueber die Geschlechtsverhältnisse der Bienen im Allgemeinen und über die Befruchtung der Königin, über Parthenogenesis und Zwitterbildung im Besonderen in: Mitth. Schweiz. entom. Ges. I. Bd. 2. Heft 1862 p. 15—20.

**) Es müssten denn dieselben daselbst Zuflucht suchen und finden.

Arbeiter- und Drohnenzellen. Die meisten Zwitterbienen werden alsbald nach dem Ausschlüpfen aus ihrer Zelle von den Arbeitern getödtet oder aus dem Stocke getrieben, einzelne aber werden auch geduldet, wahrscheinlich dann, wenn in ihnen der Charakter des Arbeiters so vorwiegt, dass sie wirklich zum Verrichten der Arbeit geschickt werden und sich wie Arbeiter benehmen. Dies war der Fall mit der Wittenhagen'schen Zwitterbiene, ehe sie gestochen und dabei den Stachel verloren hatte: sie benahm sich während des Lebens ganz wie eine Arbeitsbiene, fächelte und sterzte und war, wie sich später erwies, mit Wachtblättchen besetzt, obwohl sie die Kopfbildung und am Rücken des Hinterleibs die Schienenbildung der Drohne hatte.

Bei den Zwitterbienen lassen sich vielerlei Stufen und Grade der Geschlechtsvermischung von den schwächsten Andeutungen des Auftretens eines zweiten Geschlechtscharakters bis zur schärfsten Ausprägung der Vereinigung beider Geschlechtscharaktere verfolgen und diese Combinationen werden um so unbegrenzter in Zahl, da die Geschlechtsdifferenzen theils auf die hinter einander liegenden Körperabschnitte, ja selbst auf einzelne Ringe beschränkt sind, theils auf die beiden Seiten sich vertheilen, theils nach den Körperringen und Seiten, und sogar nach der Rücken- und Bauchseite wechseln. Bei der seitlichen Vertheilung kommen bisweilen Dislocationen oder Verrückungen der Netz- oder der Punktaugen, Verschmelzungen der erstern, wohl auch Kleinerwerden oder gar Verschwinden der letztern vor, (durch Verschmelzung der Netzaugen und gleichzeitiges Verschwinden der Punktaugen ist Hubers einäugige Biene entstanden, mit welcher der Märki'sche Bienenzwitter genau übereinstimmt). Bei allen Zwitterbienen sind die Geschlechtsorgane verkümmert und bemerkenswerth erscheint mir, dass in allen von mir anatomisch untersuchten Fällen (anderweitige Untersuchungen sind mir keine bekannt) diese Organe sowohl innerlich als äusserlich nur nach Einem Typus gebaut, d. h. nie zwitterig erschienen. — Die Körpergrösse der Zwitterbiene ist kaum von derjenigen der Arbeiter verschieden; nach Wittenhagen soll sie dagegen nicht unerhebliche Verschiedenheiten zeigen und sie sollen um so grösser sein, je mehr sich der Drohnencharakter geltend gemacht hat. — Es würde zu weit führen, auch nur einigermaßen ins Detail einzugehen; ich begnüge mich daher, Sie um aufmerksame Betrachtung der von mir ausgestellten Repräsentanten der Zwitterbildung zu bitten und noch Einiges über die Ursachen dieser Erscheinung hinzuzufügen. Die Ursachen der Zwitterbildung sind leider noch in dichtes Dunkel gehüllt; nur so viel dürfte klar sein, dass derselben abnorme Verhältnisse zu

Gründe liegen müssen. Dürfen wir uns als solche vielleicht folgende vorstellen?

- 1) Zeitweilige gesteigerte Disposition oder Neigung der Königin zur Drohneneierlage bei gleichzeitiger Unterlassung des Verschlusses der Samenblase (Wittenhagen);
- 2) Aussergewöhnliche Grösseneinwirkung der Zellen auf die Eier legende Königin;
- 3) Aussergewöhnliche Beschaffenheit des Eies, wie etwa
 - a) eine noch vor dem Abgang aus dem Eierstock erlangte hohe Potenzirung der männlichen Wesenheit seines Inhalts, oder in einzelnen Fällen vielleicht auch in einem oder dem andern Eie,
 - b) das Vorkommen zweier Dotter, von denen nur der eine befruchtet wird (Dr. Dönhoff);
- 4) Unvollkommene Befruchtungsenergie einzelner Samenfäden.
- 5) Verzögerter Eintritt des Samenfadens, sei's ganz oder zum Theil, ins Innere des Eies;
- 6) Langsame Auflösung und Vertheilung oder ungleichmässige Vertheilung der Masse des Samenfadens im Dotter, selbstständige Entwicklung des Samenfadenkeims und Eikeims, jedoch mit Verschmelzung beider unter einander (Dr. Dönhoff);
- 7) Störungen im gleichmässigen Fortschritt des Entwicklungsganges, daher Auftreten localer Hemmungsbildungen, die sich stellenweise in Hervorbildung der Drohnencharaktere ausprägen;
- 8) Zeitweise Störungen in der Brutpflege, vielleicht im ganzen Haushalte der Bienen.

Welche von diesen Vorstellungen, ja ob überhaupt eine derselben richtig sei, darüber muss der Entscheid der Zukunft überlassen werden; eben so wenig lässt sich jetzt schon bestimmen, ob einer der in ihnen bezeichneten Fälle allein schon zur Hervorbringung von Zwitterbildung genüge, oder ob dieselbe, was wohl wahrscheinlicher sein dürfte, ein Zusammenwirken mehrerer verlange. Uebrigens mag wohl die Reihe möglicher Ursachen noch lange nicht erschöpft sein.

Wie dem nun sein mag, so viel ist gewiss, dass die Zwitterbildung zur Lehre von der jungfräulichen Zeugung in innigster Beziehung steht. Niemand kann sich verhehlen, dass die Annahme einer Parthenogenesis bei den Bienen fallen müsste, wenn die Wittenhagen'sche Behauptung „die Zwitterbildung komme besonders in weisellosen Stöcken vor“, in dem vollen Umfange ihrer Bedeutung sich als richtig erweisen würde. Lassen wir uns aber

durch diese Behauptung nicht beirren. Es ist ein grosser Unterschied zwischen Stöcken, welche erst seit Kurzem weisellos geworden sind und zwischen solchen, die schon seit langer Zeit am Mangel einer vollständig fruchtbaren Königin leiden. Herr Wittenhagen wird sicher nur von jenen reden, und da können wir getrost ihm beipflichten, da nach dem Abgang der fruchtbaren Königin deren bis dahin stattgehabte geschlechtliche Thätigkeit noch volle drei Wochen deutliche Spuren der Nachwirkung hinterlassen kann. Hegen wir vielmehr die tröstliche Hoffnung, welche bei mir wenigstens als Ueberzeugung feststeht, dass die Ergebnisse der Beobachtungen und Untersuchungen an Zwitterbienen den Schlussstein in der Beweisreihe für die Parthenogenese bilden werden.*

Im März 1863 folgten dann weitere Mittheilungen A. Menzel's²³⁾,²⁴⁾ über den Befund des Eugster'schen Stockes.

Auf Grund weiterer Vereinbarungen wurden diese Zwitterbienen, von denen A. Menzel bereits 30, darunter 8 lebende Stücke untersucht hatte, in 87 Stücken durch Prof v. Siebold²⁵⁾ auch auf den anatomischen Bau, untersucht; den hochinteressanten Untersuchungsergebnissen folgen dann auch Ausführungen über die Frage der Entstehung der Zwitterbienen und über die Stellung derselben zur Parthenogenese.

Die Resultate der von mir unternommenen vielfachen Zergliederungen (ich habe über 87 zergliederte Zwitterbienen die Sectionsprotokolle hier vor mir liegen) stimmen mit den Untersuchungen *Dönhoff's* und *Menzel's* nicht überein; Dr. *Dönhoff**) fand in dem von ihm secirten Zwitter vollständige männliche Geschlechtswerkzeuge, und *Menzel***) sah in allen von ihm anatomisch untersuchten Zwittern die Geschlechtsorgane verkümmert. Derselbe hob als besonders bemerkenswerth wörtlich hervor: „Dass in allen von mir (*Menzel*) anatomisch untersuchten Fällen diese Organe (Geschlechtsorgane) sowohl innerlich als äusserlich nur nach Einem Typus gebaut, d. h. nie zwittrig erschienen“, während ich an den von mir zergliederten Zwitterbienen nicht bloss ein Gemisch derjenigen Organe vorfand, welche in keiner directen Beziehung zu den Geschlechtsfunctionen stehen, sondern auch sehr

*) S. die Bienenzeitung, 1860, pag. 174.

**) *Menzel*: Ueber die Geschlechtsverhältnisse etc. a. a. O. pag. 28.

oft eine vollständige Durcheinandermengung der männlichen und weiblichen Geschlechtswerkzeuge ganz deutlich erkannte, so weit letztere bei Arbeiterinnen überhaupt ihre Entwicklung erreichen können.

Es fragt sich nun: wie lässt sich diese auffallende Erscheinung mit der *Dzierzon'schen* Zeugungstheorie der Bienen in Einklang bringen, oder: erleidet etwa diese Theorie durch den merkwürdigen *Eugster'schen* Bienenstock einen Stoss?

Meine Antwort auf diese Frage geht dahin: „die *Dzierzon'sche* Theorie steht jetzt noch ebenso fest als vorher, ja, dieselbe wird durch jenen Zwitter erzeugenden Bienenstock nur noch mehr befestigt;“ denn mit keiner andern Zeugungstheorie lässt sich das oben beschriebene Phänomen befriedigend erklären. Ich will es versuchen, mit Hilfe der *Dzierzon-Theorie* das Zustandekommen jener vielen und so sehr verschiedenen Zwitterformen zu erklären mit dem ausdrücklichen Bemerken, dass diese meine Erklärung nur als eine Hypothese hinzunehmen sei.

Bei der Fortpflanzung der Bienen kommt es nach der *Dzierzon'schen* Theorie darauf an, dass die Eier, welche unbefruchtet gelegt sich durch Parthenogenesis zu männlichen Bienen entwickeln, von der Königin während des Legens befruchtet werden, damit sich Arbeiter daraus entwickeln können. Während also bei andern Thieren der befruchtende männliche Samen dazu dient, die Eier überhaupt zur Entwicklung zu bringen, ist der Einfluss des Drohnensamens dahin gerichtet, den durch Parthenogenesis an sich entwicklungsfähigen, aber nur einseitig männliche Individuen erzeugenden Eiern die Entwicklung von weiblichen Individuen einzuprägen. Man ist berechtigt, anzunehmen, dass ein gewisses Minimum von Samenmasse ausreicht, die Thiereier zu befruchten: würde eine noch geringere Samenquantität, als das von der Natur vorgeschriebene Minimum beträgt, auf ein zu befruchtendes Thierei einwirken, so dürfte höchst wahrscheinlich der Befruchtungsprocess gar nicht zu Stande kommen und ein solches Thierei könnte sich alsdann gar nicht entwickeln. Anders wird sich eine unzureichende Menge von Samen einem Bienenei gegenüber verhalten. Dieses letztere ist durch Parthenogenesis ohne vorausgegangene Befruchtung schon entwicklungsfähig, jedoch nur im Stande, eine Drohne zu erzeugen; die Befruchtung stimmt das Bienenei so um, dass statt einer männlichen eine weibliche Biene daraus erzeugt wird. Zu einer solchen Umstimmung ist höchst wahrscheinlich eine gewisse Anzahl Samenfäden nöthig. Mengt sich nun, durch irgend einen Umstand verhindert,

nicht die erforderliche Anzahl von Samenfäden dem Eiuhalte bei, so wird ein Bienenei, das ohne Befruchtung eine Drobne erzeugt, unter dem Einflusse der unzureichenden Anzahl von Samenfäden zwar nicht zur Erzeugung einer weiblichen Biene gelangen können, aber doch durch die Beimischung einzelner Samenfäden in der parthenogenetischen Entwicklung einer reinen Drohne in der Art gestört werden, dass sich theilweise weibliche Organisationsverhältnisse mit einmengen, durch welche unvollkommene Befruchtung die oben erwähnten verschiedenen Grade von Zwitterformen zu Stände kommen.

Worin die Hindernisse bestehen, durch welche eine Bienenkönigin veranlasst wird, ihre für Arbeiterinnen bestimmten Eier unvollkommen zu befruchten, darüber kann ich vor der Hand freilich keine Auskunft geben.

Dieser Zwitter erzeugende *Eugster'sche* Bienenstock giebt uns übrigens noch eine sehr gute Waffe in die Hand, um damit den Widerspruch zu bekämpfen, der immer noch bis auf die neueste Zeit, sogar von Naturforschern gegen die Parthenogenese erhoben wird. Erst ganz kürzlich hat Herr Dr. *Schaum* *) die Parthenogenese dadurch zu verdächtigen gesucht, dass er behauptet, alle jene merkwürdigen Fälle von parthenogenetischer Entwicklung der Insecteneier liessen sich einfach durch Vorhandensein einer Zwitterbildung erklären. Dass *Leuckart* und ich während der vielfachen von uns vorgenommenen Zergliederung derjenigen Insecten, bei denen sich eine parthenogenetische Fortpflanzung herausstellte, eine vorhandene Zwitterbildung erkannt haben würden, das wird man uns wohl zutrauen, da wir bei allen unsern auf Parthenogenese sich beziehenden Untersuchungen stets darauf bedacht waren, die irgendwo etwa versteckten Samenfäden ausfindig zu machen. In dem *Eugster'schen* Bienenstocke fanden sich aber wirklich solche Zwitter, wie sie die Gegner der Parthenogenese nicht vollkommener verlangen können; aber das Verhalten der normalen Arbeiter, gegenüber diesen missbildeten Bienen, zeigt, dass letztere niemals zum Eierlegen gelangen können, da sie, wenn sich in ihren anfangs leeren Eierstöcken auch später Eier ausgebildet hätten, gleich nach ihrer Entpuppung von den normalen Arbeitern zum Verlassen des Bienenstocks gezwungen werden. Nach der Annahme der Gegner der Parthenogenese müsste in jedem Bienenstocke die Königin ein Zwitter sein, während gerade

*) S. Berliner entomologische Zeitschrift, Bd. II. Berlin 1858 p. 93.

in flügelahmen und drohnenbrütigen Königinnen, die oft genug von *Leuckart* und mir auf das sorgfältigste untersucht worden sind, keine Spur von Zwitterbildung oder von Samenfäden überhaupt angetroffen wird.

Schliesslich will ich noch die Ueberzeugung aussprechen, dass Zwitterbildungen bei den Bienenvölkern gar nicht so selten vorkommen werden und dass dieselben bisher nur übersehen worden sind. Sollten in einem oder dem andern Stocke Ihrer Bienencolonien der Zwitterbildung verdächtige Individuen auftauchen, so bin ich gern bereit, mit meinen Kräften den Thatbestand solcher Abnormitäten festzustellen. Endlich darf ich es nicht unterlassen, für die äusserst zuvorkommende Weise, mit welcher Herr *Eugster* meine Untersuchungen seiner Bienenstöcke unterstützte und erleichterte, die grösste Anerkennung hier öffentlich auszusprechen.“

Damit war sozusagen das Höchste erreicht, was man auf diesem Felde erreichen konnte: die Möglichkeit, eine grosse Anzahl von gynandromorphen Formen in ihrem Werden zu beobachten und in ihrem Auftreten zu untersuchen; in der Folge finden wir daher nur mehr Einzelbeschreibungen von den weiterhin beobachteten Zwittern. Zunächst ergänzte 1863 H. Hagen^{*)} seine frühere Liste von Insectenzwittern und brachte die Zahl auf 120 bekannte Formen, darunter 4 bereits längst beschriebene Hymenopterenzwitter: 1864 berichtet auch C. E. Gerstäcker²⁶⁾ über die Eugster'schen Zwitterbienen und bemerkt: „Als analoge Zwitterbildung unter den Hymenopteren wurde besonders eine *Formica sanguinea* und eine *Megachile* der hiesigen entomologischen Sammlung gedacht, welche trotz der auffallenden sexuellen Differenzen jener Gattungen zu den regelmässig median getheilten Zwittern gehören“. In demselben Jahre meldet A. Menzel^{**)} den inzwischen erfolgten Tod der zwitterbrütigen

^{*)} Hagen H., Insectenzwitter in: Stettin. entom. Zeitg. XXIV. 1863 p. 189—195 Nr. 105^b, 107^b, 108, 114.

^{**)} Menzel A., Tod der Zwittermutter des Eugster'schen Stockes in Konstanz in: Bienenzeitung XX. 1864 p. 163.

Weisel des Eugster'schen Zwitterstockes mit folgenden Worten:

„Eben erfahre ich durch eine mündliche Mittheilung des Herrn Prof. v. Siebold, dass die Eugster'sche Zwittermutter gestorben und auch ihr Leichnam nicht mehr gefunden worden ist. Es ist dies für die Wissenschaft und für die Bienenkunde ein unersetzbarer Verlust, da der Schlussstein der Untersuchungen über die Zwitterbildung und ihre Ursachen fehlt. Besonders aber ist zu bedauern, dass im vorigen Sommer von derselben nicht möglichst viele Töchter nachgezogen und erhalten wurden. Denn wenn die Zwitterzeugung, was freilich nach dem spurlosen Abgange der Zwittermutter unentschieden bleiben muss, in einer fehlerhaften Organisation der Königin bestand (noch kann ich von der Ansicht nicht lassen, dass die Ursache in diesem Falle in einer abnormen und zwar mangelhaften Entwicklung einzelner Spermatozoidengruppen derjenigen Drohne, mit der die Königin den Begattungsact vollzogen hatte, zu suchen sei), so dürfte nach anderweitigen Erfahrungen über Vererbung von Organisationsfehlern auf die nächstfolgende oder gar dritte Generation u. s. w. gar wohl die Annahme zulässig sein, dass auch hier die Vererbung der geschlechtlichen Organisationsabweichungen von der Mutter auf einzelne ihrer Töchter ins Reich der Möglichkeit gehört hätte. Wäre nun eine derartige Vererbung eingetreten, dann hätte die Wissenschaft in ununterbrochenem Fortgange über ein reiches Material von ausserordentlicher Tragweite zu verfügen gehabt, während jetzt vielleicht Jahrzehende wo nicht Jahrhunderte ablaufen können. (mit Wiederholung von ganzen Zwitterbrutschüben durch alle Brutperioden im Leben einer Königin, also möglicherweise durch 5 Jahrgänge hindurch) ehe wieder ein solcher Fall auftreten dürfte.“

Bald nachher wurde jedoch Menzels Mittheilung durch den Waisenhauslehrer Ed. Schmid in Constanz widerlegt:

„Herrn Prof. Menzel diene auf seinen Aufsatz in Nr. 13 1864 dieser Zeitung zur gefälligen Nachricht, dass voriges Jahr von dem bekannten Eugster'schen Zwitterbienen erzeugenden Stocke Ableger gemacht wurden, dass aber sämtliche Brut der nachgezogenen Mütter normal gewesen. Dagegen ist die nachgezogene Mutter im Zwitterstocke selbst wieder Zwittermutter. Die Zwitter unterscheiden sich von denen der ersten Mutter bloss durch die Farbe. Während nämlich diese gelb gewesen, sind die jetzigen mehr schwarz; ein deutlicher Beweis, dass die alte Mutter

wirklich abgegangen und eine neue nachgezogen und von einer schwarzen Drohne befruchtet worden ist.

Da der betreffende Zwitterstock schon voriges Jahr von Herrn Prof. v. Siebold in München zum Zwecke eigener Untersuchung als Eigenthum erworben wurde, so kann selbstverständlich ohne dessen ausdrückliche Ermächtigung von anderweitiger Untersuchung durch dritte Personen keine Rede sein, und Herr Eugster bedauert aufrichtig, nichts mehr zur Aufklärung der so interessanten Zwitterbildung beitragen zu können.*

Daraufhin berichtete und berichtigte Menzel*) nochmals über den Eugster'schen Stock:

Gestern an der Herbstversammlung der Thurgauischen Bienenwirthe in Mattwil, als deren Ehrenmitglied ich mich zum Besuche verpflichtet fühlte, hatte ich eine grosse, theils ungemein freudige, theils aber auch nicht besonders angenehme Ueberraschung. Ich traf dort mit Herrn Eugster und Herrn Lehrer Ed. Schmid aus Constanz zusammen, welche die Versammlung mit ihrem Besuche beehrt hatten; von ihnen aber erfuhr ich, dass die Bienen des Eugster'schen Zwitterstockes nach dem Verluste der Zwittermutter eine Nachschaffungskönigin erzogen, die glücklich befruchtet, sich später als Zwittermutter erwies. Die zwitterige Nachkommenschaft der sekundären Zwittermutter zeige übrigens nicht den Charakter von Blendlingen, sondern von Mestizen, daher die Nachwirkung des italienischen Blutes bereits ziemlich geschwächt, dagegen diejenige des deutschen mehr herrschend sei. Die jetzigen Zwitter seien dem entsprechend auch weniger auffallend als die früheren, immerhin aber höchst interessant.

Somit hat sich die Fähigkeit der Zwitterzeugung von der Mutter wenigstens auf diejenige Tochter vererbt, die in dem ursprünglichen Zwitterstocke nach dem Abgang der ersten zur Herrschaft gelangte, und es dürfte ferner noch bewiesen sein, dass der nächste Grund zur Zwitterbildung in den beiden vorliegenden Fällen nicht in der Drohne und in der Befruchtung der Eier, nämlich weder in eigenthümlicher Beschaffenheit des Samens, noch in der Zahl der ins Ei eingedrungenen Spermatozoiden, sondern zuverlässig in abnormer Organisation der innern Geschlechtsorgane der Königin, bestehe die Abnormalität in Verengerung des Leitungsapparates bis zur Einmündungsstelle der Samenblase oder

*) Menzel A., Berichtigung (in Angelegenheit der Eugster'schen Zwittermutter) in: Bienenzeitg. XXI. 1865 p. 13.

in Verengerung einzelner Eiröhren, daher in Verlangsamung der Passage einer Partie der Eier überhaupt oder der Eier, welche in den verengten Eiröhren herabstiegen, zu suchen sei, wie schon früher Herr Pastor Kleine vermuthet hatte. (Eine abnorme Vergrößerung, resp. ein Druck anderer Eingeweide des Hinterleibs auf den Leitungsapparat der Eier, bis zu der genannten Grenze, könnte möglicherweise zu gleichem Resultate führen.) Eine geringe Verlangsamung der Passage des Eies und eine dem entsprechend etwas zu spät erfolgte Befruchtung von der Samenblase her würde nach der Thury'schen Zeugungstheorie die Zwitterbildung erklären lassen, da der Eintritt der Spermatozoiden dannzumal zwar nicht zur Hervorbildung des vollen weiblichen Charakters bei dem im Eie sich entwickelnden Thiere genugsam anregen würde, immerhin aber mehr oder weniger zu einer Geltendmachung desselben neben dem männlichen Charakter zu führen vermöchte.

Ob sich die Fähigkeit der Zwitterzeugung auch auf andere Töchter der Zwittermutter vererbt hat, müssen spätere fortgesetzte Beobachtungen lehren. Herr Eugster hat nämlich, wie er mir mitgetheilt, auch andere Töchter derselben zur Bildung von Ablegern verwendet und bedauert, nicht genau zu wissen, welche seiner Ableger gerade im Besitze solcher seien. Uebrigens hat er bereits vor einem andern Stocke Zwitter gefunden und es wäre gar wohl möglich, dass dieser Stock eine Tochter der Zwittermutter zur Königin habe.*

Endlich übergab Prof. v. Siebold *) folgende — leider abschliessende Mittheilung der Oeffentlichkeit:

In Bezug auf die Todesanzeige der Eugster'schen Zwitter erzeugenden Bienenkönigin, welche Herr Menzel von der Schweiz aus in Nro. 13 dieser Zeitung unterm 21. Mai d. J. abdrucken liess, kann ich die freudige Nachricht mittheilen, dass der Abgang dieser merkwürdigen Bienenkönigin in demselben Stocke durch eine junge, ebenfalls Zwitter erzeugende Königin ersetzt worden ist.

Das Absterben jener Königin konnte nicht überraschen, da dieselbe bereits das Alter von fünf Jahren weniger zwei Monate erreicht hatte. Dieser letztere Umstand war es auch, welcher Eugster veranlasst hatte, diese Königin nicht den Gefahren der

*) Siebold Th., Ersatz der abgestorbenen Zwittermutter des Eugster'schen Zwitterstockes in Constanx in: Bienenzeitg. 1866 p. 14—16.

Versendung auszusetzen, obgleich letzteres von verschiedenen Seiten gewünscht worden war, damit diese interessante Königin von anderen Bienenzüchtern zu Beobachtungen und Experimenten hätte benutzt werden können.

Die bedauerliche Nachricht von dem Tode jener alten Zwitter erzeugenden Königin erhielt Herr Menzel durch mich während meiner Anwesenheit in Zürich am 21. Mai, und zwar in Folge eines Briefes, den mir Herr Eugster unterm 29. April d. J. hatte zukommen lassen und in welchem derselbe schrieb:

„Dass ich Ihr werthes Schreiben so lange nicht beantwortet, hatte seinen Grund darin, dass ich glaubte, Ihnen frische Zwitter senden zu können. Leider ist dies aber nicht mehr möglich. Ob schon ich mir alle Mühe gegeben habe, den Stock gut zu überwintern, indem ich ihn im Herbste sowohl mit Bienen verstärkte als auch mit Honig versorgte, und obschon sich bei meiner ersten Visitation im Februar die alte Königin ganz gesund und munter zeigte, so war meine Hoffnung, im April Zwitter zum Vorschein kommen zu sehen, dennoch eine vergebliche gewesen. Ich nahm diese Woche eine zweite Visitation vor, wobei ich den Stock stark mit Brut besetzt fand, aber die alte italienische Königin fehlte, und an ihrer Stelle befand sich eine schwarze Königin im Stocke.“

Von meiner Pfingstreise aus der Schweiz hieher zurückgekehrt, fand ich einen am 11. Mai geschriebenen Brief vor, worin mir Herr Eugster schrieb:

„Soeben habe ich wieder Zwitter gefunden, die Sie anbei erhalten, und zwar ist eine Zwitterbiene dabei (die grösste), welche einen vollkommenen Drohnenkopf und einen vollkommenen Stachel besitzt und zwar in der Art, dass sie mich, während ich sie in der Hand nach Hause trug, gestochen hat.“

Bald nach dieser sehr erfreulichen Nachricht erhielt ich ein zweites Schreiben, in welchem sich Herr Eugster am 26. Mai wie folgt äusserte:

„Unter dem 11. dieses hatte ich das Vergnügen, Ihnen ein Paquet mit frischen Zwitterbienen zu senden: da ich aber bis heute keine Antwort erhalten habe, so vermute ich, dass Sie solches nicht bekommen haben*). deswegen setze ich Sie noch-

*) Dass ich Eugster's Schreiben und Bienensendung in der ersten Zeit ohne Antwort gelassen habe, erklärt sich aus der Schweizer Pfingstreise, welche ich vom 13. bis 22. Mai d. J. über Romanshorn, Winterthur, Schaff-

mals in Kenntniss, dass der nämliche Stock mit der neuen Königin ebenfalls wieder Zwitter hervorbringt, aber nur einzelne. Der Stock ist schwach, vielleicht dass mehr Zwitter kommen werden, wenn er erstarkt sein wird. Dass diese Zwitter von einer anderen Mutter herkommen, beweist ihre Farbe.“

In der That verriethen die mir gesendeten Zwitterbienen nicht mehr eine italienische, sondern vielmehr eine deutsche Abstammung, da sie an ihren Hinterleibs-Segmenten keine Spur von rothgelben Zeichnungen unterscheiden liessen. Um auch diese von der jungen neuen Königin hervorgebrachten Zwitter genauer untersuchen zu können, begab ich mich mit einem meiner Schüler, Herrn Franken, am 29. Juni nach Constanz. Dieser letztere übernahm die Ausführung von Zeichnungen derjenigen von mir angefertigten mikroskopischen Präparate, welche als sehr merkwürdige Abweichungen und Verschmelzungen der weiblichen und männlichen Geschlechtswerkzeuge ganz besonders interessant erschienen. Auf diese Weise wurde es mir möglich, in sehr kurzer Zeit eine gehörige Anzahl mikroskopischer Untersuchungen anzustellen. Indem ich im Ganzen 136 Zergliederungen an Zwitterbienen vorgenommen habe und ausserdem noch im Besitze von einer viel grösseren Anzahl von Zwitterbienen bin, welche theils in Weingeist, theils trocken auf Nadeln aufbewahrt sind, so glaube ich jetzt mit einem reichlichen Material ausgerüstet zu sein, um demnächst an die genaue Beschreibung und Darstellung dieses merkwürdigen Zwitterbienenvolks gehen zu können.

Wenn ich bis jetzt diesen Zwitter erzeugenden Bienenstock nur in der Weise wissenschaftlich ausgebeutet habe, dass ich

hausen, Basel, Neuchâtel, Luzern und Zürich unternommen habe. Da ich auf dieser Reise weder Constanz berührt noch Herrn Eugster gesprochen habe, so konnte ich bei meinem Besuche in Zürich am 21. Mai Herrn Menzel „die Vererbung der Fähigkeit zur Zwittererzeugung“ auch nicht verschwiegen haben, wie mir dies Herr Menzel in einer Zuschrift an den Herrn Redacteur dieser Zeitung ganz mit Unrecht vorwirft. — Ich wiederhole es: erst nach meiner Rückkehr am 23. Mai fand ich Eugster's Brief vom 11. Mai in München vor, und erst jetzt erfuhr ich, dass der Eugster'sche Zwitterstock eine neue ebenfalls Zwitter erzeugende Königin erhalten habe. Herr Menzel hat sich auch darin geirrt, wenn er in demselben Briefe behauptet, ich sei „unmittelbar nach einem Besuche des Eugster'schen Bienenstandes“ bei ihm gewesen. Ich habe in diesem Jahre zuerst am 29. Juni den Eugster'schen Bienenstand in Constanz wiedergesehen.

möglichst viele und genaue Zergliederungen dieser Zwitter vornahm, so geschah dies deshalb, weil bisher dergleichen Zergliederungen von nur ganz vereinzelt beobachteten Zwitter-Insekten entweder gänzlich unterlassen worden waren, oder nur höchst unvollkommen zu Stande gebracht werden konnten, indem die Erzieher oder Besitzer solcher Zwitter, welche meistens der Ordnung der Schmetterlinge angehörten*), solche Seltenheiten der Seciradel nicht opfern wollten.

Eine zweite Aufgabe wäre gewesen, diese Zwitterbienen länger am Leben zu erhalten, damit dieselben, nachdem sie flugbar geworden, in ihrem Thun und Treiben hätten beobachtet werden können. Es ist in dieser Beziehung mehrmals von Bienenzüchtern die Frage an mich ergangen, ob es Herr Eugster nicht verstanden habe, die Zwitterbienen länger am Leben zu erhalten, damit sie an den verschiedenen Verrichtungen der Arbeitsbienen hätten Theil nehmen können. Aus dem, was ich an dem Eugster'schen Zwitterstocke und an dessen Zwitterbienen habe wahrnehmen können, bin ich jedoch zur Ueberzeugung gekommen, dass es den erfahrensten und umsichtigsten Bienenzüchtern nicht gelungen sein würde, die vollständige Erziehung dieser Zwitterbienen zu erreichen. Was zunächst die Aufnahme von Nahrung betrifft, so waren die meisten dieser Zwitter hieran behindert, da ihre Mundtheile fast durchgängig entweder missbildet, verbogen oder ungleich entwickelt waren. Von den beiden Oberkiefern war bald der rechte, bald der linke unverhältnissmässig kleiner und kürzer, als der auf der entgegengesetzten Seite, so dass diese beiden wichtigen Werkzeuge nicht im Geringsten zu einander passten und zu jeder gemeinschaftlichen Arbeit durchaus untauglich waren. In einem ähnlichen Missverhältnisse befanden sich fast durchgängig die Beine zu einander, indem die Beine der einen Seite den einfachen Drohnenbeinen glichen, während die der anderen Seite in Gestalt der einzelnen Glieder, sowie in der Behaarung und Bestachelung derselben ganz den Beinen der Arbeitsbienen entsprachen. Da bei den Arbeitsbienen die Möglichkeit der den Beinen zugewiesenen Verrichtungen auf Gegenseitigkeit beruht, so war für solche ungleich entwickelten Beine eine

*) Unter 119 beobachteten Fällen von Insekten-Zwittern, welche Hagen (in der Stettiner entomologischen Zeitung 1861 pag. 259) zusammengestellt hat, gehören 99 den Schmetterlingen und 5 den bienenartigen Insecten an.

gegenseitige Unterstützung und mithin eine Thätigkeit, welche normal gebildete Arbeitsbienen mit ihren Beinen zu verrichten haben, jedenfalls unmöglich. Mit diesen wenigen Andeutungen will ich nur darauf hinweisen, dass das Benehmen der normalen Arbeitsbienen vollkommen gerechtfertigt erscheint, wenn sie dem Drange ihres Instinktes folgten und, wie ich früher bereits gemeldet, alle diese Zwitter aus dem Stocke verjagten, ohne auch nur die geringste Miene zu machen, eine Pflege und Erhaltung derselben zu ermöglichen, da solche missbildete und arbeitsunfähige Individuen ihrem Stocke doch nichts genützt haben würden. Wir finden hier bei den Bienen denselben Trieb, verkrüppelte und missgestaltete Nachkommenschaft aus ihrer Gesellschaft entfernt zu halten, wie ein solcher in der übrigen Thierwelt allgemein verbreitet vorkommt.

Die dritte Aufgabe, zu welcher der Eugster'sche Zwitterstock auffordern musste, nämlich die Versuche, möglichst viele Ableger von diesem merkwürdigen Stocke zu gewinnen, habe ich mir vorbehalten, indem ich mit Herrn Eugster die Verabredung getroffen, diesen Zwitterstock im nächsten Frühjahr hieher nach München überzusiedeln, wo mir unter dem Beistande eines erfahrenen rationellen Bienenzüchters die Vervielfältigung dieses Zwitter erzeugenden Stockes hoffentlich gelingen wird. Ich sage „hoffentlich“, weil in den Ablegern, welche von diesem Zwitterstocke durch Herrn Eugster gemacht worden sind, die Bienenmütter keine Zwitter, sondern nur normale Brut erzeugt haben.

Es wird mir auf diese Weise die Gelegenheit geboten werden, von einer Zwitter erzeugenden Königin möglichst viele Eier in den verschiedensten Alters- und Entwicklungs-Zuständen zu untersuchen, um die Frage zu lösen, ob von einer Zwitter erzeugenden Königin vielleicht Eier gelegt werden, aus deren verschiedenem Verhalten sich Unterschiede herausstellen könnten zwischen dem normalen Entwicklungsgange einer Arbeiter- oder Drohnen-Larve und einem von diesem abweichenden Entwicklungsverhältnisse, dessen Resultate die Erzeugung von Zwitterformen wären.

Ist die Vermehrung der Zwitter erzeugenden Königin gelungen, dann lässt sich auch eine und die andere dieser abnormen Geschöpfe der Secirlust des Beobachters opfern, um andere wichtige Fragen zu beantworten, nämlich ob und welche Abweichungen vom normalen Zustande solche Zwitter erzeugende Bienenweibchen in sich tragen. Dass auch sie zwitterhaft gebildete Geschlechtswerkzeuge besitzen sollten, möchte ich bezweifeln, da eine hermaphroditische Bienenkönigin vielleicht begattungslustig sein könnte, aber wegen missbildeter Geschlechtswerkzeuge gewiss nicht be-

gattungsfähig sein dürfte. Wollte man annehmen, eine hermaphroditische Bienenkönigin könnte sich selbst befruchten, das heisst, sie könnte ihren Samenbehälter (Receptaculum seminis) mit ihrem eigenen Samen füllen, so muss ich gestehen, dass ich mir keine rechte Vorstellung machen kann, wie sie das mit missbildeten Geschlechtswerkzeugen zu Stande bringen sollte. Ich will indessen davon abstehen, durch blossе Vermuthungen den verschiedenen Untersuchungen vorzugreifen, welche noch nothwendig vorzunehmen sind, um nur über einen Theil aller der Fragen, welche sich an die von dem besprochenen Zwitterstocke ausgehenden Phänomene knüpfen, eine befriedigende Aufklärung zu erhalten.

Die erste mit dem Tod abgegangene Zwitter erzeugende italienische Königin erschien übrigens äusserlich ganz normal gebildet, nirgends war dieselbe, weder am Kopfe, am Leibe noch an den Beinen, mit einem äusseren Zeichen von Zwitterhaftigkeit behaftet. Ihre neue deutsche Nachfolgerin ist jedenfalls im April ausgeschlüpft, wie aus der von Eugster im Stocke vorgefundenen frisch verlassenen Weiselzelle hervorgeht; auch hat diese junge Königin höchst wahrscheinlich um dieselbe Zeit einen Hochzeitsausflug mit Erfolg vollzogen, da sie ausser Zwitter ganz normale Arbeiter erzeugt. Eine im April stattgehabte Begattung einer Bienenkönigin gehört jedenfalls zu den Seltenheiten, aber nicht zu den Unmöglichkeiten, wie dies aus Dzierzon's Erfahrungen hervorgeht^{*)}. Dass eine solche Begattung möglich war, dafür spricht die Anwesenheit von vielen Drohnen, welche Eugster um diese Zeit auf seinem Bienenstande wahrgenommen hat. Herr Eugster schrieb mir am 30. Mai d. J. darüber folgendes: „Am 10. Mai fand ich schon neue Zwitter, folglich musste die Begattung Anfangs April stattgefunden haben, wo doch noch nirgends Drohnen zu finden sind.“ Weiterhin fährt derselbe fort: „Soeben fällt mir noch ein, dass die junge Königin vielleicht von Drohnen aus einem mütterlosen Stocke hätte begattet werden können. Ich habe nämlich einen Stock überwintert, der im September seine Mutter verloren, aber sehr viele Bienen hatte; diese zeugten den ganzen Winter durch viele Drohnen.“

^{*)} Vgl. diese Bienenzeitung, Jahrgang II, pag. 102, wo sich Dzierzon wörtlich dahin äussert: „unmöglich ist die Befruchtung, wenn auch nur eine kleine Drohne vorhanden ist, nicht, obschon sie in den meisten Fällen, wenn eine junge Königin im späten Herbste oder zeitigen Frühjahr erbrütet wird, nicht erfolgt.“

In demselben Jahre beschrieb auch Ed. Ph. Assmus²⁷⁾ einen Bienenzwitter. Nun folgen der Reihe nach Einzelbeschreibungen von gynandromorphen Hymenopteren, meist ohne irgendwelche Erklärungsversuche, nämlich: 1870 beschrieb E. L. Taschenberg²⁸⁾ einen solchen Ichneumon aus Spanien, dem er geradezu den Namen Ichn. hermaphroditus gab; 1871 beschrieb C. F. Schenck²⁹⁾ solche von *Andrena albicus*, *A. convexuscula*, *A. fasciata*, *A. helvola* und *Nomada fucata* und F. Smith³⁰⁾ demonstrierte und beschrieb ausser der schon seit 1836 bekannten *Anthophora acervorum* (früher *retusa* genannt) solche von *A. acervorum* aus der Sammlung Walcott in Bristol, *Andrena thoracica*, *Nomada baccata* aus der Gegend von Meybridge und von *Apis mellifica* aus Exeter, von Mr. Woodbury gesandt. 1872 beschrieb C. E. Gerstäcker³¹⁾ eine gynandromorphe *Abia sericea*, ausnahmsweise auch einmal nach dem innern Bau des Geschlechtsapparates und J. Kriechbaumer³²⁾ berichtete über eine zwischen Triest und Miramare gefangene gynandromorphe *Xylocopa violacea*. Von ganz besonderer Bedeutung aber sind A. Forel's³³⁾ Beobachtungen von nicht weniger als 7 gynandromorphen Ameisen aus der Schweiz, nämlich: 2 *Polyergus rufescens*, *Formica exsecta*, *F. truncicola*, *F. rufibarbis*, *Myrmica ruginodis* und *Ponera punctatissima*. 1874 vermehrte F. Smith³⁴⁾ die Liste der bekannten gynandromorphen Ameisen durch *Myrmica laevinodis* aus Chesthire; 1875 beschrieb v. Hagens³⁵⁾ gynandromorphe Stücke von *Prosopis obscurata*, *Nomada glabella* und *Sphecodes reticulatus*. 1878 beschrieb W. Flett³⁶⁾ und 1879 J. C. Dodge³⁷⁾ wieder je eine Zwitterbiene, letzterer das erste Stück aus Amerika; 1881 beschrieb Cz. C. Ritsema³⁸⁾ einen gynandromorphen *Bombus mastrucatus* und eine ebensolche *Nomada succincta*, 1882 B. Cooke³⁹⁾ einen aus männlichen, weiblichen und Arbeitermerkmalen zusammengesetzten Hermaphroditen von *Myrmica*

laevinodis aus Dano; 1883 F. Enoch⁴⁰⁾ einen gynandromorphen *Macropis labiata* aus Woking; 1884 S. Moesary⁴¹⁾ eine *Pepsis dimidiata*, wozu er eine sehr gute Abbildung lieferte; 1886 G. Adlerz⁴²⁾ eine gynandromorphe *Leptothorax tuberosum* aus Schweden, 1887 F. Konow⁴³⁾ zwei *Nematus umbrinus* Zadd. aus Deutschland, 1888 R. Dittrich⁴⁴⁾ eine gynandromorphe *Andrena praecox* und H. Lucas⁴⁵⁾ zwei zwittrige Honigbienen. Im Jahre 1889 erschien ein an die Arbeiten H. Hagens angeschlossenes Verzeichnis der bis dahin bekannt gewordenen Arthropodenzwitter von Ph. Bertkau^{*}). Dasselbe enthält 315 Nummern, (incl. 120 von H. Hagen), von denen 32 auf Hymenopteren-Arten oder Stücke entfallen; doch ist damit die wirkliche Anzahl keineswegs erschöpft! — Seit dieser Zusammenstellung sind folgende Arten bekannt gemacht worden: 1890 *Myrmica laevinodis* und *M. scabrinodis* durch E. Wasmann⁴⁶⁾, 1891 *Stenamma Westwoodi* durch R. C. Perkins⁴⁷⁾; 1892 *Chalicodoma muraria* durch E. Frey-Gessner⁴⁸⁾, *Halictus cylindricus* und *Macrophya rustica* durch R. Krieger⁴⁹⁾ und *Azteca instabilis* durch A. Forel⁵⁰⁾. Diese letzte Entdeckung ist insoferne noch von besonderer Wichtigkeit, als aus den Merkmalen der männlichen Theile jene des männlichen Geschlechtes überhaupt, das bis dahin noch unbekannt geblieben war, abgeleitet werden konnten. 1893 beschrieb J. Slavicek⁵¹⁾ einen gynandromorphen *Halictus cylindricus* und eine ebensolche *Tenthredo atra*, und 1896 Deprez⁵²⁾ einen gynandromorphen *Automalus alboguttatus*. Im vorabgelaufenen Jahre endlich beschrieb Klapalek⁵³⁾ einen gynandromorphen *Camponotus ligniperdus*. Die Beschreibung, welche

^{*)} Bertkau Ph., Beschreibung eines Zwitters von *Gastropacha quercus* nebst allgemeinen Bemerkungen und einem Verzeichnis der beschriebenen Arthropodenzwitter in: Arch. für Naturg. LV. Bd. 1. 1889 p. 75—116.

A. Tosi *) von einer abnorm gefärbten *Chalicodoma muraria* Fabr. gibt, weist auf ein ♀ in männlichem Farbenkleide, doch keineswegs auf Gynandromorphismus hin. Sie lautet:

„Ai 15. d'aprile del '94 raccolsi sul litorale di Rimini vari esemplari di *Chalicodoma muraria* maschi.

Nel prepararli, rimasi sorpreso nel ritrovare fra questi una femmina che vestiva completamente la divisa dei maschi.

Il FRIESE cita una femmina di *C. muraria* presa nel Vallese, colla livrea di color chiaro che l'avvicinava ai maschi: e ricorda un'altra femmina della stessa specie con livrea consimile presa in Svizzera da FREY-GESSNER, non che due femmine di *C. sicula* avute dalla Spagna che presentavano identicamente la livrea più chiara.

Ma l'esemplare che io possiedo merita particolare menzione per la straordinaria rassomiglianza della sua livrea a quella dei maschi, da cui non è possibile distinguerla a prima vista se non dalla presenza dell'aculeo.

Il colore dei peli del torace e dei tre primi segmenti dell'addome in questa femmina è rosso-fulvo, e la faccia coperta di folti peli bianco-citrini come nei maschi.

Le ali sono ialine, solo leggermente affumicate all'apice.

Le zampe anteriori sono fornite di peli abbastanza folti e lunghi come nei maschi; le unghie dei tarsi sono bifide.

Il segmento anale è come nella femmina, e così pure il ventre è fornito della scopa, però non molto folta.*

Chronologische Literaturliste.

*) Laubender B., Einige Bemerkungen über die von Herrn Schulmeister Lukas neu entdeckten Stacheldrohen in: Oekonom. Hefte XVII. 1801 p. 429—437. Lukas . . . , Vermischte Beiträge zum Fortschritt der Bienenzucht 1803—4; Lukas . . . , Entwurf eines wissenschaftlichen Systems der Bienenzucht I. 1808 p. 150.

*) Tosi A., Note biologiche sulle Apiarie in: Bull. soc. entom. Ital. XXIX. 1897 p. 26—34.

2) Lefebure A., Description d'un Argus Alexis hermaprodite in: Ann. soc. entom. France IV. 1835 p. 145—151.

3) Romand B. de. Notice sur une Scolia sex maculata etc. in: Ann. soc. entom. France IV. 1835 p. 653—656.

4) Shuckard W. E., Entomological Notes in: Entom. Mag. IV. (1836) p. 78—79. — Zoologist Vol. III. 1845 p. 890, fig.; Smith F., Catal. of British Bees 1855 p. 245; Taf. V. Fig. 2—2a.

5) Wesmael C., Sur un Ichneumon gynandromorphe, Ichn. luctatorius in: Bull. acad. sc. Bruxelles III. 1836 p. 337—341; fig.; — L'Institut 1837 p. 89.

6) Curtis J., Tenthredo angulata in: British Entomology 1838 pl. 632.

7) Wesmael C., Sur un Ichneumon gynandromorphe, Ichn. fasciatorius in: Bull. acad. sc. Bruxelles VI. 1839 p. 448—450.

8) Förster A., Notiz über einen Zwitter der Diapria elegans Nees v. Esenb. in: Stettin. entom. Zeitg. VI. 1845 p. 390—392; Taf. I.

9) Wesmael C., Teratologie entomologique in: Bull. acad. sc. Bruxelles XVI. 1849 p. 378—391; fig. — Friep Tagesfrag. I. 1850. p. 153—156. — Schaum Bericht 1849 p. 10.

10) Tischbein, Zwitter von Formica sanguinea in: Stettin. entom. Zeitg. XII. 1851 p. 295—297; 1853. Taf. III. fig. — Vgl. auch Klug ebenda XV. 1854. p. 102.

11) Klug J. Ch., Note zu den auf Taf. 3, 1853 abgebildeten Hermaphroditen in: Stettin. entom. Zeitg. XV. 1854. p. 102—103.

12) Maeklin F. W., On Hermaphroditism bland Insecterne samt beskrifning af en i Helsingfors funne Hermaphrodite af Muttilla obscura Nyl. in: Oefvers. Finsk. Vet. Soc. Förhandl. III. 1856 p. 106—112.

13) Roger J., Ein Zwitter von Tetrogmus caldarius in: Berlin. entom. Zeitschr. I. 1857 p. 15—17; Taf. 1, Fig. 2. — Kraatz G. in: Stettin. entom. Zeitg. XXIII. 1862 p. 125.

14) Ruthe J. F., Ein Bracon-Zwitter, Blacus maculipes in: Stettin. entom. Zeitschr. XVIII. 1857 p. 160.

15) Sichel J., Description d'un Bombus lapidarius gynandromorphe in: Ann. soc. entom. France VI. 1858 Bull. p. CCXLVIII—CCXLIX.

16) Meinert Fr., Bidrag til de Danske Myrers Naturhistorie in: Vidensk. Selsk. Skrift. 5 Raekke Naturvid. og Mathem. Afdel

5. Bd. 1860 p. 273—340; 3 Taf. Sep. Kjöbenhavn 1860. 4^o 67 pg. 3 Taf. — Vgl. Forel A., Fourmis de la Suisse 1874 p. 139.

¹⁷⁾ Dönhoff — Ein Bienenzwitter in: Bienenzeitg. 1860 p. 174.

¹⁸⁾ Dönhoff —, Beiträge zur Bienenkunde. (LXXI.) I. Ueber Zwitterbienen in: Bienenzeitg. 1860 p. 209—210.

¹⁹⁾ Hamet H., Apiculture in: Revue et Magas. de Zool. XIII. 1861 p. 336.

²⁰⁾ Gerstäcker C. E., Unvollkommen halbirter Zwitter von *Megachile spec.* in: Bericht über d. wiss. Leistungen in der Entomol. w. d. J. 1861 p. 292.

²¹⁾ Smith F., Imperfect Hermaphrodite of *Apis mellifica* from Scotland in: Proc. Entom. Soc. London 1862 p. 89—90.

²²⁾ Menzel A., Abnormität in der Bildung einer Biene in: Bienenzeitg. 1862 p. 91—92.

²³⁾ Menzel A., Ueber Zwitterbienen in: Bienenzeitg. 1862 p. 167—168 (I); 186—187 (II).

²⁴⁾ Menzel A., Hymenopterologische Beobachtungen II. Ueber Zwitterbildung bei Bienen in: Mittheil. Schweiz. entom. Ges. I. Bd. Heft 3, 1863 p. 41—56.

²⁵⁾ Siebold Th. v., Ueber Zwitterbienen, in: Zeitschr. f. wiss. Zoologie XIV. 1864 p. 73—80.

²⁶⁾ Gerstäcker C. E., Ueber Zwitterbildungen der Honigbiene in: Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1864 p. 4.

²⁷⁾ Assmus Ed. Ph., Ueber Bienenzwitter, in: Bienenzeitg. XXII. 1866 p. 125—126.

²⁸⁾ Taschenberg, E. L., Ueber einen Zwitter von *Amblyteles hermaphroditus*, einer neuen Ichneumoniden-Art in: Berlin. entom. Zeitschr. XIV. 1870 p. 425—426.

²⁹⁾ Schenck C. F., Einige Bienen-Hermaphroditen in: Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 335.

³⁰⁾ Smith F., Notes on examples of gynandromorphism in Aculeate Hymenoptera in: Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. XIV.

³¹⁾ Gerstäcker C. E., Ueber androgyne Bildungen bei Insekten in: Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1872 p. 33.

³²⁾ Kriechbaumer J., Ueber einen Zwitter von *Xylocopa violacea* in: Tagebl. 45. Versammlung. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipzig 1872 p. 137.

33) Forel A., Les Fourmis de la Suisse in: Neue Denkschr. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. XXVI. Bd. 1874 p. 139—143; Pl. 2 Fig. 36 u. 37. Sep. Zürich, Georg 1874. 4^o. 452 pg.

34) Smith F., On Hermaphroditism in Ants in: Entomol. Annual 1874 p. 147—148: pl. Fig. 3. — Auch: On a Hermaphrodit ant, *Myrmica laevinodis* from Cheshire in: Trans. Entom. Soc. London 1874 Proc. p. IV.

35) Hagens . . . v., Ueber Bienen- und Ameisenzwitter in: Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. u. Westphal. XXXII. 1875 Correspbl. p. 73—74.

36) Flett W., Gynandromorphism in the Honey-bee in: Scot. Natural. Vol. IV. 1878—1879 p. 199.

37) Dodge S. C., Monstrosities among Bees (Hermaphroditism) in: Americ. Bee Journ. XV. 1879 p. 498.

38) Ritsema Cz. C., Hermaphrodit von *Bombus mastrucatus* und *Nomada succincta* in: Tijdschr. v. Entom. XXIV. 1881 Versl. p. CXI.

39) Cooke B., *Myrmica laevinodis* in: Natural. Yorkshire VIII. 1882 p. 30.

40) Enoch F., Bilateral hermaphrodite of *Macropis labiata* Pz. in: Proc. Entom. Soc. London 1883 p. 25; Fig.

41) Moesáry S., Hermaphrodita rovarok a m. n. muzeum-ban in: Rovart. Lapok I. 1884 p. 53—57; Fig. 14.

42) Adlerz G., Myrmecologiska Studier II. Svenska myror och deras lefnads förhållanden in: Bihang Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. XI. No. 18. 1886. 329 p. 7 Taf.

43) Konow F., Zwitterbildung bei *Nematus umbrinus* Zadd. in: Societas entom. II. 1887 p. 97—98.

44) Dittrich R., Ueber *Andrena praecox* ♀ und *Astacus fluviatilis* ♀ mit theilweise männlichen Kennzeichen in: Zeitschr. f. Entom. Breslau N. F. XIII. 1888 p. 4—6.

45) Lucas H., Note relative à deux abeilles anormales in: Bull. soc. entom. France 1888 p. LXXXIV.

46) Wasmann E., Einige neue Hermaphroditen von *Myrmica scabrinodis* und *M. laevinodis* in: Stettin. entom. Zeitg. LI. 1890 p. 298—299.

47) Perkins R. C. H., Male and worker characters combined in the same individual of *Stenamma Westwoodi* in: Entom. M. Magaz. 2. Ser. II. 1891. p. 123.

⁴⁸⁾ Frey-Gessner E., Hymenopterologisches. Eine Zwitterbildung, in: Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. Heft 9. 1892 p. 372—373.

⁴⁹⁾ Krieger R., Zwei Hymenopteren-Zwitter in: Zeitschr. f. d. Naturwiss. LXV. 1892. p. 137—140.

⁵⁰⁾ Forel A., Hermaphrodite de l' Azteca instabilis in: Bull. soc. Vaudoise sc. nat. XXVIII. 1892 p. 268—270; pl. XVI.

⁵¹⁾ Slavicek J., Zwei Hymenopterenzwitter in: Verh. naturf. Ver. Brünn XXXIII. 1893 p. 105—106.

⁵²⁾ Deprez V., Additions et Annotations aux listes des Ichneumonides de Belgique in: Ann. soc. entom. Belgique XL. 1896 p. 505—507.

⁵³⁾ Klapálek F., Obojetnik Camponotus ligniperdus Latr. in: Sitzber. Böhm. Ges. Wiss. 1896 Nr. XXVIII. 4 pg.

II. Systematische Uebersicht der bisher bekannt gewordenen hermaphroditen und gynandromorphen Hymenopteren.

1. *Cimbex Griffini* Leach (Gr. I. 2b.)

Shuckard (4 p. 79).

,in which the left anterior leg only is ♀.

2. *Abia sericea* L. (♀ — Gr. IV. 3. u. 5.)

Gerstäcker (31 p. 33).

,Ein seitdem lebend aufgefundenen und beobachteter Zwitter, welcher unter Conservirung der äusseren Hülle anatomisch untersucht worden ist, kann unter gleichzeitiger Berücksichtigung seiner Körperbildung und seiner inneren Organisation als fast transversal getheilte bezeichnet werden.

Die ganze äussere Erscheinung des betreffenden Individuums, die geringere Grösse in Verbindung mit dem schlankeren Körperbau und dem vorwiegend grünen Erzglanz des Hinterleibes würde auf den ersten Blick in demselben ein ♂ vermuthen lassen. Mit einem solchen zeigt es sich auch in der Bildung des Kopfes, an welchem die vergrösserten Augen, der verengte Scheitel, die

dicke buschige Behaarung der Stirn und der Backen u. s. w. durchaus den ♂ Typus erkennen lassen — wogegen das ♀ kleine, weit getrennte Augen, nur ganz kurze Behaarung u. s. w. besitzt — übereinstimmend, während Fühler, Brustkasten und Beine, welche in beiden Geschlechtern keine Unterschiede zeigen, einem ♂ wenigstens nicht widersprechen. Der im geringeren Grade als beim normalen ♀ bauchige Hinterleib zeigt die das ♂ charakterisirende, sammetartige, tief schwarze Rückenbinde des vierten bis sechsten Segmentes nur zur Hälfte der gewöhnlichen Breite und zwar der linken Seite entsprechend ausgebildet, während das siebente Segment des dem normalen ♂ zukommenden Eindrucks entbehrt und gleich dem achten mehr nach dem Typus des ♀ gebildet ist. Auf der Bauchseite des Hinterleibes zeigt die Schienenbildung sogar völlig den ♀ Charakter, welcher sich ganz besonders in der Ausbildung der zweiklappigen Legescheide dokumentirt. Obwohl hiernach äusserlich neben der ganzen vorderen Körperhälfte auch die Rückenseite des Hinterleibes vorwiegend ♂ erscheint, hat die Untersuchung der Bauchhöhle dennoch die ausschliessliche Anwesenheit ♀ Geschlechtsorgane ergeben. Die symmetrisch ausgebildeten und aus der normalen Zahl von Eiröhren bestehenden Ovarien enthielten zusammen 48 legereife Eier und schienen von denjenigen eines regulären ♀ nur durch die grössere Kürze der einzelnen Eischnüre, welche in ihrem oberen Theil nur wenige jüngere Eikeime enthielten, abzuweichen. An dem in die Geschlechtsöffnung normal ausmündenden Ovidukt fand sich auch das *Receptaculum seminis* vor, so dass das betreffende Individuum in jeder Beziehung als begattungs- und fortpflanzungsfähig angesehen werden musste. Wenn es sich dennoch — bei der Leere seines *Receptaculum seminis* von Spermatozoen — als unbefruchtet erwies, obwohl es in Gesellschaft einiger ♂ (und zahlreicher ♀) derselben Art auf den Blüten von *Selinum oreoselinum* in der Umgegend Berlins angetroffen wurde, so lässt sich dies offenbar leicht daraus erklären, dass es bei seinem vorwiegend ♂ Habitus der Aufmerksamkeit und dem Begattungstrieb der eigentlichen ♂ entgangen ist.

3. *Nematus umbrinus* Zadd. (1. — Gr. IV. 5; 2. — Gr. IV. 5.)

Konow (43 p. 97.)

, Während hermaphroditische Bildungen bei den Insekten überhaupt verhältnissmässig selten vorkommen, und meines Wis-

sens bisher nur bei Schmetterlingen häufiger beobachtet worden sind, ist mir wenigstens kein Fall bekannt geworden, in welchem man auch bei den Blattwespen eine derartige Bildung angetroffen hätte.

Auch habe ich selbst, obwohl doch Tausende von Exemplaren durch meine Hände gegangen sind, nie hermaphroditische Exemplare gesehen.

Um so mehr war ich überrascht, als ich diesen Sommer in einer kleinen aus Dorpat von Herrn M. von zur Mühlen erhaltenen Bestimmungssendung zwei derselben Spezies angehörige Zwitter fand, die in Nachfolgendem kurz beschrieben werden mögen.

Nematus umbrinus Zadd. ist durch an der Spitze gespaltene Klauen und ausgerandetes Kopfschildchen ausgezeichnet und darum keineswegs, wie Zaddach angibt, in der Verwandtschaft des *abietinus* Chr. oder *Wesmaeli* Tischb. zu suchen.

Die Bildung der Hinterleibsspitze in beiden Geschlechtern weist der Spezies vielmehr ihren Platz in der nächsten Verwandtschaft des *N. ribesii* Scop. an. Bei dem ♂ der letztern Spezies ist das achte Rückensegment in bekannter Weise gebildet: es ist an der Spitze eine breite, halbkreisförmige Platte ausgezogen, welche beiderseits durch eine tiefe, scharf eingedrückte Furche begrenzt wird, und diese Furche bildet mit jener Platte eine scharfe Kante, so dass letztere seitlich je in eine scharfe Ecke ausläuft. Ganz ähnlich ist das achte Rückensegment beim ♂ *N. umbrinus* gebildet, nur ist jene Platte kleiner und an den Seiten abgerundet, weil die begrenzende Furche viel flacher und nicht durch scharfe Ränder begrenzt ist. Der ♀ *N. umbrinus* ist von *ribesii* leicht an der schmalern Säge-scheide und an der dunkleren Färbung der ersten Abdominal-Segmente zu unterscheiden. Uebrigens ist *N. umbrinus* stets kleiner, besonders schmäler, als *ribesii*.

Von den beiden in Rede stehenden Zwitterexemplaren nun welche beide im Juli 1886 bei Dorpat gefangen wurden, ist das eine kleiner, dunkler gefärbt, und zeigt mehr die Charaktere eines ♂. Die Fühler sind hier ein wenig länger und sehr wenig stärker als sonst beim ♀, aber kürzer und schwächer als beim normalen ♂, an der Oberseite dunkel, an der Unterseite hell gefärbt. An den Flügeln sind Randadern und Stigma schwärzlich und die ganze Oberseite des Körpers ist grösstentheils dunkel gefärbt; auf den Schläfen, an den Seiten des Mesonotum und auf dem Schildchen jederseits scheinen lichte Flecke durch, und nur Pronotum und Flügelschuppen sind schmutzig gelb, ersteres vorn in der Mitte ein wenig angedunkelt. An dem

Hinterleibsbrücken ist das Segment ganz schwarz, die übrigen an den Seiten mehr oder weniger bräunlich, und nur das achte Segment ist ganz bräunlich-gelb. Der Bauch ist gelb, die Brust schwarz, und nur die obere Spitze der Mesopleuren ist lichter. Das Hinterleibsende nun zeigt insonderheit die Zwitterbildung: Das achte Rückensegment ist wie beim ♂ gestaltet, nur ist die ausgezogene Endplatte breiter als gewöhnlich und an der ersten Seite sogar eckig, so dass die ganze Bildung mehr an *ribesii* erinnert. Unter der Endplatte ragt an der rechten Seite ein Arm des männlichen Zangenapparates hervor; der andere ist bis auf einen kurzen Stumpf verkümmert. Die Bauchseite dagegen zeigt ♀ Bildung; nur erscheinen die Klappen der sonst völlig entwickelten Sägescheide schwächlich und klaffen.

Der ganze Körper ist schlank, nur wenig breiter und etwas länger als bei einem gewöhnlichen ♂.

Dagegen ist das andere kräftig entwickelte Exemplar noch interessanter. Der Körper ist breiter, die Flügel und Fühler länger; letztere sind stark comprimirt, denen eines kräftigen ♂ gleich; die Kosta der Vorderflügel ist bis auf das helle Grunddrittel schwarz. Am Thorax sind die Mesopleuren, schmale Streifen an den Seiten des Mesonotum und unbestimmte Flecke des Schildchen durchscheinend bräunlich; am Hinterleib sind nur die beiden ersten Rückensegmente grösstentheils schwärzlich, und am Grunde der beiden folgenden finden sich noch schmale dunkle Streifen. Das achte Rückensegment zeigt völlig die Gestalt eines ♂ Epipygium: doch sind die ♂ Geschlechtsorgane nicht entwickelt; vielmehr ragt unmittelbar unter jenem Segment ein ♀ Epipygium hervor, das eine völlig entwickelte Sägescheide mit hervorragender Säge bedeckt.

Das letzere Exemplar erweist sich als unzweifelhaft zu *N. umbrinus* Zadd. gehörig; und weil nicht anzunehmen ist, dass eine so seltene Bildung gleichzeitig bei zwei verschiedenen Arten stattgefunden habe, muss auch das erstere Exemplar dieser Spezies zugerechnet werden, obgleich es mehr auf *ribesii* Scop. hinweist.

Es ist anzunehmen, dass beide Exemplare einer und derselben Generation angehören, und möglich, dass diese auffallenden Abnormitäten der Kopula eines *ribesii*-♂ mit einem *umbrinus*-♀ ihr Entstehen verdanken.

4. *Tenthredo angulata* Westw. (Gr. I. 1 g.)

Curtis (6 p. 632).

the right hand half of which is ♀ and that on the left ♂, with this observation: Never having seen any other hymenopterous insect of this kind, I have been induced to figure the *Tenthredo* in the annexed plate; and as the sexes vary in the colour and markings of the abdomen etc. they are rendered conspicuous in the figure.*

5. *Tenthredo atra* L. (Gr. I. 3 f.)

Slavicek (51 p. 106).

Die Säge ist zwar vorhanden, in zwei Sägeplatten gespalten, von denen der eine Theil ganz sichtbar und unregelmässig gebogen, der andere nur zum Theil hervorragt. Von der Sägescheide ist nur eine kaum bemerkbare Spur an der äussersten Basis vorhanden; die Bauchplatten, welche sich sonst an die Scheide dicht anlegen, sind auch zum Theil unregelmässig entwickelt. Diese unregelmässige Ausbildung des Legeapparates hatte auch einen Einfluss auf die Farbe des Hinterleibes ausgeübt. Es sind die Segmente 1, 2, 3 und 7, 8 ganz schwarz, das 4, 5, 6 links roth, also ♂, rechts schwarz, also wie beim ♀ gefärbt; die Farbe in der Mittellinie scharf gesondert und schon von weitem auffallend. Beine sind normal gefärbt: roth; die Spitze der Hintertibien und die ganzen Hintertarsen schwarz, alle Schenkel an der linken Seite ganz roth, wie sie bei normal gefärbten ♀ vorkommen, an der rechten Seite roth mit je einem schwarzen Strich oben (also wie bei ♂). Ich habe alle Exemplare von *Tenthredo atra* verglichen und bei allen ♂ schwarz linierte, bei allen ♀ ganz rothe Schenkel gefunden; es ist also die Färbung des hier beschriebenen Exemplars dadurch merkwürdig, dass an der linken, ♂ gefärbten Bauchseite Schenkel mit normaler ♀, an der ♀ gefärbten Bauchseite rechts Schenkel mit normaler ♂ Färbung vorkommen. An den übrigen Körpertheilen sind keine Unterschiede bemerkbar.*

6. *Macrophya rustica* L. (Gr. IV. 1.)

Krieger (49 p. 138).

Von einem Schmetterlingssammler erhielt ich, als am 16. Juni 1890 bei Weida in Thüringen in copula gefangen, zwei

Blattwespen, ein normales ♂ von *Macrophya rustica* L. und ein Thier derselben Art. das dem Habitus und der Grösse nach bis auf einige Abweichungen in der Färbung ein ♀ zu sein schien. Eine wirkliche copula kann nach dem sogleich zu beschreibenden Bau der äusseren Genitalien wohl kaum stattgefunden haben, wohl aber ein Copulationsversuch, wie er ja z. B. bei Maikäfern selbst zwischen zwei ♂ beobachtet worden ist. Das Bruststück und die Beine sind links wie beim ♂, rechts aber wie beim ♀ gefärbt. Das erste Hinterleibssegment ist rechts breit weiss gesäumt wie beim ♀, links hat es nur an der Hinterecke einen kleinen hellen Fleck. Die hellen Flecke am 5. und 6. Segment sind links etwas kleiner als rechts, während ja das ♂ einen ganz schwarzen Hinterleib hat. Da ich die Thiere trocken erhielt, musste ich mich auch hier mit der Untersuchung der Genitalbewaffnung begnügen. Das Thier besass links, also merkwürdigerweise auf der mehr männlich gefärbten Seite, die Hälfte eines ♀ Legebohrers mit allen seinen Theilen, rechts aber einen vollständigen ♂ Copulationsapparat, der nur, vielleicht bei dem Copulationsversuch, in seiner Längsaxe um fast 180° aus seiner natürlichen Lage gedreht und auf der morphologisch linken Seite in einzelnen Theilen, wie den sagittae und dem unteren Theile der Klappen, etwas verkümmert war. Die Bauchschiene des 8. Segments ist links schmal und trägt eine Stechborste wie beim ♀, rechts vorgezogen wie beim ♂. Die Stechborste lag nicht in der Führung der vorhandenen Stachelrinnenhälfte, die nebst der Klappe an der schmalen linken Seite der 9. Bauchschiene ansitzt. Die rechte Seite dieser Schiene bildet wie beim ♀ eine breite Platte, die nur durch einen eigenthümlichen Fortsatz ausgezeichnet ist, der dem normalen ♀ fehlt (Rudiment einer weiblichen Klappe?). Die Rückenschiene des 9. Segments ist links stärker chitinisirt als rechts.*

7. *Ichneumon extensorius* Grav. ♀ × *Ich. luctatorius* Grav. ♂. (Gr. III. 2b.)

Wesmael (5 p. 339; fig. col.)

„Les antennes, la tête, le thorax, les ailes et les pieds sont conformés et colorés comme chez l'*Ichneumon extensorius* ♀; tandis que les couleurs de l'abdomen, sa forme, le nombre de ses anneaux et les parties génitales externes sont identiquement les mêmes, que chez l'*Ichneumon luctatorius* ♂.“

8. Ichneumon fasciatorius Grav. ♂ × **Ich. quadrimaculatus** Grav. ♀. (Gr. III. 1 a.)

Wesmael (7 p. 448).

,Chez l'individu qui fait l'objet de cette notice, la tête et les antennes sont conformées et colorées comme chez l'*Ichneumon fasciatorius* ♂; l'abdomen est conformé et coloré comme celui de l'*Ichneumon quadrimaculatus* ♀. — Quant au thorax, aux pieds et aux ailes, ils présentant, chez les individus normalement conformés de ces deux *Ichneumons*, une si grande ressemblance, qu'il est assai difficile de décider si, chez notre individu gynandromorphe, ils sont d'un mâle ou d'une femelle. Cependant les pieds me paraissent être ceux d'une ♀, à en juger surtout par les dimensions des jambes de derrière, qui sont un tant soit peu plus épaisses chez les individus, de ce sexe que chez les ♂. Du reste, tous les organes extérieurs sont rigoureusement conformés et colorés d'après les lois de la symétrie binaire.

9. Ichneumon nigritarius. Fabr. (Gr. III. 1 a.)

Wesmael (9 p. 378).

,La tête et les antennes, par tous les détails de leur conformation, sont évidemment d'un *I. nigritarius* ♂, tandis que tout le reste du corps, ainsi que les pieds et les organes sexuels sont de l'*I. nigritarius* var. 4 ♀ (*I. annulator* Grav. var.) C'est donc une ♀ avec la tête et les antennes d'un ♂.

10. Ichneumon comitator L., *I. fasciatus* Grav.
(Gr. III. 1 c.).

Wesmael (9 p. 378).

,La tête et les antennes, l'abdomen et les parties sexuelles extérieures sont conformés et colorés comme chez l'*Ichneumon comitor* ♂ (*I. fasciatus* Grav.), excepté les palpes, qui sont tout noirs. Les pieds, au contraire, sont ceux de l'*Ich. comitator* ♀, comme le prouvent: 1^o leur coloration, 2^o leur épaisseur; 3^o la brosse de poils située sous les hanches de derrière. Quant au thorax dont la conformation est identique chez les deux sexes, il semble appartenir aussi au type femelle, au moins par sa coloration, puisqu'il manque complètement des deux linéoles blanches qu'on y voit, chez les ♂, près de l'origine des ailes. En résumé, c'est donc un ♂ avec les pieds et le thorax d'une ♀.

11. *Amblyteles hermaphroditus* Tbg. (Gr. I. 2 g.)

Taschenberg (28 p. 425).

„Besagter Zwitter nun ist $6\frac{1}{2}$ Linien lang, hat auf der rechten Seite einen ♂, ziemlich stark gesägten Fühler und die Beine, wie sie die andern 3 Männchen auch haben, nämlich die Schenkel roth, Schienen mit Ausschluss der schwarzen Spitze an den hintersten strohgelb. Auf der linken Seite ist der Fühler ♀ und zwar borstenförmig, die Beine schwarz, die vordersten nur bis zu einem kleinen Theile der Schenkelwurzel, sonst sammt ihren Schienen roth, die mittleren und hintersten nur an der Vorderseite der Schiene mit rothschimmernden Striemen versehen. Kopf und Thorax sind wie bei den übrigen ♂ gebildet und auch das Abdomen scheint wenigstens seiner Spitze nach zu schliessen. ♂ Natur zu sein; was seine Färbung anlangt, so zeigt die Wurzel des 4. Segmentes auch auf dem Rücken die rothe Färbung, welche die anderen ♂ nur an den Vorderecken haben.“

12. *Automalus alboguttatus* Grav. (Gr. I. 1 a).

Deprez (52 p. 507).

„L'exemplaire que nous avons capturé de l'*Automalus alboguttatus* porte au côté droit une antenne ♀, c'est — à dire, filiforme et annelée de blanc, et, à gauche une antenne ♂, c'est — à dire, noduleuse et sans anneau blanc. La moitié gauche de la face est colorée comme chez le ♂, tandis que l'autre moitié est entièrement noire. ♀. Le palpes, le clypeus et les temps sont hérissés de poils dans la moitié droite de la tête. Lignes devant les ailes qui sont légèrement enfumées vers les extrémités. Pattes et abdomen comme la ♀. De la tarière on aperçoit seulement les deux gaines couvertes de soies noires. —

Nous pensons qu'il est inutile de donner une description plus ample de cet hermaphrodite, d'autant plus que nous croyons, comme M. l'abbé Berthoumieu, que c'est plutôt une aberration de la nature qu'un véritable gynandromorphisme.“

13. *Blacus maculipes* Wesm. (Gr. I. 1 g.)

Ruthe (14 p. 160). (Gr. I. 1 g.)

„Im Mai 1854 hatte ich das Glück, unter den Braconen einmal einen sogenannten Zwitter einzufangen; seitdem habe ich

mindestens 10,000 Exemplare von derselben Art und den nahen ebenfalls häufigen Verwandten betrachtet, aber niemals ist mir wieder etwas dem Aehnliches zu Gesicht gekommen. Das Thier gehört ohne allen Zweifel zu *Blacus maculipes* Wesm. Es ist etwa $1\frac{1}{2}$ Linie lang und in allen Theilen deutlich ausgebildet. Auf der ganzen linken Seite ist es ♂, auf der rechten ♀. Der linke Fühler ist mehr borstenförmig, 22gliedrig, braun, nur das erste Geissel- und das Wendeglied röthlich, also genau, wie bei vollkommenen ♂ Stücken: der rechte dagegen ist kürzer, dicker, fadenförmig, 20gliedrig, (und wenn man das verlängerte Endglied als aus 2 Gliedern bestehend annimmt, 21gliedrig) röthlich und nur am Ende, wie der kurze Schaft, gebräunt, also wiederum so beschaffen, wie bei ausgebildeten ♀, doch sind die vorletzten Glieder um ein wenig länger. (also weniger gerundet), als dies gewöhnlich der Fall ist. An dem Kopfe bemerke ich, sowie auch an dem Thorax, keinen erheblichen Unterschied, nur ist auf dem Rücken des Mesothorax die rechte Parapside etwas kürzer, niedriger und weniger glänzend als die linke, und der Metathorax auf seinem Hintertheile etwas schief, aber auf der rechten Seite nicht ganz so steil abschüssig, wie sonst bei ♀, und auf der linken etwas mehr, als bei vollkommen ausgebildeten ♂, gleichsam als wären hier die ♂ und ♀ ausbildenden Kräfte in Confusion gerathen. Der Hinterleib hat mehr die weibliche Form, nur ist das erste Segment ein wenig länger und dünner, die beiden fadenförmigen parallelen Kiele auf dessen Grundhälfte sind deutlicher ausgeprägt und der abgesetzte Rand auf der linken Seite ist stärker, als auf der rechten: auch bilden die letzten Segmente nicht völlig ein so breites abgestutztes Ende wie gewöhnlich. Ein Bohrer ist vorhanden, aber seine Theile sind verworren ausgebreitet und haben ein verkümmertes Ansehen. Der Vorderflügel auf der rechten Seite ist etwas kürzer, schmaler, derber, dunkler, mit braunem Geäder und Stigma und spitzaufliegender (contigua Hal.) äusserer Discoidalzelle; der linke länger, breiter, heller, zarter, mit lichtbraunem Stigma und zum Theil farblosem Geäder, und die äussere Discoidalzelle ist an der aufsitzenden Spitze abgestutzt. beide Flügel sind also genau gebildet wie bei einem vollkommenen Pärchen. Auch die Beine sind auf der linken Seite genau die ♂, auf der rechten die ♀, denn diese sind kürzer und etwas dicker und die Hinterschenkel auf der Endhälfte (die äusserste Spitze ausgenommen) dunkelbraun; jene ansehnlich länger und dünner, was beides an den Hinterbeinen, besonders den Tarsen, am deutlichsten in die Augen springt, und die Hinter-

schenkel vor der Spitze nur mit einem bräunlichen verwaschenen Ringe bezeichnet.

14. *Diapria elegans* Jur. (Gr. I. 2 a).

Förster (8 p. 390—392.)

„Seitlich getheilt, rechter Fühler ♂, linker ♀.“

15. *Tetrogmus caldarius* Rog. (Gr. I. 1 g.)

Roger (13 p. 15—17; T. 1, F. 2.)

„Im December v. J. wurde von mir ein Arbeiter der im vorhergehenden Artikel beschriebenen Species beobachtet, wie derselbe eine andere kleine geflügelte Ameise einherschleppte. Anfangs war ich der Meinung das ♂ von *Tetrogmus* vor mir zu haben, eine genauere Untersuchung ergab jedoch alsbald, dass das Thierchen ein Zwitter war.

Wie bei dem von Herrn Geheimrath Klug in der Stettiner entomologischen Zeitung (1854. p. 102) beschriebenen Zwitter ist auch bei dem von mir aufgefundenen die linke Seite die ♂ die rechte die ♀. Der männliche Charakter der linken Seite ist jedoch hier noch weit entschiedener entwickelt als es bei dem Klug'schen Thier der Fall ist, während auf der rechten Seite die Länge des Körpers, das grössere Netzauge, das vorhandene Punktauge und namentlich die deutlichen Flügelsätze nicht zweifeln lassen, dass diese Hälfte des Körpers die eines ♀ und nicht die eines ♂ ist.

Da ♀ und ♂ bereits ausführlich beschrieben sind, so soll hier von der ♀ Seite des Zwitters nur das Nöthigste und Abweichende erwähnt werden.

Tetrogmus caldarius (Zwitter): Länge $\frac{2}{3}$ mm.

Linke männliche Seite.

Kopf schwärzlich. Die schwarze Farbe tritt auf dem Scheitel, um die Punktaugen, am entschiedensten, gegen die Netzaugen am schwächsten hervor, so dass die Umgegend der letzteren und die Unterseite des Kopfs wieder mehr gelb sind.

Die Stirne und der Scheitel sind längsgestreift, die Umgegend der Augen ist netzmaschig. Sculptur etwas stärker wie auf der rechten Seite.

Netzauge gross, wenigstens um ein Drittel grösser als das der weiblichen Seite.

Punktauge. Das links und das in der Mitte stehende Punktauge gross, kugelig, fast doppelt so gross wie das der rechten Seite.

Fühler viel länger als der weibliche Fühler, blass gelb. Der Schaft sehr kurz, so dass derselbe, horizontal nach aussen gerichtet, nur bis zum Seitenrande des Kopfs reicht *).

Fühlerfurche fehlt. Statt ihrer findet sich um die Fühler-einlenkungsstelle nur eine nach oben winklig ausgezogene glatte Grube.

Kiefer viel kleiner, schwächer als die der rechten Seite. Am Innenrande einige starke Zähne.

Rechte weibliche Seite.

Kopf rötlich gelb, heller wie sonst beim ♂, seine Sculptur etwas schwächer als gewöhnlich.

Fühlerschaft nochmal so lang als der der männlichen Seite.

Fühlerfurche sehr deutlich, deutlicher als gewöhnlich.

Die schwärzliche Färbung, das grosse Netzauge, die hervorspringenden, Quarzkörnchen ähnlichen Punktaugen, der lange Fühler mit ganz kurzem Schaft, der Mangel einer Fühlerfurche, der kleine Oberkiefer sind die in die Augen fallendsten, charakteristischen Unterschiede.

Nicht weniger interessant ist die verschiedene Bildung des Thorax.

Die ♂ Seite ist nämlich stark nach oben gewölbt, während die ♀, wie gewöhnlich, ganz flach ist, so dass diese von jener ganz deutlich überragt wird. Die linke schwärzlich angeflogene Seite ist ziemlich glatt, an einigen Stellen glänzend, und trägt vom Vorderrande an bis zum Metanotum eine schwach bogenförmig laufende, deutlich eingegrabene feine Linie. Die rechte Thoraxhälfte ist die gewöhnliche weibliche, nur ist die Sculptur etwas zarter. Die Flügel fehlen, die Flügelansätze sind jedoch deutlich.

Die ♂ Seite ist geflügelt. Die Flügel sind ähnlich denen von *Leptothorax*, jedoch fehlt an ihnen der innere Cubitalast gänzlich, und die Costa transverso-media überragt nur noch

*) Während des Zählens der Fühlerglieder ging der schon etwas abgebrochene Fühler leider verloren.

ein Weniges die Cellula discoidalis clausa. Die Flügel sind ganz wasserhell und das Stigma ist sehr blass.

Schenkel und Schienen der ♂ Seite sind blassgelb, und übertreffen an Länge die der ♀ Seite fast um Doppelte.

An den beiden Knoten des Stielchens und am Hinterleib (dessen Spitze übrigens zerbrochen ist) findet sich nichts Bemerkenswerthes.*

16. Tetramorium simillimum Sm. (*Myrmica caldaria* Rog).
(Gr. III. 1 a.)

Meinert (16 p. 331).

„En Gynandromorph. som jeg taget af denne Art, har Hannens Hoved og Dronningens Bagkrop og Bryststykker med Undertagelse at høre Side af Notum. som ligner Hannens Notum i Farve og Sculptur“ (= „qui a la tête ♂, le thorax et l'abdomen ♀“.)

17. Myrmica lobicornis Nyl. (Gr. III. 2 a.)

Meinert (16 p. 327).

„Og ved samme Leilighed tog jeg en ret mærkelig Gynandromorph, som havde Dronningens Førlighed og hele Hoved, men Hannens Farve. Sculptur af Brystet og Parringsredskaber; dens Vinger stode i Størrelse midt imellem begges.“ (= „qui a la tête et en général l'épaisseur d'une ♀, par contre la sculpture, la couleur et les organes genitaux d'un ♂“.)

18. Myrmica ruginodis Nyl. (Gr. III. 2 a.)

Forel (33 p. 142).

„Parmi les fourmis récoltées par M. Frey-Gessner se trouvait *Myrmica* ailée prise par M. Frey-Gessner sur le col du Susten, le 23 VII. Je la pris au premier instant pour un ♂, mais je vis bientôt que la tête avait des rapports avec celle d'une ♀. Il n'y a absolument rien d'asymétrique chez cette fourmi. Elle est plutôt ♂, car l'abdomen a cinq segments (plus les deux du pédicule), et les organes génitaux externes ♂; le metanotum n'a que deux tubercules, comme chez le ♂. Mais la tête a des yeux plus petits que chez le ♂, comme ceux de la ♀; elle est aussi un peu plus grosse que celle du ♂, et sa forme est intermédiaire entre celles des deux sexes, ainsi que sa couleur; les antennes ont 13

articles, comme chez le ♂, mais leur couleur et leur forme rappellent celles des antennes de la ♀; il y a aussi deux bandes rousses distinctes sur un fond brun devant le mesonotum, ce qui n'a jamais lieu chez les ♂. La sculpture de la tête et du mesonotum est plus rugueuse, et leur éclat est moindre que chez le ♂. Cet hermaphrodite, ou si l'on veut ce ♂ à aspect un peu féminin appartient à la race *ruginodis*.^c

19. *Myrmica laevinodis* Nyl. (Gr. I. 1 b.)

Smith (34 p. 147 u. p. IV.)

, A singular Specimen of *Myrmica laevinodis* was captured in Dunham Park, Cheshire, by Mr. J. Chappell, who presented it to Mr. Benj. Cooke, of Sunnyside Cottage, Bowdon, near Manchester. It combines characters of ♂ ♀ and ♀: the right side is entirely ♀, on the left side the head is ♀, hence we see an ocellus and antenna exhibiting the characters of the ♀; but the left side of the thorax is certainly ♂ and consequently the mesothorax has, in front, a deeply-impressed oblique line — in an ordinary ♂ of this species there are two such lines which form a V-shaped space, which is not found in either the ♀ or the ♀ — the metathorax on the left side, is destitute of the spine which characterizes both the ♀ and the ♀, the legs on the same side are all ♂, being longer and much more slender than those of the other sexes. This is the first instance of the kind, to my knowledge, that has been observed in England.^c

20. *Myrmica laevinodis* Nyl. (Gr. IV, ?).

Cooke (39 p. 30).

, which combined ♂, ♀ and ♀ which had been caught by Mr. Chappell in Dunham Park^c.

21. *Myrmica laevinodis* Nyl. (Gr. III. 2 a.)

Wasmann (46 p. 299.)

, Im September 1886 fand ich bei Exaeten (bei Roermond, Holl. Limburg) in einer Colonie von *M. laevinodis* unter einer Anzahl normaler ♂ ein Individuum, das obgleich völlig ausgefärbt, einen ganz gelbrothen Kopf besass. Es erwies sich als ein gemischter Zwitter, der jedoch von der ♀ nur die Farbe des Kopfes hatte. Die gewöhnlichen glashellen Netzaugen des

♂ waren in je einen kleinen schwarzen Punkt verwandelt und in ein etwas engeres Dreieck zusammengestellt. Im Uebrigen konnte ich keine Abweichung von den normalen ♂ entdecken.*

22. *Myrmica scabrinodis* Nyl. (Gr. I. 2 a.)

Wasmann (46 p. 298).

,Gleichfalls September 1886 fand ich bei Exaeten in einer Colonie von *Myrmica scabrinodis* Nyl., die zahlreiche geflügelte ♀ und ♂ enthielt, ein Individuum, das sofort durch die unsymmetrische Form und Färbung seines Kopfes in die Augen fiel. Es erwies sich als ein Zwitter, dessen linke Kopfhälfte fast ganz die einer ♀ war, während der übrige Körper keinen Unterschied von den normalen ♂ zeigte. Man kann denselben somit als einen unvollständigen seitlichen Zwitter bezeichnen. — Die linke Kopfhälfte (♀) ist grösser als die rechte, glanzlos, rauh längs gerunzelt mit einem grossen rothgelben Fleck auf der Oberseite, der scharf begrenzt rechts bis in die Mitte des Gesichtes, links bis in die Mitte der Kopfseite (bis zum ersten Drittel des oberen Augenrandes) nach hinten bis zu einem schmalen schwarzen Hinterkopfsaume, nach vorn bis an die von einem schwarzen Ringe eingefasste Fühlerwurzel sich erstreckt. Die Kiefer und Fühler und die linke Hälfte des Clypeus sind gleichfalls gelbroth, der ganze übrige Kopf schwarz. Die rechte Kopfhälfte ist kleiner, feiner längsgestrichelt, daher glänzender (♂). Das rechte Netzaugen ist grösser (♂), das linke kleiner (♀). Von den Punktaugen auf dem Scheitel fehlt das dritte, der linken Kopfseite (♀) entsprechende. Die beiden übrigen sind vorhanden, das mittlere liegt ziemlich scharf an der Grenze der schwarzen Kopfseite, jedoch noch ganz auf dieser. Der rechte Oberkiefer ist an Grösse, Gestalt und Zahnzahl ♂, aber rothgelb (♀) während sonst bei den ♂ Kiefern nur die Spitze rothgelb ist. Der linke viel gröbere Oberkiefer ist ganz der einer ♀. Die Fühler sind beide einander gleich, 13gliedrig; fast rein ♂, jedoch nur sehr kurz und spärlich behaart, im Gegensatze zu der langen und reichlicheren Behaarung der gewöhnlichen ♂ Fühler von *M. scabrinodis*; ihre Färbung ist heller, fast gleichmässig rothgelb wie bei der ♀.*

23. *Leptothorax tubereum* Fabr. (♂ — Gr. I. 1 g.)

Adlerz (42 p. 82).

,Till de hos myrror kända fallen af lateral hermafroditism är jag i tillfälle att lägga ett nytt, som jag iakttagit i ett sam-

nälle af *Leptothorax tuborum*. Den ifrågavarande hermafroditen var på högra sidan utrustad med uteslutande arbetarekaraktärer. under det venstra sidan omvexlande företedde hanliga- och arbetarekaraktärer. Venstra halfvan af hufvudet var en hanes, med svag och platt mandibel, stort och bugtigt facettöga samt tvänne oceller. Det af sin svarta färg utmärkta hanliga området omfattade nemligen äfven den främre eller midtelocellen. Hansidan var försedd med hanantenn med kort skaft och af den för *tuborum*-hanarne karaktäristiska vitgula färgen. Flagellum hade dock blott 11 leder, enär de tvänne yttersta lederna sammansmält. så att antennernas ledantal blifvit detsamma som hos arbetaren.

Pronotum var en arbetares: mesothorax var på venstra sidan bredare och uppbar en framvinge. Mesonotum, scutellum, sidoflickan, scapula och metasternum voro på venstra sidan en hanes och mörkbrunt färgade. Mesonotum inkräktade på hansidan något litet mer på bakre delen af pronotum än arbetaresidans. Postscutellum och metathorax vore en arbetares, hvadan sålunda bakvinge saknades äfven på venstra sidan. Hansidans ben voro något längre och spensligare men af samma färg som arbetaresidans. Formen af petiolus bildade ett mellanting mellan hanens och arbetarens, men venstra sidan var mökt färgad liksom hos hanarne. Abdomen var af temligen regelbunden arbetare-form och färg; men i spetsen fans på venstra sidan en ofullständig bukskena till det för hanarne karaktäristiska 7:de abdominalsegmentet. En utskjutande, oregelbundet formad penis fans, hvars genitalvalvler på högra sidan voro till oigenkänlighet förkrympta, under det de på venstra sidan voro temligen normalt utvecklade. Till höger om penis fans en temligen oregelbunden gadd. De inre generationsorganen utgjordes af tvänne sädesblåsor, af hvilka den venstra var något större än den högra och stod i samband med ett *vas deferens*, hvilket deremot saknades på högra sidan. Någon *testikel* var ej utvecklad. Under och till höger om dessa hanliga generationsorgan fans ett *ovarium* bestående af ett stort äggrör med ett väl utveckladt ägg i nedersta äggkammaren samt två mindre äggrör utan några mogna ägg. Detta ovarium stod i förbindelse med en *ägglehare*, som utmynnade i en *vagina*. Af någon giftblåsa eller af de till giftapparaten hörande körtlarne såg jag intet spår.

„An die bei Ameisen bekannten Fälle von lateralem Hermaphroditismus bin ich in der Lage einen neuen legen zu können, den ich in einer Kolonie von *Leptothorax tuborum* beobachtet habe. Der betreffende „Zwitter“ war rechts ausschliesslich mit den Kennzeichen einer Arbeiterin ausgestattet, während die linke Seite

abwechselnd die Charaktere eines ♂ und die einer Arbeiterin zeigte. Die linke Hälfte des Kopfes war ♂, mit schwachem und flachem Oberkiefer, mit grossem und gewölbtem Facettenauge nebst zwei Ocellen. Auch das vordere oder mittlere Punktauge war nämlich von dem durch die schwarze Farbe gekennzeichneten männlichen Gebiete umfasst. Der Fühler derselben Seite war der eines ♂, mit kurzem Schaft und von den die *tuberculum*-♂ kennzeichnenden gelblichen Farbe. Das Flagellum hatte jedoch nur 11 Glieder, da die zwei äussersten zusammengewachsen waren, so dass die Zahl der Glieder dieselbe geworden war als bei der Arbeiterin.

Das Pronotum war das einer ♀; der Mesothorax war links breiter, mit Vorderflügel ausgestattet. Das Mesonotum, das Scutellum, der Seitenlappen, die „Scapula“ (pleura mesothoracis) und das Mesosternum waren linkerseits die eines ♂, mit dunkelbrauner Farbe. Das Mesonotum verdrängte auf der Männchenseite (links) den Hintertheil des Pronotums ein wenig mehr als auf der rechten Seite. Das Postscutellum und der Metathorax waren die einer ♀; somit fehlte Hinterflügel auch linkerseits. Die Beine der Männchenseite waren etwas länger und dünner als die der Arbeiterinnenseite aber von derselben Farbe als diese. Die Bildung des Petiolus hielt die Mitte zwischen der eines ♂ und der einer Arbeiterin, aber die linke Seite war dunkel gefärbt wie beim ♂. Der Hinterleib war, was Form und Farbe betrifft dem der ♀ ziemlich ähnlich; aber an der Spitze fand sich linkerseits eine unvollständige Bauchschiene des die ♂ kennzeichnenden siebenten Abdominalsegments. Es fand sich auch ein vorspringender, unregelmässig geformter Penis, dessen *valvulae genitales* rechterseits bis zum Verkennen verkrüppelt, linkerseits aber ziemlich regelmässig entwickelt waren. Zur Rechten des Penis sah man einen ziemlich unregelmässigen Stachel.

Die inneren ♂ Geschlechtsorgane waren von 2 Samenblasen repräsentiert, von welchen die etwas grössere linke in der rechten Seite fehlendes *vas deferens* in sich aufnahm. Keine Hode war entwickelt. Unterhalb und zur Rechten der ♂ Geschlechtswerkzeuge fand sich ein Ovarium mit einer grossen und zwei kleinen Eiröhren, von denen nur jene ein reifes Ei in der untersten Eikammer enthielt. Dieses Ovarium stand mit einem in einer Scheide mündenden Eileiter in Verbindung. Von Giftblase oder Giftdrüsen sah ich keine Spur *).

*) Diese Uebersetzung verdanken wir dem Autor, Herrn Lector Dr. G. Adlerz in Sundsvall.

24. *Ponera punctatissima* Rog. (Gr. ?).

Forel (33 p. 143).

, Il ne nous reste que le singulier hermaphrodite de la *Ponera punctatissima* (*P. androgyna* Roger) qui est si l'on veut un ♂ à corps du ♀, et qui semble former une caste assez constante de la communauté chez cette espèce.

25. *Stenammas westwoodi* Westw. (Gr. I. 2 g.)

Perkins (47 p. 123).

, Last October, while walking between Dartmouth and Stoke-Fleming, I picked up a small ant. which was moving in a very uncertain and erratic manner. Subsequent examination showed it to be a monstrosity of the above named species; the right half of the body exhibiting characters strongly characteristic of the ♂, while the left half resembles the ♀.

The following is a description of the two halves, drawn up in parallel columns for comparison.

LEFT HALF.

Head red, with darker cloud reaching from vertex to eye.

Mandible very large, with 7 teeth.

Antenna 12-jointed, testaceous, with pale hairs; 1st joint of flagellum longer than next two together; these and the following joints much wider than long; apical joint very large and stout, as long as two preceding; scape very long and bent, as long as many joints of flagellum.

Eye small.

RIGHT HALF.

Head dark brown.

Mandible schmall (the ant being carded I cannot clearly make out the form of the right mandible).

Antenna 13-jointed, dark, thin, with pale hairs; 1st joint of flagellum stouter than next, but subequal to it; the following joints all much longer than wide; apical joint as long as on left side, but not nearly so stout; scape short and straight, only about as long as two joints of flagellum, and *per se* barely half the length of that of left side.

Eye larger; more than twice the size of the other, and much nearer to the base of antenna.

Mesothorax red.

Mesothorax dark, laterally with two rough projections, apparently *tegulae*.

Second node of petiole lighter.

Second node of petiole darker.

Abdomen from middle line testaceous brown.

Abdomen from middle line dark brown.

Legs shorter and thicker.

Legs longer and thinner.

The form of the abdomen, so far as I can make out in this specimen (set on card) is that of the ♀. The shape of the mesothorax is unsymmetrical bilaterally. Length, about 3 mm.‘

26. *Azteca instabilis* Smith. (Gr. I. 2 d.)

Forel (50 p. 268—270; pl. 16.)

„C'est hermaphrodite latéral. Le côté droit est ♂, le côté gauche ♀, du moins jusqu'à l'abdomen. Ce dernier est un peu raccorni et entièrement ♂. La tête est bien partagée par le milieu, sauf l'ocelle médian qui est ♂. Cette tête rappelle beaucoup celle del' hermaphrodite ♀ ♂ du *Polyergus rufescens* que j'ai publié en 1874. Dans mes Fourmis de la Suisse pl. II. fig. 36. La petite mandibule ♂ est absolument privée de dents. L'hermaphrodite entier n'a que 4.5 mill. de long, mais il aurait 5 mill., si l'abdomen était bien développé. Le ♂ normal a donc probablement 5 mill. Les organes génitaux sont entièrement ♂. Du reste la figure rend compte de ses particularités mieux que toute description. Le thorax est étroit, les pattes du côté ♂ sont grêles, celles du côté ♀ sont robustes. Comme la ♀ de l'*A. instabilis* a de 10 à 10.5 mill., nous voyons qu'au contraire du genre *Liometopum*, dont les ♂ sont grands et larges, les ♂ des *Azteca* sont grêles et fort petits.‘ — Blumenau, St. Catharina, Brésilien.‘

(Dr. Mueller).

27. *Formica sanguinea* Latr. (Gr. I. 1 g.)

Tischbein (10 p. 295).

„Am 28. Juli d. J. fand ich in der Nähe meiner Wohnung an einem sehr sonnigen, trockenen Bergabhange ein Nest der *Formica sanguinea* Latr. Dasselbe war unter einem Steine angelegt und zählte etwa 300 Individuen. Ausser den Arbeitern waren bereits ♂ vorhanden, die ♀ aber fehlten noch, weshalb ich,

um die Gesellschaft nicht zum Auswandern zu treiben und später auch ♀ einsammeln zu können, nur eine geringe Anzahl mit nach Hause nahm, unter denen sich aber zu meiner grossen Freude ein vollkommener Zwitter befand, den ich nachfolgend beschreibe:

Das Thier ist der Länge nach durch eine gerade Linie in zwei gleiche Hälften getheilt, und zwar so, dass es rechts ♀ und links ♂ ist.

Kopf, Thorax, Hinterleibsstielchen mit der Schuppe und vordern Hälfte des zweiten Hinterleibssegmentes (das Stielchen als erstes Segment gerechnet) sind demnach rechts, auf der Seite des ♀, roth; links, auf der Seite des ♂ aber schwarz.

Besonders auffallend ist die Form des Kopfes, der eine ganz schief herzförmige Gestalt hat, da die Hälfte des dicken Kopfes eines ♀ an der Hälfte des zierlichen Kopfes eines ♂ sitzt.

Der Kopf ist auf der linken Seite schwarz, auf der rechten roth, jedoch zieht sich die rothe Farbe des ♀ über die Leiste des Clypeus auf die ♂ Seite hinüber, wogegen die schwarze Farbe der ♂ Seite auf der Stirn ein wenig über die Stirnleiste tritt, und sich so auf dem Scheitel ausbreitet, dass die Nebenaugen in einem schwarzen Felde stehen. Die Mandibeln sind vollständig nach ♂ und ♀ verschieden. Links die kleine, kurze, schwarze, am wenig gezähnten Vorderrand röthliche Fresszange des ♂; rechts aber die grosse mit starken Zähnen versehene, rothbraune Fresszange des ♀. Auf der ♂ Seite, der linken, das grosse Auge des ♂, auf der andern, der rechten, das kleine, kaum halb so grosse Auge des ♀. Bei den Nebenaugen überwiegt das ♂ Geschlecht, da nicht nur das auf der linken ♂ Seite stehende Nebenauge die bei dem ♂ normale Grösse hat, sondern auch das vordere Nebenauge von solcher Beschaffenheit ist, wogegen das rechte Nebenauge vollkommen das kleinere Nebenauge des ♀ ist. Links Fühlerschaft schwärzlich, Geissel röthlich mit 12 Gliedern; rechts Fühlerschaft und Geissel roth, letztere mit 11 Gliedern, — also vollständig nach ♂ und ♀ verschieden.

Die Form des Thorax ist bekanntlich bei den geschlechtslosen Ameisen eine andere als bei ♂ und ♀. Bei meinem Zwitter hat derselbe mehr die Form des Thorax der Geschlechtslosen. Auf dem Rücken wird derselbe ziemlich genau in eine schwarze (linke, — ♂) und rothe (rechte ♀-) Seite getheilt, und sind die Brustseiten von derselben Farbe. Auf der Unterbrust ist indessen die Theilungslinie nur am Prothorax genau in der Mitte,

und zieht sich dann am Meso- und Metathorax ausserhalb der Hüften der ♂ Seite hin, so dass der grössere Theil der Brust die rothe Farbe des ♀ trägt. Die vorderste Hälfte der ♂ Seite ist indessen wie bei dem ♂ schwarz, die mittlere wie angeräuchert, und die hinterste fast ganz roth, wie dies ähnlich bei dem normal gebildeten ♂ der Fall ist. Auf der Seite des ♀ sind nicht nur die Hüften, sondern die ganzen Beine wie bei dem gewöhnlichen ♀.

Die Flügel der ♂ Seite sind beide vollständig, vorhanden und durchaus normal gebildet. An der Seite des ♀ fehlen sie natürlich.

Die rechte Hälfte der Schuppe wie beim ♀ roth, zugrundet und bedeutend höher als die linke, ♂ männliche, schwarze Seite, welche oben und zur Seite gerade an der oberen Ecke aber schräg abgeschnitten ist, wodurch sich diese linke, ♂ Seite der Schuppe von der normalen unterscheidet, da diese Ecke sich bei dem ♂ in eine Spitze auszieht. Der Stiel ist ebenfalls wie die Schuppe, links schwarz und rechts roth.

Merkwürdig ist der Hinterleib, und in ihm wohl am meisten die Zwitterbildung ausgesprochen. Derselbe ist genau in der Mitte, vom Stielchen bis zum After, durch eine Linie in zwei Hälften getheilt, und hat wie bei den normal gebildeten ♂ und ♀, an der Seite des ♂ (linke), 7 Segmente der Stiel als erstes Segment gerechnet, an der des ♀, (rechte Seite) 6 Segmente, wodurch die ♂ Seite um etwa $\frac{1}{2}$ Linie länger ist als die des ♀. Dabei tragensämmtliche Segmente beziehungsweise wie bei ♂ und ♀ dieselbe Sculptur, Behaarung und Farbe. Die ♂ Seite ist bis auf den After schwarz, seidenglänzend, an den hinteren Rändern der Segmente glattglänzend und ohne goldgelbe Borstenhaare, deren sich nur einige am After und Bauche zeigen. Auf dem Rücken aber, und besonders nach der Scheidelinie zu ist der ♂ Hinterleib deutlich punktirt. Die Seite des ♀ ist nicht so lebhaft seidenglänzend, auch sind die hinteren Ränder der Segmente nicht so glänzend und ist die Punktirung sehr fein, wogegen überall gröbere, zerstreute Punkte stehen, die nach dem Hinterleibsende zu häufiger werden, und deren jeder ein goldglänzendes Borstenhaar trägt. Die Färbung der rechten Seite ist ganz wie bei dem ♀, d. h. schwarz, mit Ausnahme des vorderen Theiles des zweiten Segmentes, welcher roth ist.

Wie bei dem normal gebildeten ♂ gewisse Begattungswerkzeuge aus dem Hinterleibsende hervorragen, so hängen dergleichen

auch auf der ♂ Seite des Zwitters aus dem Hinterleibsende hervor. Die die Afteröffnung von unten schliessende Klappe ist ziemlich normal gebildet, jedoch wie es die Theilungslinie des Zwitters erfordert, nur zur Hälfte vorhanden. Die übrigen sichtbaren Organe dieser Parthie sind indessen ganz missgestaltet.

Dies ist, so viel mir bekannt der erste Zwitter, welcher bei Ameisen gefunden worden, und überhaupt der vierte aus der Ordnung der Hymenopteren. Merkwürdig ist es, dass ♂ und ♀, nicht aber ♀ und ♀ den Zwitter bilden, wonach es fast scheinen könnte als seien ♂ und ♀ verwandter zu einander als ♀ und ♀, was doch nicht der Fall ist.*

28. *Formica exsecta* Nyl. (Gr. I. 1.d.)

Forel (33 p. 140).

,C'est une ♀ qui a quelques parcelles ♂ à gauche; elle a la taille ordinaire d'une ♀. Sont ♂: 1^o une bande longitudinale noire à gauche sous la gorge, 2^o la moitié gauche du pronotum, 3^o sur le mesonotum, à gauche, une grosse tache noire en V, une protubérance noire (écusson?), et des rudiments d'articulations alaires. Tout le reste est ♀. Le mesonotum est difforme. Cet individu vient d'une fourmilière naturelle.*

29. *Formica rufibarbis* Fabr. (♀ ? — Gr. IV. 1. 3.)

Forel (33 p. 141).

,Cet individu est extrêmement curieux. Les caractères des deux sexes y sont intimement mêlés des deux côtés à la fois. Les deux côtés de la tête sont parfaitement identiques l'un à l'autre, et cependant il est impossible de dire si c'est une tête de mâle ou une tête de femelle; sa forme est exactement intermédiaire entre les deux. Les deux antennes sont de 13 articles, comme chez le ♂, mais le scape est plus long par rapport au fouet. Les deux mandibules sont indistinctement dentelées, mêlées de rougeâtre et de brun; on ne peut dire ni qu'elles soient ♂, ni qu'elles soient ♀. Les ocelles et les yeux sont aussi de forme et de taille intermédiaire. Toute la tête est plus forte que chez le ♂, plus faible que chez la ♀. Elle est noire. Le thorax est indéterminable; ce qu'il y a de plus frappant, c'est que la moitié droite du *metanotum* est rouge jaunâtre et sa moitié gauche noire, tandis que la moitié droite de l'écusson ainsi que de l'écaille

est noire, et leur moitié gauche rouge jaunâtre: donc le *metanotum* est ♀ à droite, ♂ à gauche, tandis que l'écusson et l'écaille sont ♀ à droite et ♀ à gauche. Comme chez la ♂ normale elle-même le thorax a plus ou moins de rouge ou de noir suivant les individus et a la même forme que celui du ♂ chez lequel il est presque entièrement noirâtre, on ne peut s'y reconnaître. Les six pattes sont symétriques, jaunâtres, et ont plutôt la forme ♀. Les ailes sont identiques dans les deux sexes, et par conséquent indéterminables chez notre hermaphrodite. L'abdomen paraît ♀; il a 5 segments (sans compter le pédicule); il est globuleux, assez petit. L'anús est rond, entouré de cils, comme chez la ♀. Mais il s'ouvre en haut dans une fente transversale non ciliée, située entre l'hypopygium et le pygidium, et formant comme un second anus. L'anús proprement dit est taillé dans l'hypopygium. J'ai pris cet hermaphrodite au vol, au sommet du Monte Salvatore, en Tessin. Il volait avec des ♀ et ♂ de son espèce qui s'accouplaient. Cela semble montrer un instinct de reproduction.

Sa dissection me réussit fort mal. Il était conservé dans l'alcool, et ses organes abdominaux avaient été en partie endommagés par quelque pression. Après avoir enlevé la vessie à venin qui était très reconnaissable, de forme à peu près normale, mais courte, ramassée, et a petit coussinet, je découvris à gauche de l'estomac un ovaire parfaitement normal, à gaines remplies d'œufs: il avait la forme ♀, mais il était très petit. A droite, un peu vers le milieu, et placé assez superficiellement, se trouvait un singulier petit organe, évidemment rudimentaire, mais dont je ne puis m'expliquer la signification. Il avait la forme d'un casque très obtus (un peu comme l'ovaire), mais il était compact (ne contenait pas trace de gaines), épais, encore plus petit que l'ovaire, et portait en dessous deux appendices courts et épais, formant comme deux tubercules obovales dirigés en avant où était leur gros bout, de chaque côté de la pointe du casque. Peut-être est-ce un rudiment d'organes génitaux internes ♂. Je n'obtins cet organe que séparé de tout le reste. La glande accessoire de la glande à venin était grande, mais aplatie et difforme. Vers le cloaque, il était fort difficile de se reconnaître. Il y avait là des rudiments d'organes chitinisés (de valvules génitales ♂?). Le canal intestinal était en partie détérioré. En somme donc, les organes génitaux de cet hermaphrodite étaient fort atrophiés: leur nature ♀ à gauche est certaine, confirmée encore par la vessie à venin; à droite il y a doute.

30. *Formica truncicola* Nyl. (♂ ? — Gr. IV. 3. 4.)

Forel (33 p. 140.)

„Ici le mélange est plus intime et l'irrégularité complète. La moitié droite de la tête est entièrement ♀ ; la moitié gauche est plutôt ♂, mais pas complètement. La mandibule gauche est plus petite que la droite et a 7 dents au lieu de 8 (chez le ♂ elle est sans dents); l'antenne gauche a bien 12 articles, mais le 12^{me} est à demi partagé (le ♂ en a 13). Le thorax rouge marqué de noir est surtout ♀, mais il a un peu de ♂ à gauche. Extérieurement, l'abdomen a l'air entièrement ♂; il a six segments (sans compter le pédicule), et les organes génitaux externes (valvules) ♂ parfaitement conformés des deux côtés.

La dissection des organes abdominaux de ce curieux hermaphrodite me montra d'abord les organes génitaux ♂ *parfaitement bien conformés de chaque côté*, occupant la partie supérieure (le dos) de l'abdomen (testicules, vaisseaux déferents, glandes accessoires). En dessous de ces organes régnait une confusion indescriptible qui jointe à ma maladresse et au fait que l'insecte avait été longtemps dans l'alcool fit que je ne pus m'orienter sur la topographie. J'isolai néanmoins deux organes fort nets dont l'un est *un ovaire* plus petit que l'ovaire ♀ et plus grand que l'ovaire ♂. Il a, comme l'ovaire ♀, un grand nombre de gaines. Celles-ci renferment chacune un grand nombre d'œufs, mais tous sont petits; aucune gaine ne renferme d'œufs mûrs à sa base. Le second me paraît être presque certainement une vessie à venin rudimentaire, racornie. On sait que cet organe n'existe pas chez le ♂. Quoi qu'il en soit de la vessie, nous avons là un cas d'hermaphrodisme véritable, présentant deux testicules entièrement normaux, et au moins un ovaire à peu près normal. Le canal intestinal ne présentait rien de particulier, sinon qu'il était presque entièrement vide.

Cet individu a été pris par moi dans les Vosges, près de Saverne, dans une fourmilière.

31. *Polyergus rufescens* Latr. (♂ ? — Gr. IV. 2. 4.)

Forel (33 p. 142).

„Le 18 VIII 1873 j'observais à Vaux le retour d'une expédition d'amazones, lorsque je fus frappé par l'aspect curieux de l'une d'elles, qui portait une larve pillée, comme les autres. Cette amazone était un hermaphrodite ♂♂ presque latéral.

Chose curieuse, il faisait partie de la même fourmilière (ancien appareil) que celui qui est décrit plus haut (a).

Sa tête est absolument ♀; sauf une tache noire sous la gorge à droite. Le prothorax est aussi entièrement ♀; la patte antérieure droite est cependant un peu plus foncée que la gauche. Le mesothorax, le metathorax et le pédicule sont ♀ à gauche et ♂ à droite; la démarcation est très nette, et se trouve sur la ligne médiane. Le côté ♂ du thorax est un peu atrophié; il a cependant un demi-écusson et un demi-postcutellum rudimentaires, ainsi qu'une aile supérieure et une aile inférieure chiffonnées. Les pattes médianes et postérieures sont ♀ à gauche, ♂ à droite.

Les trois premiers segments de l'abdomen sont divisés par la ligne médiane en une moitié droite ♂ et une moitié gauche ♀, aussi bien dessus que dessous. Leurs lames ventrales sont du reste normalement conformées. Mais la moitié gauche de la seconde lame dorsale est soudée à la fois à sa moitié gauche, et à la moitié gauche de la troisième lame dorsale; ces deux dernières ne sont donc séparées l'une de l'autre que jusqu'à la ligne médiane. La moitié droite de la troisième lame dorsale, séparée ainsi de sa moitié gauche, se termine vers la ligne médiane en un bord arrondi. Le 4^{me} segment est entièrement ♂ à l'extérieur; ses lames dorsale et ventrale sont à peu près normales; il en est de même du 5^{me} segment. Il existe un 6^{me} segment assez petit, et défectueux en partie du côté gauche; il est composé d'un *pygidium* (lame dorsale) et d'un *hypopygium* (lame ventrale). Les organes génitaux externes sont entièrement mâles, pairs, normaux, de la grandeur ordinaire; ce sont les écailles et les trois paires de valvules externes qui sont absolument comme chez un ♂ normal. Longueur: 7^{mm}.

La dissection de cet hermaphrodite faite pendant qu'il était frais me montra d'abord un canal digestif normal. Une petite vessie débouchant dans le cloaque à côté du rectum paraît être une vessie à venin rudimentaire sans coussinet distinct. Vient ensuite une matrice médiane, à peu près normale dans laquelle aboutit à gauche une trompe normale (tromp.) qui se termine par un ovaire ♀ normal à six ou sept gaines et à œufs. À droite une glande accessoire ♂ tout-à-fait normale s'ouvre en bas dans la matrice, et se continue en haut en un vaisseau déférent. Ce vaisseau déférent change d'aspect vers sa partie supérieure (cesse d'avoir un double contour); il se termine dans un organe fort complexe qui contient d'un côté plusieurs gaines d'ovaires distinctes avec de œufs et de l'autre

un appendice épais, irrégulier, d'aspect granuleux, qui doit probablement être un rudiment de testicule dans sa tunique.

Cet hermaphrodite est encore fort curieux à un autre point de vue; il montre clairement que l'intelligence des fourmis réside dans leur tête. En effet, il sut non seulement aller au pillage avec l'armée, mais encore prendre une larve aux *rufibarbis* pour la rapporter chez lui. Les ♀ même ne savent pas faire cela. Comment un ♂ le sait-il? C'est parce que sa tête, et par conséquent son cerveau, sont entièrement ♀; le reste du corps (valvules ♂, glande accessoire etc.) n'a avec ses ganglions aucune influence sur les facultés intellectuelles ni sur les mœurs d'une fourmi.

32. *Polyergus rufescens* Nyl. (Gr. IV. 2. 3.)

Forel (33 p. 139; T. 2 F. 36).

C'est sans contredit le plus curieux d'aspect. Il est presque latéral. La moitié droite de la tête est presque exactement ♂ et la moitié gauche ♀; à droite la tête est donc noire avec une mandibule très courte (Fig. 36, mm), un œil énorme, une antenne, à scape court et à long fouet; à gauche elle est rousse avec une grande mandibule arquée, un œil assez petit et une antenne ♀. La ligne de démarcation entre le côté noir (♂) et le côté roux (♀) est extrêmement nette, à peu près médiane. Cependant l'ocelle antérieur est en entier sur le côté ♂; il est fort gros ainsi que l'ocelle droit, tandis que l'ocelle gauche (♀) est petit. *Pronotum* ♀, sauf deux taches mâles à droite. *Mesonotum* ♀ à gauche et ♂ à droite où il a des ailes chiffonnées et une moitié d'écusson (à gauche il n'a naturellement pas trace d'ailes). *Metanotum* et pédicule ♀ sauf quelques taches noires (♂) à droite. Pattes droites à moitié ♂. Pattes gauches ♀. Abdomen (extérieurement) entièrement ♀. Taille d'une ♀. Cet individu est éclos dans une de mes fourmilières artificielles où je l'observai vivant pendant deux semaines entières. Il courait fort bien avec les autres fourmis. Je ne le vis pas manger, car les *P. rufescens* ne mangent pas seuls. Par contre je remarquai que les mouvements de ses membres droits, en particulier de la mandibule, étaient parfaitement coordonnés avec ceux des membres gauches correspondants. Je ne le disséquai pas.

33. *Camponotus ligniperdus* Latr. (Gr. IV. 2. 4.)

Klapálek (53 n. o. XXVIII.)

V Museu král. Česk. jest obojetník *Camponotus ligniperdus*, jež + prof. Duda nalezl u Soběslavě: prof. Klapálek jej popisuje následovně:

Na hlavě jest celá levá strana mnohem delší než pravá. následkem čehož nabývá podoby velmi nepravidelné, na pravou stranu zkřivené: rovněž *clypeus* jest stejně sešikmělý, na pravo kratší než na levo. Zvláště nápadna jest však tato nesouměrnost na čele, jehož pravá listna jest mnohem kratší než levá. Zadní část hlavy klene se na straně levé v ostrém oblouku, kdežto na pravé jest oblouk tupý. *Mandibula* levá dokonale odpovídá téměř ústrojí dělnice; jest silně vyvinuta, 5-zubá, kdežto pravá *mandibula* jest malá, jako u ♂ vyvinutá. *Makadla* nelze dobře pozorovati, poněvadž jsou na ústech schoulena. *Tykadlo* levé má násadku zřetelně silnější a do předu prohnutou a bičík, na němž bohužel shledáváme pouze 10 článků, kdežto poslední jest ulomen; rovněž bičík jest maličko silnější; tvarem odpovídají tykadlům ♀. Pravé má násadec štíhlejší, rovný a bičík zřetelně 12členný a tvar tykadla samčích. Z očí složených zdá se oko levé o poznání menším; z očí vyvinuta jsou pouze dvě a to přední ležící v čáře medianní a pravé postranní; po levém nenacházíme ani stopy.

Pronotum jest velmi nesouměrné, levá polovice jest daleko mohutněji vyvinuta než pravá; levá plec jest mnohem klenutější než pravá. *Mesonotum* jeví do jisté míry nepravidelnost strany pravé v tom, že *scutellum* jest se strany pravé vmačklé oblou brázdou, která před krajem *postscutella* až ku kořenu rudimentu křídla se táhne. U ♂ dokonalého jest sice mělká brázda znatelná, ale jest mnohem menší a štítek sám jest poměrně daleko větší. Levá strana jest dokonale po způsobě dělnice vyvinuta, zřetelně na zad zúžena a na straně srázná tvoříc nahoře tupou hranu. *Metanotum* jest na straně levé zrovna tak jako *mesonotum* srázné a tvoří nahoře tupou hranu, kdežto na straně pravé jest pěkně zoblono. Obě křídla na straně levé scházejí úplně nezanechavše prázdného rudimenta: na straně pravé však nacházíme malé zbytky křidel, jež poukazují na to, že byla křídla násilně oddělena.

Šupinka stopková jest na hraně hřbetní značně hluboko trojúhelní vykrojena, čímž upomíná na ♂, lalůček levý však jest poněkud menší. *Zadeček* jest v předu na straně levé značně širší, než na straně pravé; kdežto pravá strana má při pohledu shora obrys mírně sice, ale stejnoměrně klenutý, jest levá v předu vyklenutější, do zadu se však zúžuje. Také v obrvení jeví se znač-

ný rozdíl. Na prvním *) kroužku nacházíme na zadním kraji levé části řadu dlouhých štětinek, které pravé straně scházejí; na druhém kroužku táhne se v první třetině levé strany příčná řada dlouhých štětinek až ku mezi obou polovin, na pravé straně však schází: na obou stranách táhne se as $\frac{1}{2}$ délky kroužkové krátká příčná řada zabírající krajní $\frac{1}{4}$ šířky kroužkové; zadní kraj téhož kroužku jest pouze na straně levé řadou štětinek opatřen. Na kroužku třetím vyvinuta jest pouze na straně levé příčná řada v přední třetině a na zadním kraji; obě sahají pouze ku mezi obou polovin. Podobně má se věc na kroužku 4., kde však již při pravém kraji jest sem tam nějaká štětinka vyvinuta. Kroužek 5. a 6. jsou na celém povrchu spoře štětinaté. Kroužek 6. a následující jsou dokonale samčí; poslední pak nese zevní ústroje genitální ♂ dokonale vyvinuty.

Nohy prvního páru mají levé stehno o něco kratší, ale silnější než pravé; podobně také holen i 1. články chodidla jsou na levé straně o něco kratší a silnější než na pravé; ostatní články pravého chodidla jsou bohužel pochroumány. Ve druhém páru jest levá noha celá silnější než pravá, stehna jsou skoro stejně dlouhá, pravá holen jest poněkud kratší. Ve třetím páru jest levá noha značně silnější a větší než pravá; polštářky mezi drápkami pravé nohy jsou veliké. Při pohledu se strany břišní vidíme dobře rozdíl mezi kyčlemi obou stran; na levé jsou mnohem silnější a větší než na pravé a to zvláště u předních dvou párů, kdežto u posledního jest rozdíl ten celkem malý.

Nápadný jest však rozdíl obou stran v *barvě*. Na hlavě jest celá levá čelist' vyjma černé špičky zubů červenohnědá. Také přední část' hlavy as na $\frac{1}{4}$ délky jest červenohnědá a pak ztraceně přechází v barvu černohnědou ostatního povrchu hlavy vyjma levý kout týlní, který má poněkud červenohnědý nádech. Na hrudi jest celá levá strana žlutohnědá, kdežto pravá jest celá černohnědá pojímaje v to i mírně vyklenuté scutellum. Také šupinka stopková jest na levé straně žlutohnědá, na pravé černohnědá. Na zadku jest ještě první kroužek rozpuštěn jsa na levé straně žlutohnědý, na pravé černohnědý. Ostatní zadeček jest černohnědý, vyjma přední část' druhého kroužku, která jest slabě žlutohnědě naběhlá a zadní kraje kroužků všech, které jsou bíle hedbávitě lesklé. Kroužky poslední, tvořící kroužky genitální, jsou šedožluté. Tykadla jsou tmavě červenohnědá; nohy jsou svrchu vesměs

*) Badiž připomenuto, že, kdekoliv jest řeč o zadečku, míněno jest zadeček bez kroužků tvořících stopku.

žlutohnědé, na straně spodní jsou u předních dvou párů levé nohy rovněž světle žlutohnědé, pravé však kaštanově hnědé; pár poslední jest na obou stranách stejně zbarven.

Z toho, co svrchu pověděno, vyplývá patrně, že máme zde co činiti s obojetníkem velmi dokonalým, a sice laterálním, jehož levá strana jest dělníci, pravá však samci, vyjma poslední cípek zadečku, který náleží zřetelně pohlaví ♂. Můžeme tak ovšem souditi pouze podle druhotných znaků pohlavních; genitálie samy zkoumati jest nemožno. Na straně hřbetní jde čára dělicí takto: na hlavě přesně v polovici přes střed clypeu, čela k očku prostřednímu, jež však jest celé vyvinuto, až do prostřed týlu; čára tato jest veskrze jako slabá rýžka patrna. Na hrudi není mez tato rýhou vytčena, ale za to jest čára demarkační různým zbarvením obou stran znamenitě vyznačena a jde přesně středem všech tří kroužků. Totéž shledáváme na šupince stopkové. Na zadečku jest opět mez naznačena slabým vtiskem, který táhne se opět v čáře medianní na kroužku 1., 2. a 3., ač netvoří čáru přímou, nýbrž jest poněkud prohýbán; na kroužku 4. se uchyluje v levo, tak že ♂ část jest větší; na 5. konečně táhne se tak, že končí právě mimo levou stranu kroužku 6., následkem čehož kroužek 6. a následující připadají docela polovinně ♂, čímž ovšem souměrnost mizí. I na straně břišní táhne se mez čarou medianní až ke kroužku 6., jež už zcela náleží ♂, což hlavně můžeme na vyvinutí štětinek pozorovati, které před zadním krajem kroužku na straně dělníci stojí, kdežto na straně ♂ scházejí.

Délka 13 mm (bez vychlípeného kroužku 6. a následujících) *

Im Museum des Kön. Böhmen befindet sich ein vom † Prof. L. Duda bei Soběslau in Böhmen gesammeltes hermaphrod. Ex. v. *Camponotus ligniperdus* Ltr. Der Körper ist auffallend verunstaltet und an beiden Seiten verschieden gefärbt. Der Kopf ist sehr unregelmässig, die linke Seite grösser als die rechte, der *clypeus* schief, die linke Mandibel stark entwickelt, 5zählig wie bei den ♀, die rechte dagegen klein wie die der ♂. — Der linke Fühler gleicht dem eines ♀, der rechte dem eines ♂. — Von den zusammengesetzten Augen scheint das linke etwas grösser zu sein; von den Punktaugen sind blos 2 entwickelt, das vordere in der Medianlinie und das rechte seitliche. *Pro-*, *Meso-* und *Metanotum* sind ebenfalls unsymmetrisch; die linke Seite hat keine Flügel, auch keine Flügelrudimente, während rechts kleine Flügelreste sich vorfinden, die auf eine gewaltsame Entfernung der Flügel hinweisen. Die Schuppe des *pediolus* erinnert durch ihren tief dreieckigen Ausschnitt an ein ♂. Der Hinterleib ist vorn links bedeutend breiter als rechts; die linke Hälfte der Hinterleibsringe

trägt viel mehr Borsten als die rechte, wo sie entweder ganz fehlen (1. u. 3. Ring) oder nur spärlich vorhanden sind. Der 6. und die ff. Hinterleibsringe sind ganz ♂, der letzte trägt die äusseren, vollkommen ausgebildeten ♂ Genitalien. Die Glieder der linken Beine sind stärker als die der rechten. Auffallend ist der Unterschied in der Färbung beider Körperhälften: Der linke Kiefer und der Vordertheil des Kopfes sind rothbraun, der übrige Theil des Kopfes schwarzbraun, die linke Hälfte des Thorax, des Schüppchens und des 1. Hinterleibsringes gelbbraun, die rechte Hälfte und die übrigen Hinterleibsringe schwarzbraun, die Genitalringe graugelb. Aus diesen äusseren Merkmalen schliesst Prof. Klapálek, dass das Ex. ein lateraler Hermaphrodit ist, dessen linke Seite (ausgenommen den 6. und die ff. Hinterleibsringe) an ♀ und dessen rechte an ♂ erinnert. Die dorsale Theilungslinie ist am Kopf, *clypeus* und Hinterleib durch eine feine Rinne markirt, sonst durch die verschiedene Färbung der Körperhälften gegeben; sie verläuft ganz median, auch an der Ventralseite, bis zum 4. Hinterleibsringe, wo sie nach links umbiegt, um am 5. ausserhalb der linken Hälfte des 6. Ringes zu enden, so dass der 6. und die ff. Ringe ganz ♂ sind und so die Symmetrie der beiden Körperhälften gestört ist. Länge 13 mm *).

34. *Mutilla europaea* L. var. *obscura* Nyl. (Gr. I. 1 g.)

Maecklin (12 p. 106—112).

Den hermafrodit af *Mutilla obscura*, som jag lyckades påfinna lefvande i Helsingfors, öfverenstämmar på mångfaldigt sätt med ofvannämnde exemplar af *Formica sanguinea*, och som de begge könen inom detta släkte, särdeles hos denna art, ganska betydligt afvika från hvarandra både till kroppsform och färgteckning, så är denna individ så mycket mera framstående. Hela högra sidan motsvarar i hvarje afseende de mindre exemplaren af *Mutilla europaea* ♀, som äfven af Nylander förmodas utgöra det qvinliga könet till *Mutilla obscura*; hvaremot den venstra sidan fullkomligt öfverenstämmar med hannen af sistnämnde art. Hela exemplaret är snedt, till följe af de begge könens olika kroppsform. Den högra antennen är mycket kortare, samt hufvudet för öfrigt deladt genom en krokig linie i tvenns hälfter, hvaraf den högra utmärker

*) Diese auszugsweise Uebertragung ins Deutsche verdanken wir dem hochw. Herrn Emil Kapoun, d. z. Hörer der Philosophie an der Universität in Innsbruck.

sig genom fullkomligen svart färg, mycket gröfre och glesare punktering samt genom ögats läge närmare framsidan af hufvudet. Den venstra sidan af hufvudet är till färgen svartblå, mycket finare och tätare punkterad samt för öfrigt försedd med tvenne punktögon, som helt och hållet saknas på den högra sidan.

Det är nemligen fallet, att endast hannen hos detta slägte, utom de begge sammansatta ögonen, är försedd med trenne enkla, såkallade punktögon. Ryggskölden, som på högra sidan är rödbrun, saknar icke allenast vingar, utan derjemte alla de delar, som tjena till vingarnas fästande, och erbjuder derigenom en genast i ögonen fallande likhet med de vinglösa honorna inom detta slägte. Den venstra sidan af ryggskölden är svart och bevingad. Buken är äfvenledes genom en linie delad i tvenne hälfter, hvaraf den högra är svart med de hos begge könen förekommande silfverglänsande hvita tvärbanden, och skiljer sig från den venstra svartblåa manliga sidan genom en ännu tätare och rugulerad punktering, samt genom en serdeles lång och tät hårbeklädnad. Honorna i detta slägte äro försedda med en tagg, och under lifstiden utsköt exemplaret en sådan i sned riktning från den kvinnliga sidan. Olikheter på undre sidan af buken äro mindre ögonen fallande.

Till antydning af gränsskilnaden emellan de begge könen, har en något förstörad afbildning blifvit bilagd.

Die Abbildung (colorirt) zeigt deutlich einen genau lateralen Gynandromorph, der links rein ♂ und rechts rein ♀ ist. Der Kopf lässt rechts die stärkere Behaarung und den kürzeren Fühler des ♀ erkennen; der Thorax ist rechts hellroth und ohne Flügel, links schwarzblau mit Vorder- und Hinterflügel; das Abdomen erscheint etwas seitlich gekrümmt, rechts mit stärkerer gelblicher Behaarung und auffallenderer Rundung. -1 mm lg.‘

35. *Scolia sexmaculata* Fabr. (Gr. IV. 1. 4 (5).

Romand (3 p. 653).

♂ à droit, ♀ à gauche, pour les antennes et les ailes mais dont les cuisses et les pattes sont celles d'une ♀, tandis que l'abdomen est celui d'un ♂. —‘

36. *Pepsis dimidiata* Fabr. (Gr. I. 2 a.)

Mocsáry (41 p. Fig. 14).

„*Pepsis dimidiata* Fabr. Szép nagy díszdarázs (Pompilida), mely több rendes alkotású társával együtt Braziliából került a

muzeum gyűjteményébe. A *Pepsis*-fajok általában Dél-Amerikában tenyésznek és úgy nagyságra, mint tényes színpompára nézve valamennyi díszdarász között a legelső helyet foglalják el. Rendesen nagyobb pókokban szoktak kifejlődni. A két ivar egymástól már külsejére nézve is különbözik. A hím termete kisebb és karcsúbb; csápjai hosszabbak, 13 izülekből állanak s a rovar halála után is mindig egyenesen vannak kinyújtva; tarsusai aránylag valamivel hosszabbak és oldalvást összenyomottak. A nőtény ellenben sokkal nagyobb, zömökebb; csápjai rövidebbek, csak 12 izülekből állanak és óra-rugó módjára vannak összekunkorodva; tarsusai rendes alkotásuak.

Ugyanezek a különbségek mutatkoznak a *Pepsis dimidiata* fajnál is, a melynek híme 21, nőténye pedig 23 mill. hosszú szokott lenni; amannak csápjain az utolsó három izülek, emezéin pedig az utolsó hat izülek világos sárga. Az egész rovar teste és lábai különben szép sötét ibolya- és csillogó fényűek; csápjai feketék; sárga szárnyainak végső fele szélesen sötétbarna.

Tökéletesen jól kiveketők a két ivar között levő különbségek az ide mellékelt rajzon (14. ábra), mely hermaphrodita példányunkat természetes nagyságban mutatja. Különösen feltűnik a különbség a csápjainak alkotásában és színében, mely első pillanatra elárulja, hogy az illető rovar jobboldali fele hím, baloldali fele pedig nőtény. E példány hossza 23 mill. s e szerint nagyságára nézve a normális nőténynyel megegyezik.*

,Es ist ein ♀, das nur den Kopf lateral gynandromorph hat und zwar rechts den langen 13gliedrigen, ♂, Fühler, die kleinere Mandibel und die smaragdgrüne, seidenartige, ♂ Behaarung des Kopfes. (Manas, Brasilien *).

37. *Sphecodes reticulatus* Thoms. (Sph. distinguendus Hag.) (Gr. I. 1.a.)

v. Hagens (35 p. 73).

,Von den Fühlern ist der rechte ♀, der linke ♂. Auch die linke Seite des Gesichtes ist, wie bei den ♂ weisslich behaart. Im Uebrigen ist der ganze Körper ♀.*

*) Die Einsicht des Exemplares verdanken wir Herrn A. Mocsáry.

38. *Prosopis obscurata* Schenck. (Gr. I. 2 e.)

v. Hagens (35 p. 73).

„Die Farbe des Vorderkopfes ist getheilt, die rechte Hälfte des Gesichtes ist weisslich, wie beim ♂, die linke hat nur einen weisslichen Flecken, wie beim ♀. Fühler und Mandibeln sind ♀. Am auffallendsten ist die Spitze des Hinterleibes (welcher beim ♂ aus 7, beim ♀ aus 6 Segmenten zu bestehen pflegt). Hier findet sich nur die rechte Hälfte eines 7. Segmentes und die rechte Hälfte der ♂? Genitalien, nämlich von den Paar Zangen und den Paar Klappen nur je eine. Daneben befinden sich mehrere Stacheln.“

39. *Hylaeus spec.* (Gr. I. ? a.)

Klug (11 p. 102).

„ein ♂ und ein ♀ Fühler. Nordamerika.“

40. *Haliectus cylindricus* Fabr. (Gr. I. 2 a.)

Krieger (49 p. 139).

„Eine dieser Art angehörige Biene, die ich am 5. Aug. 1890 bei Wahren in der Nähe von Leipzig gefangen hatte, erwies sich bei näherer Besichtigung als ein sogenannter unvollständiger Zwitter. Ihr Kopf setzt sich nämlich aus einer rechten ♂ und einer linken ♀ Hälfte zusammen. Am auffallendsten ist der Unterschied an den Fühlern. Der Kopfschild ist rechts ein gutes Stück weiter vorgezogen, weiss gefleckt und am Rande ohne stärkere Borsten, links kürzer, ganz schwarz und am Rande dicht mit Borsten besetzt. Der Scheitel ist auf der ♂ Seite ein wenig schmaler als auf der ♀. Beine und Hinterleib sind rein ♀. Das Tier ist für *cylindricus* auffallend klein (8 mm lang), gehört aber entschieden zu dieser Art, nicht zu *albipes* F.“) Leider war es, als ich die eigenthümliche Kopfbildung bemerkte, für eine Untersuchung der in-

*) Die ♂ beider Arten unterscheiden sich, was noch nicht bekannt zu sein scheint, unter anderm auch dadurch, dass bei *cylindricus* das 2. Geisselglied deutlich länger als das 3. ist, bei *albipes* aber beide etwa gleich lang sind.

neren Genitalien schon zu spät, ich musste mich also darauf beschränken, die chitinige Genitalbewaffnung heraus zu präpariren. Ich fand dabei einen normal gebildeten Stachelapparat, der nur auf der rechten Seite, also auf der mit der ♂ Kopfhälfte, eine geringfügige Verkümmernng zeigt. So beträgt z. B. die Länge der quadratischen Platte rechts 0,630 mm, links 0,675 mm, die oblonge Platte misst rechts vom Gelenk mit dem Winkel bis zur oberen Ecke 0,420 mm, links 0,465 mm und der Winkel ist links etwas kräftiger. Die rechte Stechborste lag nicht in ihrer Führung in der Stachelrinne.

41. *Halictus cylindricus* Fabr. var. *albipes* Fabr. (Gr. I. 1 f.)

Slavicek (51 p. 105).

Am 6. April vorigen Jahres (d. i. 1894) habe ich auf Weidenkätzchen ein Exemplar von *Halictus cylindricus* F. (var. *albipes*) bemerkt, das mir durch die unregelmässige Form des Hinterleibes aufgefallen ist. Wegen dieser Unregelmässigkeit habe ich diese Biene gefangen. Bei näherer Betrachtung sah ich, dass es sich hier um eine schön ausgebildete Zwitterform handelt, die besonders schön am Hinterleib und den Beinen entwickelt ist. Der Körper ist vom Hinterrücken an halbirt, an der linken Seite treten ♀, an der rechten ♂ Charaktere hervor: am Kopf und Vorderrücken ist kein Unterschied bemerkbar. Die wichtigsten Unterschiede sind folgende:

Hinterleib links seitlich gleichmässig gerundet, so dass die länglich eiförmige Form des ♀ Körpers bemerkbar ist, rechts ist der Seitenrand fast gerade, der Hinterleib gegen das Ende etwas verdickt und dann plötzlich zugerundet, also cylindrisch.

Das erste Segment an der linken Hälfte sehr glatt und glänzend, kaum punktiert, an der rechten dicht und ziemlich grob. Die Punktirung der übrigen Segmente gleich. Die Segmentränder sind röthlich gefärbt, vom zweiten an links mit dichten Härchen fransenartig bedeckt, an der rechten Seite fast nackt und nur mit einzelnen Härchen bewimpert. Besonders auffallend ist der Unterschied in der Behaarung an den letzten Segmenten. Auch die Furche des vorletzten Segment ist in Folge dieser ungleichmässigen Behaarung links scharf, rechts undeutlich abgegrenzt.

Füsse sind links ganz ♀ gefärbt, das heisst schwarz, die Hinterschenkel mit langen Haarlocken, die Schienen und

Fersen dicht gelblich, seidenschimmernd behaart; an der rechten Seite sind die Füße wie an normal gefärbten ♂, das heisst bis zu den Fersen schwarz; Hintertibien haben an der Basis einen schmalen weisslichen Ring, die vorderen an der Aussenseite bloss ein solches Fleckchen; alle Tarsen sind gelblich-weiss die letzten Tarsenglieder sind röthlich. Behaarung sehr schwach.

Der Hinterrücken hat an der linken Seite schärfer vortretende Leisten, rechts ist er mehr gewölbt mit schwächeren Leisten, und etwas stärker gerunzelt.

Das zweite Exemplar ist eine Blattwespe „*Tenthredo atra* L.“, bei der die Zwitterbildung nicht so deutlich ausgeprägt ist und nur durch unvollständig ausgebildete Genitalien und die Färbung des Hinterleibes angedeutet ist.‘

42. *Andrena fulvescens* Westw. (Gr. IV. 2. 6.)

Shuckard (4 p. 72).

,in which the sexes are intinely interminyled. The antenna on the right side is ♀, on the left ♂, but although having thirteen joints, not longer than that of the ♀. The nose is only coloured in streaks (in the ♂ the entire clypeus is of a milky colour); the abdomen is ♀, having only sex segments; the podex is precisly as in the ♀, whereas there are seven ventral plates; and in the legs the ♂ conformation predominates, although also (there) there is a struggle between the sexes for precedence.‘

43. *Andrena praecox* Scop. (Gr. I. 1 a).

Dittrich (44 p. 4).

,Beim Durchmustern meiner im Jahre 1887 gesammelten *A. praecox* ♀ bemerkte ich auf dem Kopfschild des einen aus Carlowitz bei Breslau stammenden Stückes eine weisse Haarlocke. Da die ♀ dieser Bienen-Art auf dem Kopfe schmutzig gelbgrau behaart, die ♂ aber an dieser Stelle weissbärtig sind, untersuchte ich das Thier genauer und fand, dass die linke Seite des Kopfes überhaupt ♂ Eigenschaften darbot, während die rechte ♀ erscheint....“

Die linksseitige weisse Behaarung reicht etwas über die Mittellinie des Kopfschildes hinaus, ist nicht so dicht, wie beim normalen ♂ und an dem Augenrande mit dunkleren Härchen

gemischt. Die rechte Seite ist mit kürzeren, gelbgrauen Haaren besetzt. Der linke Fühler, welcher um mehr als 2mm länger ist als der rechte, sitzt anscheinend etwas tiefer als dieser, sein 2. Geisselglied ist, wie beim normalen ♂, $1\frac{1}{2}$ mal so lang als das 3. während beim rechten Fühler das 2. Glied 3mal so lang ist als das 3., wie beim normalen ♀. Unter den Nebenaugen sind das linke und mittlere grösser und heller als das wie eingesunkene rechte *). Der linke Kiefer ist sichelförmig, lang, reicht fast bis zum Grunde des rechten und trägt an seinem Grunde einen starken, zackigen Zahn, wie dies auch beim normalen ♂ der Fall ist. Der rechte Kiefer ist wie bei gewöhnlichen ♀ zahnlos und ragt nur wenig über die Mittellinie hinaus. Die linke Schläfe ist wie beim gewöhnlichen ♂ stark verbreitert und unten rechtwinkelig, die rechte weit schmaler und abgerundet. Der Kopf ist im Uebrigen höchstens so breit als die Brust, während beim normalen ♂ der Kopf erheblich breiter ist als jene. überhaupt sind alle übrigen Körpertheile, Brust, Hinterleib, Beine und Flügel in Form und Behaarung ♀. Eine Untersuchung des aufgeweichten Thieres ergab, dass ♂ Begattungsorgane durchaus fehlen, allerdings gelang es mir auch nicht, den Stachel aufzufinden. Das Thier ist demnach, wie schon das Aeussere zeigt, als ♀ anzusprechen und gehört zu den Thieren, welche nach von Siebold **) nicht echte Zwitter, sondern Monstrositäten sind, wobei allerdings zu bemerken ist, dass die angeführten ♂ Eigenschaften ausgesprochene sind und nicht bloss an die entsprechenden der normalen ♂ erinnern.

44. *Andrena angustipes* Schenck, *A. albicus* (Gr. III. 2c).

Schenck (29 p. 335).

„Ist ein Hermaphrodit, wahrscheinlich von *A. albicus* Kirby. Alle Theile wie beim ♀, nur die Hinterbeine gestaltet und behaart wie beim ♂, aber versehen mit einer Hüftlocke. und der Schenkel gestaltet und behaart wie beim ♀.“

*) Die Farbe und Grösse der Nebenaugen geben übrigens keine secundären Geschlechtsunterschiede ab, ähnliche Verschiedenheiten derselben wie die erwähnte, habe ich auch an normalen ♀ und ♂ gefunden.

**) Ueber Zwitterbildung der Insecten in: Stettin. entom. Zeitg. XV. 1854. p. 98—101.

45. *Andrena convexiuscula* Kirby. (Gr. III. 1 b.)

Schenck (29 p. 335).

„Der Hinterleib des ♀, sonst alle Theile vom ♂.“

46. *Andrena helvola* L. (Gr. III. 2 c.)

Schenck (29 p. 335).

„Kopf, Thorax und Hinterleib des ♀, an den Hinterbeinen die Hüftlocke des ♀, aber Schenkel, Schienen und Tarsen gebildet und behaart wie beim ♂.“

47. *Andrena fasciata* Wesm. (Gr. I. 1 d.)

Schenck (29 p. 335).

„Der Hinterleib ist völlig der des ♀, ebenso die Grösse des ganzen Körpers. Kopf und Thorax mit allen daran sitzenden Theilen links ♂, rechts ♀. Die linke Hälfte des Kopfes und Thorax ist ganz behaart wie beim ♂, die rechte wie beim ♀; der linke Oberkiefer ist der des ♂, der rechte der des ♀; der linke Fühler hat die Gestalt, Länge und Gliederzahl des ♂, der rechte die des ♀; die Beine der linken Seite sind gestaltet und behaart wie beim ♂, die der rechten Seite wie beim ♀, also die rechten Hinterbeine allein mit Sammelhaaren versehen.“

48. *Andrena thoracica* Fabr. (Gr. I. 2 d.)

Smith (30 p. XIV.)

„In this specimen the ♂ characters are on the right side and are observable in the antennae head and legs.“

49. *Macropis labiata* Fabr. (Gr. I. 2 g.)

Enock (40 p. 25.)

„A perfectly bilateral hermaphrodite, the antennae, face, palpi mandibles, legs, and genitalia showing very characteristically; the right side was ♂, the left ♀ (3. fig.) The specimen was captured at Woking station on Aug. 7. last, when the species was quite plentiful at the flowers of thistles, *Lysimachia* and *Potentilla comarum*.“

50. *Nomada succincta* Panz. (Gr. I. 2 d.)

Ritsema (38 p. CXL)

„ , waarvan het achterlijf geheel vrouwelijk is. ^c Rechte Hälfte von Kopf und Thorax ♂, linke ♀; Hinterleib ganz ♀.

51. *Nomada fucata* Panz. (Gr. IV. 1 u. 3.)

Schenck (29 p. 335).

„Der Kopf mit allen daran befindlichen Theilen wie beim ♂, ebenso gefärbt und behaart, die Fühler 13gliedrig, von Farbe und Länge wie beim ♂. Der Hinterleib ist durchaus der des ♀, daher mit einem Stachel, die rechte Hälfte des Thorax ist behaart, wie beim ♀, kurz und schwarz, die linke wie beim ♂, gelblich und länger; die rechten Beine sind die des ♀ in Farbe und Behaarung, die linken die des ♂; ebenso verhält es sich mit den Flügelschuppen und den Flügeln.“

52. *Nomada baccata* Sm. (Gr. IV. 1 u. 6.)

Smith (30 p. XIV.)

„In this specimen the ♂ characters are found to be on the left side: the head is about equally divided sexually: the antennae having in the ♂ sex the front side white and also a white line at the inner margin of the eye and the face covered with silvery hair: the ♂ mandible is longer and pointed at the tip; in the ♀ it is blunt. Thorax is coloured as in the ♀. Abdomen exhibits a strange peculiarity: the apical segment above is blunt, as in all the ♀♀ of the genus, whilst beneath it is acute; there are the usual 6 segments above, beneath there are 7. Taken at Meybridge in 1845.“

53. *Nomada glabella* Thoms. (meist *N. ruficornis* L. var. *glabella* Thoms.) (Gr. I. 3 d.)

v. Hagens (35 p. 73).

„Am Kopfe sind die Mandibeln gelb gezeichnet, also ♂ der linke Fühler ist ♂, der rechte fehlt. Das Gesicht ist rechts röthlich gezeichnet wie beim ♀, links gelblich und länger behaart wie beim ♂. Während das ♀ dieser Art 4 rothe Längsstreifen auf dem Rücken hat fehlt hier der rechte innere Streifen. Ebenso ist das Schildchen auf der linken Seite

roth, auf der rechten schwarz und länger behaart. Es ist also hier die rechte Seite wesentlich ♂, während es beim Kopfe die linke war. Die Seiten der Brust haben rothe Flecken, wie beim ♀; der Hinterrücken zeigt nur eine unbedeutende Spur von roth. Der Hinterleib ist durchaus ♀.

54. *Xylocopa violacea* L. (Gr. I. 3 d.)

Kriechbaumer (32 p. 137).

„Zeigt darauf einen von ihm zwischen Triest und Miramare gefangenen Zwitter der violetten Holzbiene (*Xylocopa violacea*) vor. Die rechte Hälfte des Kopfes ist entschieden ♂, die linke ♀, indem jene kürzer ist als diese: ebenso ist auch das rechte Fühlhorn ein ♂, da es 13 Glieder besitzt und deren beide vorletzte Glieder braungelb gefärbt sind, während das linke 12gliedrig und einfärbig schwarz, also ♀ ist. Im Gegensatze dazu zeigt die linke Hälfte des Brustrückens die längere graue Behaarung des ♂, die rechte, scharf abgegrenzt davon, die kürzere und schwache des ♀. Die Beine zeigen sich im Ganzen als ♂, doch hat an den Vorderschienen nur die linke derselben die ärmelartig lange Behaarung, welche das ♂ auszeichnet.“

55. *Anthophora retusa* L. (Gr. I. 1 d.)

Shuckard (4 p. 78).

„Right half of the head and of the thorax, ♀, antennae et legs on the right side ♀: abdomen entirely ♀: but the whole of the thorax above is ♂; what is not described as ♀ is the other sex.“

(Smith p. XIV). „In 1836 I took *Anthophora acervorum*, in the April, at Barnes, Surrey. In this example the ♂ characters are very conspicuous, and are all situated on the left side, most conspicuously so in the head, thorax and legs.“

56. *Anthophora acervorum* L. (Gr. 2.)

Smith (30 p. XIV.)

„A 2d example of *Anthrophora acervorum* is in the collection of the late Mr. Walcott of Bristol; but the sexual peculiarities of structure are much less apparent than in that exhibited.“

57. Chalicodoma muraria Fabr. (Gr. III. 1 b.)

Frey-Geßner (48 p. 372.)

Bei der Sichtung der Apiden-Ausbeute fiel mir unter den ♂ von *Chalicodoma muraria* Fabr. ein grösseres verblasstes Stück auf, und wie ich nach der Bezeichnung des letzten Hinterleibssegmentes sah, erblickte ich zu meiner Verwunderung, dass ich ein ♀ vor mir hatte. Schnell griff ich nach den Beschreibungen von *Ch. nobilis* Dours und *Ch. rufescens* Perez, mit der frohen Aussicht, eine für die Schweiz neue Spezies anmerken zu können, aber die betreffenden Beschreibungen wollten auf ein ♀ absolut nicht passen. Andere Arbeit verhinderte mich, der Sache weiter nachzuspüren. Ein Jahr später erhielt ich unter einer Sendung Hymenopteren von Herrn M. Paul in Siders gesammelt, ein zweites solches ♀, prächtig frisch und von einem *Ch. muraria* ♂ nur durch den Mangel des gezähnten Randes des letzten Hinterleibssegmentes, dagegen durch den Besitz eines ♀ Stachels sammt gleichzeitig ♀ gebildetem letzten Hinterleibssegment verschieden, doch ich hatte auch leider jetzt keine Zeit, mich mit meiner eigenen Sammlung mich zu beschäftigen, die Museumsarbeiten nahmen stetsfort meine ganze Thätigkeit in Anspruch. Voriges Jahr hatte ich das Vergnügen, den allen Hymenopterologen wohlbekannten tüchtigen Hymenopterologen Hrn. A. Handlirsch aus Wien bei mir zu sehen und da wurde auch meine Sammlung durchmustert, dabei zugleich die beiden ♀. Es dauerte nicht lange, bis Hr. Handlirsch vorschlug, wir wollen einmal die Fühlerglieder zählen. Richtig 13! also vorn ♂ hinten ♀, der Pelz ganz vom ♂, nur besitzt die Unterseite des Hinterleibes statt der steifhaarigen Bürste des ♀ oder der mehr kahlen Stelle des ♂ gelblichbraune Zottenhaare. Das Räthsel ist gelöst, die beiden *Chalicodoma* sind Zwitter von *muraria* Fabr.‘

58. Megachile spec. (centuncularis - argentata verwandt).
(Gr. I. 1 f.)

Gerstäcker (20 p. 292.)

Der Bienenzwitter gehört einer mit *Megachile centuncularis* und *argentata* zunächst verwandten Art der Gattung *Megachile* aus Sizilien an. Die Statur und der ganze Habitus ist ♂, beide Fühlhörner dagegen ♀, zwölfgliederig. Alle drei Beinpaare links ♂, rechts ♀, (mit breiteren behaarten Schienen und Metatarsen). Hinterleib von oben gesehen nach Form, Grösse und Bindenzeich

nung ♂, auch das Pygidium in ♂ Weise geformt und behaart, der Endrand aber ohne Zähne. Die Unterseite links ♂, d. h. die Segmente auf der Fläche zart weiss behaart, am Hinterrande dicht schneeweiss gefranst; rechts ♀, mit dichter Skopa, welche auf den vorderen Segmenten brennend rostroth, auf dem letzten tiefschwarz ist. Beide Hälften der Bauchseite sind genau längs der Mittellinie geschieden. Die Flügel der rechten (weiblichen) Hälfte sind fast um $\frac{1}{2}$ Linie länger, als die der linken (♂).^c

59. *Bombus lapidarius* L. (Gr. I. 2 d.)

Sichel (15 p. 248—250.)

.... D'autant plus frappant qu'il existe sur le *B. lapidarius* espèce de grande taille et dont le ♂ et la ♀ se distinguent par des caractères spécifique très tranchés et même par un caractère générique: la patte de derrière autrement conformée dans les ♀ du genre *Bombus* que dans les ♂, chez lesquels la corbicule, la palette et l'auricule manquent. La moitié gauche est ♀, la moitié droite ♂. La taille est celle d'une ♀ un peu petite, taille beaucoup supérieure à celle de plus gros ♂. Voici la description succincte de cet hermaphrodite:

Tête noire dans sa moitié gauche, jaune dans sa moitié droite, avec l'antenne gauche plus courte, semblable à celle de la ♀, la droite plus longue, semble à celle du ♂. Prothorax noir dans toute sa moitié gauche, occupé dans toute sa moitié droite par la ceinture jaune propre au ♂. Patte postérieure gauche conformée comme chez la ♀, c'est-à-dire ayant une corbicule au tibia, une palette et une auricule au premier article du tarse et de plus, frangée de poils noirs comme chez la ♀. Patte postérieure droite conformée chez le ♂, c'est-à-dire tibia sans corbicule, 1. article du tarse allongé, sans palette ni auricule; de plus, toute cette extrémité postérieure droite frangée et en partie couverte de poils roux comme chez le ♂.

Reste à décider s'il agit ici d'un véritable hermaphrodite muni des parties génitales des deux sexes ou seulement d'une de ces monstruosités n'appartenant qu'à un seul sexe, mais présentant dans une moitié du corps les formes extérieures de l'autre sexe; pourtant, comme la feute anale entrebaillée ne laisse entrevoir in pincas copulatives ♂, ni aiguillon et que l'insecte, pris à Moutiers en Savoie par M. Excoffier, zélé entomologiste, est déjà conservé dans ma collection depuis 2 ans, je ne pourrai trancher la question que par la dissection et après avoir soigneusement

ramolli ce bourdon. Je tiendrai la Société au courant de mes recherches sur ce point. En attendant, la conformation du dernier segment abdominal et des valvules anales me fait croire qu'il s'agit ici d'un ♂ gynandromorphe.*

60. *Bombus mastrucatus* Gerst. (Gr. I. 2 d.)

Ritsema (38 p. CXI.)

„Voorts laat de heer Ritsema ter bezigtiging rondgaan een hermaphrodit van *Bomb. mastr.*, waarvan het achterlijf geheel mannelijk, . . . en een Nom.

Van beide voorwerpen is de rechterhelft van kop en borststuk mannelijk, de linkerhelft vrouwelijk.* — Rechte Hälfte von Kopf und Thorax ♂, linke ♀, Hinterleib ganz ♂.

61. *Apis mellifica* L. (Gr. IV. ?.)

Laubender (1 p. 430).

„Am verwichenen 15. Juli Abends, als ich noch vor meinem Bienenstande war, sah ich auf einem mittelmässigen Lagerstocke, welcher am 27. Juni geschwärmt hatte, und mit seinem Schwarme verlegt worden war, dieselbe Biene umher kriechen, welche von der Kolonie als eine Missgeburt mochte ausgetrieben worden sein, weil sie, wie alle junge Bienen, noch aschgrau aussah. Ich erkannte sie gleich an ihrer besondern Gestalt als eine besondere Biene, fasste sie, und weil es schon zu dunkel war, so sperrte ich sie in ein Weiselgefängniss, und steckte dasselbe in eben genannten Lagerstock unter die Bienen, damit sie bis zum folgenden Tage, wo ich sie genau betrachten konnte, lebendig bleiben möchte. (Eine lobenswürdige Vorsicht!) Als ich sie nun zwei Tage hinter einander zu verschiedenen Malen lebendig durchaus betrachtet hatte, so fand ich folgendes an ihr zu bemerken:

Diese Biene stellte durch ihre Figur eine kleine Drohne vor, denn sie war fast in allen Stücken der obigen gleich: nur dass sie einen Stachel hatte, und daher ihr After weder mit dem der kleinen Drohne, noch mit allen grossen Drohnen übereinkam; sie hatte auch nur zwischen den beiden grossen teleskopischen* Drohnen-Augen zwei kleine**) Augen, die eben so wie bei einer kleinen Drohne vorwärts sahen, und zur rechten Seite etwas seitwärts standen. Nun verglich ich alle äusserliche körperliche Theile durch das Mikroskop neben einer Arbeitsbiene und einer grossen Drohne.

Was den Kopf anbelangt, so war er dem Kopfe einer Arbeitsbiene so wohl, als einer grossen Drohne weder vollkommen ähnlich noch unähnlich, sondern ein Mittelding von beiden. Denn der Kopf einer Arbeitsbiene von vorn betrachtet, gleicht einem Dreieck: der einer grossen Drohne aber ist mehr rund und ringförmig gestaltet. Von beiden Proportionen sah man an dem Kopfe der kleinen Drohne etwas Aehnliches aber nichts Vollkommenes. Ueber den Mundwerkzeugen haben die Arbeitsbienen ein unbehaartes glattes Schild, welche Fläche aber bei den Drohnen stark befedert ist, und auch von den beiden grossen teleskopischen Augen noch nicht so weit zusammen gedrängt, wie bei den grossen Drohnen. Daher sich denn auf beiden Seiten Blössen zeigten, die nur schwach befedert waren. Die Mundwerkzeuge waren kurz, und daher mehr denen der Drohnen als der Arbeitsbienen ähnlich.

Der Rumpf oder das Mittelstück bei Arbeitsbienen und Drohnen macht ausser der Verschiedenheit der Grösse zwischen beiden auch darin einen Unterschied, dass die letztern an diesem Theile stärker befedert sind, wesswegen sie ganz wollig aussehen; auch hier näherte sich die kleine Drohne zu einem Geschlechte wie zum andern.

Die Füsse der Arbeitsbienen und der Drohnen sind sich auch nicht vollkommen gleich: bei den letztern sind sie verhältnissmässig kürzer und schwächer, und an den hintern Füssen ist derjenige Theil, woran die Arbeitsbienen den Blumenstaub zusammen drücken, erhabener und nicht so mühlenförmig. Die kleine Drohne schien sich aber darin mehr den Drohnen als den Arbeitsbienen zu nähern.

Der hintere Theil oder der Bauch der kleinen Drohne war zwar etwas stärker, als der der Arbeitsbienen, doch sah er ihnen übrigens durchaus ähnlicher als dem Bauche der Drohne und bei jedem Reitze zeigte auch die kleine Drohne ihren Stachel mit ihrem Giftröpfchen, wie jede andere gemeine Arbeitsbiene.

62. *Apis mellifica* L. (Gr. ?.)

Lefebure (2 p. 149.)

,Tout recement M. Westwood a Londres vient de m'écrire, qu'un amateur anglais avais reçu i y a peu de temps 3 *Smerinthus populi* hermaphrodites. Il en aurait également vu en dans la coll. de M. Bembly, ainsi qu'une *Pontia cardanines* et une *Apis mellifica* également hermaphrodite, dans celle de M. Shuckard.

Malheureusement Westwood ne m'indiqué pas les côtés, qu'occupent les sexes dans ces divers individus.

63. *Apis mellifica* L. (Gr. I. 2b.)

Dönhoff (17 p. 174).

Bienenzwitter vom Stande des Hrn. Walter in Ohlau: Kopf und Bruststück mit Anhangsorganen unterscheiden sich in Grösse und Gestalt, Farbe und Behaarung in Nichts von denselben Organen einer ♀; sie haben nichts mit den entsprechenden Organen eines ♂ gemein. Die genaueste Vergleichung mit ♀ konnte keinen Unterschied entdecken. Die Form der Hauptaugen ist die einer ♀, sie lassen auf der Stirn einen Zwischenraum, der mit einem Haarbüschel geziert ist. Auf dem Zwischenraum zwischen den Augen stehen die Nebenaugen (diese stehen bei den ♂ an der Gesichtsfäche unterhalb der Hauptaugen). Der Rüssel hat die Länge des Rüssels einer Biene. Die Hinterbeine haben das charakteristische Körbchen am Unterschenkel; Unterschenkel und Fersenbein haben am äusseren Rande den Haarsaum, der der Drohne fehlt. Der Hinterleib ist genau das äussere Ansehen des Hinterleibes einer Miniaturdrohne; er ist grösser, breiter und stumpfer als der einer Biene. Die ersten Rückenringe sind wenig behaart: auf den beiden letzten Ringen befinden sich die den Drohnen charakteristischen Haarbüschel. der untere Rand jenes Ringes hat den charakteristischen scharfgezeichneten hellen Saum. An den Bauchringen ist, wie bei der Drohne der Saum breiter, die Behaarung der Ringe stärker: der letzte Unterleibsring endigt in die für die Drohne charakteristische braune Spitze. Wachsorgane fehlen gänzlich, vielmehr endigt der obere Theil der Bauchringe in einen schwarzen Rand. — Mit der grössten Genauigkeit habe ich nun den Hinterleib sezirt. Der Stachelapparat fehlte gänzlich, dagegen sind die ♂ Geschlechtsorgane vollständig vorhanden von dem mit Borsten besetzten Ruthenkanal bis zur Ruthe, zum Samenkanal, den Samengängen, Hoden und Nebendrüsen. Für Zweifler will ich noch bemerken, dass der Hinterleib mit dem Bruststück organisch verbunden ist, wie der Hinterleib einer Biene mit dem Bruststück einer Biene und dass keine Kunst der Welt eine solche Verbindung, um zu täuschen, herstellen könnte. Es ist sicher, dass wir es hier mit einem merkwürdigen Thier zu thun haben, dessen Vorderleib Arbeitsbiene, dessen Hinterleib Drohne ist.

64. *Apis mellifica* L. (Gr. IV. 3—5.)

Dönhoff (18 p. 209.)

Bienenzwitter vom Stande des Herrn Wittenhagen in Polchow. „Der Kopf unterscheidet sich in nichts vom Kopf einer Drohne. Die Glieder der Fühler sind stark prononcirt, wie bei einer ♂, die Geissel der Fühler bilden nicht eine gerade Linie, sondern sind gebogen, wie man dies bei der Drohne sieht. Die Augen sind gross, auf dem Scheitel zusammenstossend, die Nebenaugen stehen vorn auf der Stirn, der Rüssel ist kurz. Das Bruststück unterscheidet sich in Nichts von dem Bruststück einer Biene. Namentlich sind die Füsse geformt und behaart, wie die Füsse einer Biene und mit dem Körbchen versehen. Der Hinterleib trägt die Charaktere der Drohne und der Biene gemischt. Die oberen Bauchringe haben Behaarung und Farbensaum wie die Bauchringe einer Drohne. Die unteren Bauchringe haben das äussere Ansehen von den Unterleibsringen einer Biene. Zwischen den Ringen befinden sich dicke Wachsblättchen. Die Hinterleibsöffnung befindet sich am Ende in der Längsachse und nicht wie bei der Drohne unten am Ende des Körpers; die braune Spitze des letzten Hinterleibsringes fehlt. Da ich die Biene gerne erhalten will, so habe ich sie nicht secirt. Aus dem Vorhandensein der Wachsblättchen, des Stachels etc. lässt sich schon vermuthen, dass ♂ Geschlechtstheile fehlen. Merkwürdig ist bei dem Thier, dass der Kopf der Kopf einer Drohne ist, und dass seine Triebe (Sterzen) die einer Biene sind. Hier sind zwei Möglichkeiten: entweder liegt die Quelle der Triebe nicht im Gehirn oder der Kopf ist bloss äusserlich der Kopf einer Drohne, das Gehirn aber das Gehirn einer Biene.“

Biologie: „Ich fand selbiges Morgens zwischen 8 und 9 Uhr in meinem Bienenstand auf dem Grase umherlaufen. Dasselbe hatte augenscheinlich erst unlängst die Zelle verlassen und sich alsbald als unbrauchbares Individuum entweder freiwillig oder gezwungen aus dem Stocke entfernt. Ich reichte ihm Honig, da ich es Ihnen gern lebend übersenden wollte, es nahm aber von demselben keine Notiz, sondern schien nur das Bestreben zu laufen zu haben. Aus welchem Stocke es kam, kann ich nicht sagen, da die Stöcke sehr gedrängt stehen.“

65. *Apis mellifica* L. (Gr. III. 2 a.)

Hamet (19 p. 336).

„Cette abeille anormale offrait une tête de ♀, c'est-à-dire des yeux distants et des antennes de ce sexe, mais, l'abdomen

n'offrait aucune trace des appareils destinés à façonner les lames de cire et il n'avait aucune trace d'aiguillon et était bien évidemment terminé par les organes externes de la génération que l'on observe chez les ♂. —

66. *Apis mellifica* L. (Gr. IV. 3—5.)

Smith (21 p. 89.)

„Size and general appearance of the insect that of a ♀. Head ♂; eyes large and meeting on the vertex: both the antennae ♀, 12-jointed. Mandibles ♀, not toothed at the apex as in both ♂♀. Wing on the right side = ♂, left = ♀. Legs ♂ or rather partly ♂ on the right side, anterior and intermediate legs perfect ♂, the posterior leg ♂, but fringed with hair and the basal joint of the tarsus ♂ exteriorly, that is, smooth and convex, but within transversely ridged and clothed with hair, the following joints ♂, the left posterior leg is perfect ♀. The abdomen furnished with a sting, the sting ♀, straight.“

67. *Apis mellifica* L. (Gr. II. 1 a.)

Menzel (22 p. 91.)

Zwitterbiene. „Die einäugige Biene“ vom Stande des Herrn Heinr. Märki in Lenzburg. „Der Körper hat die Grösse und im Allgemeinen die Formverhältnisse, wie die ♀: dagegen ist der Kopf auffallend klein, indem er zu dem übrigen Leibe etwa in dem Verhältnisse steht, wie der Kopf einer Drohne zum Drohnenleib: die Netzaugen stossen nicht bloss zusammen auf dem Scheitel, sondern sie verschmelzen daselbst völlig miteinander. Nähert er sich darinnen dem Drohnenkopfe, so unterscheidet er sich von diesem wieder durch einen ringförmigen, gegen die Netzaugen stark abgesetzten Ringwulst hinter den letzten und, was besonders erwähnenswert ist, durch den gänzlichen Mangel der Punktangen, welche bekanntlich am Drohnenkopfe nach der Stirn herabgedrängt, am Arbeiterkopfe auf den Scheitel gestellt sind. Der übrige Körper und insbesondere die Beine und der Hinterleib sind nach dem Typus der Arbeitsbiene gebaut. Die Fühler sind verletzt, dagegen sind die Mundtheile entschieden diejenigen einer ♀. Jeder Bienenkenner erkennt in der geschilderten Abnormität eine jener merkwürdigen Zwitterbildungen, welche nicht, wie bei den Schmetterlingen sich als ♀ und ♂ Seite des Körpers, sondern als Vorherrschen des ♂ Charakters in einzelnen Ringen, des ♀ in anderen Ringen kund gibt. Hier beschränkt sich das Auftreten des ♂ Charakters auf den Netzaugenring, dessen auf-

fallende Entwicklung den Mangel der Punktaugen entbehrlich macht.

68. *Apis mellifica* L. (Gr. IV. 1. 5.)

Menzel (23 p. 167 u. 186, 24 p. 50.)

Zwitterbienen des Eugsterschen Stockes in Constanz.

a) Die drei Bienen hatten die normale Grösse der ♀, die Netz- und Punktaugen der ♂, den Rüssel und die Beine der ♀, jedoch mit einzelnen, geringen Abweichungen. Der Hinterleib ist hinten mehr abgerundet, ähnlich demjenigen der ♂, und zeigte bei zweien eine scharfe Grenze längs der Mitte des Rückens in Färbung und Zeichnung der beiden Seiten; bei der einen derselben war die linke Seite wie bei einer italienischen ♂ gefärbt und gezeichnet, die rechte einseitig schwarz. Nach dieser Vertheilung musste die Frage sich aufdrängen, sind wohl die Geschlechtsorgane halbseitig modifizirt? Zu meinem grossen Erstaunen fand ich die äusseren Geschlechtsorgane bei zweien mit ♀, bei einer mit ♂ Charakter, also nicht mit halbseitiger Differenz, aber in allen Fällen verkümmert, die Begattungsorgane derjenigen, welche den ♂ Charakter besass, waren sehr unentwickelt, während die Stachel der beiden anderen, wenn schon in kleinerem Massstabe, doch mit allen wesentlichen Theilen versehen waren.

b) Bei meiner Rückkehr fand ich ein Schächtelchen mit 12 inzwischen von Herrn Eugster eingesandten Zwittern, unter denen nur ein einziger den verkümmerten, ♂ Begattungsapparat zeigte, während die übrigen im Besitze eines Stachels sind.

c) Gestern ist wieder eine Sendung von Zwitterbienen von Constanz eingetroffen, und zwar befanden sich darunter 8 noch lebende und 7 todte. Unter den 15 mir vorliegenden Zwittern haben 9 die auf dem Scheitel des Kopfes zusammentreffenden Netzaugen der ♂: bei einer sind dieselben wohl im Wesen Drohnenaugen, aber oben ein wenig von einander entfernt. Bei der 11. ist das rechte Netzauge bis zur Mitte des Scheitels herein- und etwas nach vorwärts gerückt, das linke dagegen ist mehr nach der linken Seite und etwas abwärts gedrängt, zugleich aber auch nach rückwärts gegen die Gelenkfläche des Hinterhauptes gerückt; beide Augen sind aber entschieden noch Drohnenaugen. Die 4 noch übrigbleibenden Zwitter zeichnen sich durch den Besitz eines Arbeiter- und eines Drohnen-Auges aus, und zwar haben 3 unter ihnen das Drohnenauge rechts, das Arbeiterauge links, eine dagegen umgekehrt. Ich hebe unter den 15 Zwittern den zuletzt bezeichneten aus, um ihm eine einlässlichere Beschreibung

zu widmen. Die Geschlechtscharaktere sind halbseitig vertheilt, links der Charakter der ♂, rechts der Charakter des ♀, jedoch so, dass der letztere die proportionalen Verhältnisse der linken Seite bestimmt und an einzelnen Stellen des Kopfes vorherrschend wird. Der Kopf steht in seiner Grösse im Allgemeinen in dem Verhältnisse des Arbeiterkopfes zum Arbeiterkörper. Das rechte Netzauge entspricht in Länge und Breite, Erstreckung nach oben und unten, in Gesamtform und Lage sowie in verhältnismässig geringer Grösse der Theiläuglein genau dem Netzauge einer ♀. Das linke erinnert durch bedeutende Ausdehnung nach vor- und rückwärts, nach auf- und aufwärts sowie durch beträchtlichere Grösse der Theiläuglein ebenso entschieden an das Drohnenauge. Zwischen beiden befindet sich am obersten Theile der Stirne mehr nach links gerückt, eine Vertiefung, in welcher merkwürdiger Weise nicht 3 sondern 2 Punktaugen aufgenommen sind, von denen das rechte dem Scheitel sich nähert, das linke etwas tiefer gestellte hart am Drohnenauge anliegt, während das dritte Punktauge gänzlich vermisst wird. Der rechte Fühler hat den langen Schaft und die kurze Geissel sowie die speziellere Gliederung eines ♀ Fühlers, der linke dagegen zeigt den kurzen Schaft, die lange Geissel und die spezielle Gliederung des ♂ Fühlers. Der rechte Oberkiefer ist beträchtlich grösser, wie der linke, und bei seiner löffelförmigen Ausbreitung gegen das Ende und dem Mangel eines Zahnes offenbar nach dem Typus des Oberkiefers am ♀ gebaut, während der viel kürzere, gegen das Ende schmälere und gezahnte linke Oberkiefer den Typus des Oberkiefers an der ♂ nicht verkennen lässt. Um so merkwürdiger ist, dass der Rüssel, also sämtliche untere Mundtheile, gleichmässig stark verlängert sind und demnach den Charakter des ♀ Rüssels haben. Die Brust weicht von der Brust des ♀ nicht ab, und die Beine der rechten und linken Seite haben die Grösse der Beine an ♀ Beinen; dagegen zeigt das Vorder- und Mittelbein der rechten Seite ein breiteres Fersenglied, das Hinterbein derselben Seite am Endtheil der Schiene aussen die glatte glänzende Vertiefung am Vorder-, Hinter und Endrand die Randborsten des Körbchens, am letztern den Kamm des ♀, sowie an der Ferse oben und hinten den vorspringenden Dorn und an der inneren ebenen Fläche die goldbraune Bürste des ♀. Die linke Hinterschiene ist an ihrer Aussenseite gewölbt, matt und flaumig behaart und zeigt weder Randborsten noch Kamm, während der linken Hinterferse oben und hinten der Dorn fehlt und auf der innern mit einem Längskiele bezeichneten Fläche die Borsten regellos zerstreut sind. An dem nach hinten etwas abgerundeten Hinterleib sind die letzten Rückenschienen

wie bei der Drohne mit langen Borstenhaaren besetzt, während die Bauchseite einen nur schwach vortretenden, nicht genau die Mitte einhaltenden und etwas gebogen verlaufenden Längskiel, aber ziemlich stark die Entwicklung der Bauchschiene zeigt. Zwischen der vorletzten Bauchschiene und der Schlussklappe ragt auf der linken Seite ein eigenthümlicher Apparat schief nach einwärts hervor. Derselbe besteht aus einer Schlussklappe, welche zum Theil von einer ausgeschweiften Schiene bedeckt wird und jederseits einen pfriemenförmigen, etwas gebogenen Hornkörper hervortreten lässt, der einigermaßen an die äussere Hornschuppe des birnförmigen Ruthenkörpers der Drohne erinnert. —

Es möge an dieser einzigen Beschreibung genügen: Dagegen dürfte es nicht unpassend sein, noch auf einige allgemeinere Verhältnisse einzugehen. Wo am Kopfe zwei Netzaugen mit Drohnencharakter sich befinden, da haben bald alle Beine, bald nur die Beine der einen Seite den Bau der ♂ Beine: nirgends ist mir der Fall vorgekommen, dass alle Beine den Charakter der Drohnenbeine gehabt hätten: dagegen stimmten in allen beobachteten Fällen die Fühler ihrem Charakter nach mit den Netzaugen überein. Die Verrückung der Augen, insbesondere der Punktaugen (der letzteren sind allermeist drei), ist vielfach verbreitet, ebenso die ungleiche Grösse der Oberkiefer: meistens haben die letzteren den Charakter des Oberkiefers am ♂. Der Umstand, dass bei zweiseitiger Vertheilung der Geschlechtscharaktere die Beine mit dem Drohnencharakter in Länge überhaupt und in Länge den einzelnen Glieder insbesondere den Beinen mit dem ♂ Charakter entsprechen, ist schon oben angedeutet; hier habe ich noch beizufügen, dass unter den Fällen des Vorkommens zweier Drohnenaugen auch einer vorkam, wo an der inneren Fläche einer Ferse mit Drohnencharakter eine der durch den schiefen Längskiel geschiedenen Abtheilungen und zwar die untere, Bürstenbildung zeigte. Von der ungleichen Vertheilung der Färbung und Zeichnung auf den beiden Seiten des Hinterleibsrückens habe ich schon in meinem letzten Briefe gesprochen: jetzt kann ich hinzufügen, dass dieselbe sowohl beim Auftreten entschieden seitlicher Vertheilung der Geschlechtscharaktere als beim Vorkommen zweier Drohnenaugen an demselben Kopfe sich findet, und dass diese halbseitige Verschiedenheit in Färbung und Zeichnung in einzelnen Fällen auch die Bauchseite trifft. Bezüglich der letzteren verdient erwähnt zu werden, dass hier und da an einem Zwitter die Bauchschienen auch im Baue eine Verschiedenartigkeit des Geschlechtscharakters je nach der Seite zeigen. — Der Verkümmernng der Geschlechtsorgane entspricht in höherem oder

niederen Grade auch eine solche der inneren: insbesondere gilt dies von derjenigen Partie an, wo die Vereinigung der Ei- und Samenleiter geschehen ist. Wir finden z. B. Fälle, in denen vom Ruthenkörper an alle Theile des Begattungsapparates, so eigenthümlich gestaltet sie sein mögen, ganz gut erkenntlich sind; wir finden aber auch diese Theile ganz nahe zusammengedrückt und fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Stachel ist in der Regel, wenn schon durchschnittlich von geringer Grösse, doch in allen seinen Theilen vollkommen ausgebildet und stets mit einer umfangreichen Giftblase in Verbindung stehend. Immer fand sich im Innern nur ein Geschlechtscharakter ausgeprägt; entweder waren die Geschlechtstheile ♂ oder ♀, nie halbseitig oder gar doppelt entwickelt.* —

69. *Apis mellifica* L.

Siebold (25 p. 73—80.)

Die Vermischung der nicht zu den eigentlichen Geschlechtstheilen gehörenden Organe, nämlich der Netz- und Punktaugen, der Fühler, der Oberkiefer und übrigen Mundtheile nebst dem Gesicht und der Oberlippe, ferner der Beine und Leibessegmente, welche in Grösse, Form, Färbung und Behaarung bei Drohnen und Arbeitern nach einem ganz besonderen und sehr verschiedenen Typus gebildet sind, die Vermischung dieser Organe (ich wiederhole es), sah ich bald an der vordern, bald an der hinteren Körperhälfte, bald über den ganzen Körper ausgedehnt, bald nur auf einzelne Körperabschnitte beschränkt in der Weise auftreten, dass entweder rechts die Charaktere einer Drohne, links die Charaktere einer Arbeiterin oder umgekehrt zu erkennen waren; ferner kam ausser dieser seitlichen Zwitterbildung die Vermengung der Drohnen- und Arbeitercharaktere auch in der Weise sehr häufig vor, dass die bei Drohnen und Arbeitern verschieden geformten Körpersegmente und paarigen Organe in unregelmässiger Aufeinanderfolge wechselten, wodurch ein solcher Zwitter vorn wie eine Drohne, und hinten wie eine Arbeiterin oder umgekehrt gebildet erschien. Noch auffallender nahmen sich diejenigen Zwitter aus, deren äussere Organe und einzelne Körperabschnitte theils halbseitig den Drohnen- und Arbeitercharakter darboten, theils rechts und links gleichmässig bald mit dem Drohnen- bald mit dem Arbeitertypus wechselten. Bei manchen Individuen war die Zwitterbildung äusserlich so untergeordnet und beschränkt, dass nur aus der Verschiedenheit der Kiefer, oder der Netzaugen,

der Fühler, oder der Beine, oder einzelner Hinterleibssegmente die Zwitterbildung zu errathen war.

Was nun die innere Organisation dieser Zwitterbienen betrifft, so erkannte ich auch hier dieselbe mannichfaltige Unregelmässigkeit und Ungleichheit in der Vermengung, in der Entwicklung und in dem Vorhandensein oder Fehlen der einzelnen Abtheilungen der mehr oder weniger zur vollkommenen Ausbildung gelangten männlichen Fortpflanzungsorgane und der, wie bei allen Arbeitern, stets mehr oder weniger verkümmerten weiblichen Geschlechtswerkzeuge. Auch hierbei fanden, wie bei der äusseren Organisation dieser Hermaphroditen, die verschiedensten Grade der Zwitterbildung statt. Vor allem muss ich hervorheben, dass die Zwitterbildung der Geschlechtswerkzeuge bei diesen Bienen im Vergleich zu der Zwitterbildung der äusseren Körperform fast nie im Einklange stand.

Der Stachel mit seinem Giftbehälter und seiner Giftdrüse zeigte sich bei Zwitterbienen mit dem Hinterleib einer Arbeiterin vollständig entwickelt, war dagegen bei denjenigen Zwittern, deren Hinterleib mehr oder weniger an den Drohnenleib erinnerte, meistens verküppelt und weich; gewöhnlich schlossen die drei Stücke desselben, die beiden Seitentheile und die dazwischen liegende eigentliche Giftröhre nicht aneinander, sondern waren einzeln von einander getrennt und ganz unregelmässig verbogen, so dass solche Stacheldrohnen trotz des Vorhandenseins des Giftbehälters und der Giftdrüse niemals hätten stechen können. Der gemeinschaftliche Eierleiter trug öfters einen von dem bekannten Tracheennetze umschlossenen, aber stets leeren Samenbehälter an sich: die beiden mit dem gemeinschaftlichen Eierleiter durch zwei kurze Canäle zusammenhängenden Eierstücke bestanden aus wenigen und stets von Eiern leeren Eierröhren.

Bei denjenigen Zwitterbienen, deren Hinterleib in seiner ganzen Form die Drohnenbildung verrieth, war das Begattungsorgan mit seinem höchst complicirten Baue ganz in derselben Organisation vorhanden, wie bei den reinen Drohnen: der Samenausführungsgang theilte sich oben in zwei Samenleiter, mit denen die beiden Hoden und Nebenhoden ebenfalls in derselben Form und Anordnung zusammenhängen, wie bei den normalen Drohnen. Die Schläuche der Hoden waren äusserst zahlreich und strotzten von Samenzellen, in denen die Entwicklung der charakteristischen Samenfäden so weit vorgeschritten sich zeigte, wie in den eben ausgeschlüpften reinen Drohnen.

Mit diesen vollkommen ♂ Geschlechtswerkzeugen sah ich sehr oft einen Giftapparat verbunden, dessen Stachel sich in einem

mehr oder weniger verkrüppelten Zustande befand. Eine sehr auffallende und ganz eigenthümliche Zwitterbildung, die sich mir sehr häufig darbot, bestand darin, dass sich auf beiden Seiten statt eines Hodens mehrere Hodenschläuche mit mehreren Eierstocksröhren vereinigt zeigten, während im übrigen die Nebenhoden und das ♂ Begattungsorgan, welches am unteren Ende zuweilen einen Giftapparat mit unvollkommenem Stachel neben sich hatte, ganz regelmässig entwickelt waren. Immer hatte bei einer solchen Verschmelzung von Hoden und Eierstöcken die Entwicklung der Samenfäden in den Hodenschläuchen begonnen, während die Eierstocksröhren, wie bei allen übrigen Zwitterbienen, keine Spur von Eierbildung erkennen liessen.

Einige Male wurde ich dadurch überrascht, dass bei ganz normaler Entwicklung der ♂ Geschlechtswerkzeuge statt des einen Hoden ein Eierstock mit leeren Eierstocksröhren vorhanden war. Nicht selten stiess ich auf Hoden oder auf verschmolzene Hoden und Eierstöcke, ohne dass an denselben eine Spur von Ausführungsgängen zu entdecken gewesen wäre; der untere Theil der Geschlechtswerkzeuge bestand in diesen Fällen aus einem vollkommen entwickelten Begattungsorgane, welches nach oben mit einem Blindsacke abgeschlossen war.

Sehr wichtig erschien mir an diesem Zwitter erzeugenden Bienenstocke der Umstand, dass die reinen Arbeitsbienen die eben ausgeschlüpften Zwitter sogleich aus dem Stocke hinausjagten und dieselben nicht einmal draussen auf dem Flugbrette duldeten.

Da diesen armen Geschöpfen nach dem Verlassen ihrer Zellen nicht die Zeit vergönnt blieb, ihre Hautbedeckung zur gehörigen Erhärtung kommen zu lassen, waren sie nie im Stande, davonzufliegen; sie fielen sämmtlich abgemattet und hilflos vom Flugbrett herab und konnten Tag für Tag auf dem Erdboden draussen unter dem Stocke in Menge angetroffen werden, wo sie nur kurze Zeit ihr elendes Leben fristeten.

Herr *Eugster* hatte die Güte, diesen merkwürdigen Bienenstock, welcher unter diesen ungünstigen Verhältnissen nie volkreich werden konnte, vor meinen Augen zu öffnen und dessen Waben zu mustern. Es fanden sich neun Waben darin vor, an denen in verschiedenen gedeckelten Arbeiterzellen bei ihrer Eröffnung Zwitterbienen zu erkennen waren. Von solchen Zellen liess sich vor ihrer Eröffnung niemals im voraus bestimmen, ob ein Zwitter darin verborgen sei oder nicht, so wenig unterschieden sich diese Zellen von den benachbarten gedeckelten und normale Arbeiter enthaltenden Zellen. Einzelne hier und dort vorhandene Buckelzellen waren mit normal gebildeten Drohnen besetzt. Die

Vertheilung der Zwitter bergenden Zellen fand an diesen Waben durchaus unregelmässig statt.

Die fünf Jahre alte Königin dieses Stockes war eine reine Italienerin und hatte nichts Auffallendes an sich. Sie musste sich mit einer deutschen Drohne begattet haben, da sich ausser reinen italienischen Arbeitern auch noch viele Bastardarbeiter von verschiedenen Abstufungen in demselben Stocke befanden, während die Dronnen dieses Stockes ihre reine italienische Abkunft verriethen. Auch die Zwitterbienen dieses Stockes besaßen die Färbung der italienischen Race; doch war dieselbe unter dem Einflusse der deutschen Race hier und dort getrübt worden.

Eine andere der neun Waben, aus welcher mehrere Zwitter hervorgesogen worden waren, wurde am 25. Mai dieses Jahres einem gesunden und mit ächten Italienern bevölkerten Stocke eingegangen: nachdem einige Wochen lang das Ausschlüpfen von Zwittern an diesem Stocke von Herrn *Eugster* beobachtet worden war, kamen später keine Zwitter mehr aus demselben zum Vorschein.

Vier andere mit Zwittern behaftete Waben des obigen Bienenstocks wurden am 27. Mai zur Herstellung eines Ablegers benutzt. Auch dieser stiess nur in der ersten Zeit Zwitterbienen aus und liess später keine Spur von Zwittern an sich wahrnehmen, während der alte Stock fortfuhr, zahlreiche Zwitter zu erzeugen.*

70. *Apis mellifica* L.

Gerstäcker (26 p. 4.)

zeigte eine Anzahl Zwitterbildungen der Honigbiene, aus dem Eugsterschen Bienenstocke in Constanx stammend, vor und verbreitete sich über die Modificationen, unter denen hier eine Vereinigung ♂ und ♀ Charaktere im äusseren sowohl als im inneren Körperbau stattfindet. Im äusseren Habitus gleichen diese Zwitterbienen theils mehr den Arbeitern, theils den sogenannten kleinen Dronnen, während sie die sexuellen Merkmale beider in verschiedenen Combinationen in sich vereinigen. So sind z. B. die Netzaugen bald beiderseits nach dem Drohnentypus gebaut, bald auf der einen Seite ♂, auf der anderen ♀; im letzteren Falle sind die Zwitter dann zuweilen auch nach ihren übrigen Charakteren halbseitig getheilte, wie sich dies vorzüglich an den Mandibeln, Fühlern und Hinterbeinen zu erkennen gibt und in entsprechender und besonders auffallender Weise bereits an den Puppen ersichtlich ist. Die anatomische Untersuchung eines sol-

chen in Weingeist durch Herrn v. Siebold an den Vortragenden eingesandten Zwitter-Individuum ergab neben der Anwesenheit zweier symmetrischer, von Spermatozoën strotzender Testes, dagegen bei gänzlichem Mangel eines Ductus ejaculatorius und ♂ Copulationsorganes einen vollständig ausgebildeten ♀ Stachelapparat, nebst Giftblase und Giftdrüse.*

71. *Apis mellifica* L. (Gr. IV. 1—5.)

Assmus (27 p. 126.)

Bei der von Ihnen erhaltenen Biene, die, wie Sie mir auf dem zurückgelassenen Zettel angaben, von einer Bastardkönigin herrührt, gestaltet sich der Hermaphroditismus anders. Der Habitus des ganzen Thieres erscheint auf dem ersten Blick als ♂, etwa wie der einer Drohne, welche in einer Arbeiterzelle erbrütet wurde — doch verräth der Hinterleib bei aller Gedrängtheit eine dreiseitige pyramidale Form, die nur der ♀ eigen ist. Kopf fast ganz ♂: rund, Augen stossen hinten auf dem Scheitel zusammen, sind aber bedeutend schmaler als bei einer normalen Drohne, woher denn auch die Stirn und das Schildchen über der Oberlippe sehr gross erscheinen; doch reichen die Augen nicht bis an die Kiefer und infolge dessen ist die Oberlippe von auffallender Grösse. Die einzelnen Facetten der Augen sind gleichfalls wie bei einer eigentlichen Drohne grösser, als bei den ♀ und ♂. Die eigentlichen Mundwerkzeuge sind vollkommen ♂, nämlich verkümmert. Die Nebenaugen sind wie bei einer normalen ♂ beschaffen; sie stehen auf der Stirn; ebenso sind die Fühler ♂, 14gliedrig und mit dem Schaft dicht anliegend.

Wie der Kopf so besitzt auch der Thorax, mit Ausnahme der Beine nur ♂ Anzeichen. Er ist robust und stark behaart; Flügel überragen den Leib, sind breiter als bei der ♀ und ♂ und besitzen ganz das Geäder der ♂. Nur die Beine haben die Gestalt der ♀; sie sind länger als beim ♂ und der ♀; Hinter-schienen jede mit einer normalen Vertiefung (Körbchen) versehen, ebenso fehlen auch die Bürsten (Sammelborsten) an den Hinterfüssen.

Fast ganz arbeitermässig ist aber der Hinterleib gestaltet. Derselbe ist zwar gedrängter als beim ♀, besitzt aber eine pyramidenförmige Gestalt, wie wir sie bei der ♀ finden. Auch der Wachsabsonderungsapparat vorhanden; ebenso ist der Stachel wie beim ♀, ist aber sehr weich (vielleicht sehr frisches Exemplar). Das ganze Insekt ist 6 lin. lg. — Flügel 10 lin. (27 mm), also wie ein ♀.

Section nicht unterworfen, da zu sehr vertrocknet, vermuthe aber, dass Geschlechtstheile verküppelte ♀ sind, weil das Thier den Arbeiterstachel besitzt! —

72. *Apis mellifica* L. (Gr. III. 2 a.)

Smith (30 p. XIV).

„A monstrosity, partly ♂, partly ♀. Antennae ♀ on both sides: eyes worker: left anterior leg ♂: the right intermediate leg and also the posterior one ♂: the abdomen has the silky gloss of a ♂ and is in form partly so, being more blunt at the apex: the ♂ organ of generation is partly protruded. This specimen was sent to me by Mr. Woodbury, of Exeter.“

73. *Apis mellifica* L. (Gr. I. 2 g.)

Flett (36 p. 199).

„Enclosed I beg to send you an abnormal specimen of the Honey-bee (*Apis mellifica*). You will observe that the two sides of the insect are quite different, the right being that of a worker and the left that of a drone. The difference will be best seen in the eyes, one of which is much larger than the other; and also in the hind-legs, that on the one side having the pollen-basket of the worker, that on the other being without it. You will also observe the fringe of hair on the latter segments of the abdomen, as seen on drones. — W. FLETT, Dempster Street, Wick, Aug. 4, 1877. [The specimen — which has unfortunately been destroyed by an accident — had all the peculiarities pointed out by our correspondent. — EDITOR ‘Scot. Nat.’]“

74. *Apis mellifica* L.

Dodge (37 p. 498.)

„The science of Apiculture has been so thoroughly studied by thousands of close observers in the past, that new discoveries in the natural history of the honey-bee are now seldom made. I do not propose to offer anything entirely new on this occasion, but if I can interest you for a few moments my object shall be accomplished.

You are no doubt aware that all deformed or abnormal forms of bees are immediately cast out of the hive by the workers, and speedily perish. It is from this fact that they so often es-

cape the observation of the busy apiarist. I was so fortunate, about a year ago, as to discover a remarkable brood just emerging from the cell. They exhibited such a variety of combinations, of both the ♂ and worker bee, in each individual, that my first impression was that Dr. Dzierzon's theory certainly could not recover from the effect of such witnesses. The queen was a young Italian, about two months old, extra large, of fine form and light in colour. The colony was a fourframe nucleus. Workers hybrids. Many of the cells had raised caps, and it was from them that the monstrosities emerged.

I will describe them:

1. Perfectly formed drones, but not larger than worker.
2. Drone-abdomen and thorax, with a worker-head. (III. 2 a.)
3. Worker-abdomen and thorax, with a drone-head. (III. 1 a.)
4. Drone-abdomen and thorax, with one-half of the head worker-like, the other drone-like. (I. 1 a od. I. 2 a.)
5. Worker-abdomen and thorax, with one-half of the head worker-like, the other drone-like. (I. 1 a od. I. 2 a.)
6. One-half of the head, thorax and abdomen drone like, the other worker-like. (I. 1 g od. I. 2 g.)

They were all reared in worker cells, and there were several specimens of each kind.

I find upon research that such monstrosities were observed years ago, and carefully dissected by that celebrated entomologist, Von Siebold. He found in them a combination of sexual characters in their generative organs, therefore, called hermaphrodites. Bees are conceded to be bisexual, such a thing as true hermaphrodites among them is perhaps impossible. The development of the internal organs are singularly correlated with the peculiarities of the external. In those with the worker-abdomen, he found the seminal receptacle and ovaries present, but empty. The sting with its vesicle and glands well developed. In those with the drone-abdomen, the ♂ sexual organs were well developed, the testes containing spermatozooids, the ovarian organs, sting and poison apparatus existing in an imperfect state.

He ascribes the production of them to an imperfect fecundation of the ovum.

It has been established, beyond doubt, that the queen bee can control the sex of the egg at will. The eggs in the ovaries, contain a ♂ sex-producing germ; to change the sex of the egg germ to ♀, the queen causes the egg to come in contact

with the spermatozoa contained in a little sack, on one side of the oviduct. The spermatozoa enter through the egg shell by minute orifices called micropyle, of which there are quite a number. If the micropyle are obstructed, no filaments can pass, therefore, the egg remains, as it left the ovary, and will catch a drone. This is why we find drones reared in worker cells. It is not a mistake of the queen as some may suppose but from imperfect eggs; a matter over which she has no control.

Mr. Darwin says it requires several spermatozoa to impregnate the egg properly; if that be true, is it not probable that if only one should enter the egg, that it has not the power of entirely changing the male-sex producing germ and thereby we have the so-called hermaphrodite.

Chattonooga, Tenn.

S. C. DODGE.

Prof. Cook stated the essay was incorrect, in that the bees did not always remove the monstrosities from the hives, he having frequently found them there.

75. *Apis mellifica* L. (Gr. I. 2 a und Gr. I. 1 a.)

Lucas (45 p. LXXXIV.)

Je montre deux *Apis mellifica* hermaphrodites qui proviennent des environs de Bordeaux, où elles ont été rencontrées, par M. J. Pérez. En examinant ces Abeilles, qui ont été données aux collections entomologiques du Musée de Paris et qui ont un certain développement (long. 12 mm., lat. 5 mm.), on remarque que a) dans l'une, l'oeil gauche est petit, tandis que l'oeil droit est, au contraire, très développé et dépasse même la partie médiane du front; b) chez l'autre individu, c'est le contraire qui a lieu, c'est-à-dire que l'oeil gauche est plus développé que celui du côté droit, qui est sensible plus petit. A cause de cette anomalie extrêmement remarquable on peut dire, que ces Abeilles, par le développement des organes de la vue, appartiennent d'un côté au sexe ♂ et de l'autre au sexe neutre ou ♀ à ovaires atrophés.

III. Beschreibung neuer gynandromorpher Hymenopteren.

Pepsis brunicornis R. Luc. *) (Gr. IV. 2. 3.)

(vergl. T. I, Abbild. 4.)

Dieser *Pepsis* hat einen rein ♂ Kopf, sein Thorax, sammt Flügel und Beine ist links ♀, rechts ♂, das Abdomen rein ♀.

Der wohlge gelungenen Abbildung ist besonders in betreff der Thoraxbildung, die sonst die scharfe Querrunzelung des Mittelsegmentes deutlich wiedergibt, noch hinzuzufügen, dass die linke Seite (♀) mattschwarz, dagegen die rechte (♂) smaragdgrün und seidenglänzend behaart ist; das linke (♀) Flügelpaar zeigt deutlich die dunkle Färbung (blauschwarz), das rechte (♂) dagegen die klare, durchsichtige und gelbliche Farbe mit der schwarzblauen Spitze des Vorderflügels; die linkseitigen Beine (♀) zeigen scharf die bedornete Hinterkante, während die rechtsseitigen (♂) die gerundeten Schienen mit den breiten und längeren, inneren Schienensporn, sowie die verbreiterten, verlängerten und flachen Hintertarsen deutlich erkennen lassen. Das Abdomen mit seinen 6 deutlichen Segmenten ist rein ♀ und lässt auch in der Abbildung den lang hervorgetretenen Stachel deutlich erkennen. Es ist deshalb wohl anzunehmen, dass auch der innere Genitalapparat rein ♀ ist.

Das Thier stammt von S. Cruz (Blumenau, Brasilia) und ist uns in Alkohol conservirt zugegangen. Von einer inneren Untersuchung glaubten wir absehen zu können, da uns eine tadellose Erhaltung des Abdomen für eine photographische Aufnahme wünschenswert erschien und die 6 Abdominalsegmente und der lang hervorgetretene Stachelapparat genügende Anhaltspunkte für eine weibliche innere Bildung des Genitalapparates gaben. —

Eucera longicornis L. (Gr. I. 2 e.)

(vergl. T. I. Abbild. 1 = ♀, 2 = ♂, 3 = ♂.)

Diese durch auffallenden Geschlechtsdimorphismus allgemein bekannte und häufige Langhornbiene, liegt uns in einem lateral-

*) Wir verdanken die Determination unserem Freunde A. Mocsary-Budapest, dem eifrigen Beobachter dieser tropischen Fossorien-Gattung.

gynandromorphen Exemplar vom Kaiserstuhl vor, wo es Friese in Begleitung des verstorbenen Prof. J. Carriere am 31. Mai 1881 an *Lotus corniculatus* fliegend fand.

Der Kopf ist mehr ♂, rechts mit dem langen Fühler von fast Körperlänge, der 13gliedrig ist und nur ein verkürztes und umgebogenes Endglied aufweist: Clypeus und Labrum sind gelb wie beim ♂, doch zeigt der Clypeusrand nach innen ziemlich breit braunschwarze Auszackungen. Der linke Fühler ist rein ♀, kurz, nur von Kopflänge und 12gliedrig. Thorax sammt Flügel und Beine ist rein ♀. Abdomen ist trotz seiner 7 Segmente lateral-gynandromorph und zwar rechts ♂ (Segment 1.—2. gelbbraun behaart, 3.—7. schwarz behaart); links dagegen ♀, Segment 1.—2. gelbbraun behaart, aber der Rand des 2. breit bindenartig behaart, Segment 3.—5. mit breiten weisshaarigen Randflecken, 6.—7. aber schwarz behaart. Am Bauche unterscheidet sich die weibliche (♀) Hälfte (links) durch starke und gelbliche Behaarung, die in der Mittellinie scharf gegen die schwarze, ♂, der rechten Seite absticht. Sonst zeichnet sich die linke Hälfte (♀) durch bedeutendere Breite aus, wodurch die schiefe Stellung erfolgt, die auch unsere Abbildung gut wiedergibt. Der Genitalapparat dürfte ♂ sein.

Tetralonia dentata Klug (Gr. I. 2 a.)

(vergl. T. I. Abbild. 5 = ♂, 6 = ♀, 7 = ♀, von vorne.)

Tetralonia dentata ist eine der vorhergehenden *Eucera* nahe verwandte Bienenform, von der uns eine Zwitterform von Berlin vorliegt, die wir Freund Konow-(Teschendorf) verdanken.

Es ist nur der Kopf lateral-gynandromorph.

Kopf rechts ♂, was ausser durch die 13gliedrigen und längeren Fühler, die aber infolge eigenartiger Verdickung und Verkrüppelung nur 2/3 der normalen ♂ Fühler erreichen, durch den auf der rechten Seite gelbfärbigen Theil des Clypeus und Labrum hervorgeht.

Auf der linken Seite ist der Kopf ♀, kurz und 12gliedrig, ebenfalls etwas verkrüppelt: Labrum schwarz und der Clypeus nur am Vorderrand gelbweiss, wie es dem normalen ♀ entspricht. Unsere Abbildung gibt auch dies deutlich wieder.

Thorax und Abdomen sind rein ♀, Genitalapparat also wohl ebenfalls. —

***Osmia caerulea* L. (Gr. III. 2 a).**

Ein unvollkommen ausgebildeter Gynandromorph liegt uns aus Schwerin i. Mecklbg. vor, gefangen am 25. Mai 1879, im Garten Kirchenstrasse 1.

Kopf ♀, Thorax und Abdomen ♂, also frontal.

Kopf dick, gross und blaugefärbt wie beim normalen ♀: Fühler 12gliedrig und kurz, der Clypeus aber links erzfarben und hier die längere, gelbliche Behaarung des ♂ tragend.

Thorax und Abdomen sind ♂, doch zeigen beide blaugefärbte Partien (♀): Beine sind aber rein ♂; das Abdomen hat 7 Segmente, mit der Anal-Bewehrung des ♂: Segment 1.—2. sind oben auf der linken Körperhälfte blau gefärbt.

Genitalapparat scheinbar ♂.

***Trachusa serratulae* Pz. (Gr. I. 2 c.)**

Ein tadellos erhaltenes Exemplar verdanken wir A. Ducke-Odrau, wo es am 7. Juli 1898 gefangen wurde.

Kopf ♀, Thorax ♀, Abdomen links ♀, rechts ♂, also lateral getheilt.

Kopf gross und dick wie beim ♂ gebildet, auch Fühler kurz und 12gliedrig, jedoch ist der Clypeus und das rechte Nebengesicht grösstentheils gelb gefärbt, wenn auch viele dunkle Stellen bemerkbar sind.

Thorax rein ♀, Beine zeigen die charakteristischen und breiten ersten Tarsenglieder, etc.

Abdomen aber rechts ♂ und links ♀; rechte Hälfte mit 7 Segmenten, man erkennt deutlich das halbe, gehöckerte 7., am Bauche fehlt die Scopa und sind die Segmenteindrücke und die dreieckige Ausrandung des 3. Segmentes bis zur Mittellinie sichtbar, die linke Hälfte hat aber nur 6 Segmente (♀) und ist am Bauche mit starker Scopa versehen, die sogar zahlreiche, eingesammelte Pollenkörner aufweist. Aus letzterem Umstande kann vielleicht auf einen weiblichen Genitalapparat geschlossen werden.

Uebersichtliche Zusammenfassung.

Die vorliegend aufgeführten 65*) Gynandromorphen unter den Hymenopteren lassen sich in laterale, transver-

*) Die 15 Nummern über *Apis mellifica* mit über 45 Exemplaren und dem ganzen Eugster'schen Bienenstock sind hier nicht mit inbegriffen! —

sale, frontale und gemischte Zwitterformen eintheilen. Bietet schon die exakte Untersuchung der vorliegenden Objekte oft nicht unbedeutende Schwierigkeiten im Erkennen der secundären sexuellen Eigenthümlichkeiten, so stösst die Unterbringung dieser Beschreibungen, welche oft vor Jahrzehnten von nach Alter, wie Nationalität verschiedenen Autoren angetertigt wurden, auf nicht unbedeutende Schwierigkeiten, die durch die mannigfachen Sprachidiome gewiss nicht vereinfacht werden.

Besonders freudig wurden deshalb von uns gute (bes. colorirte) Abbildungen begrüsst, weil diese als wirklich internationales Verständigungsmittel uns unabhängig von langathmigen Beschreibungen sofort zur richtigen Erkenntnis der Gruppen kommen liessen und auch die Anfertigung kurzer charakteristischer Notizen ermöglichten.

Der Uebersicht halber versuchten wir bei jeder vorstehend beschriebenen Gynandromorphen-Form durch Abbreviaturen seine Stellung im nachfolgenden System zu kennzeichnen.

Es bedeuten darin die einfachen Zeichen ♀, ♂, ♂ vor der Gruppe (Gr.) gesetzt, dass bei dem betr. Exemplar auch der innere Genitalapparat anatomisch untersucht wurde und zwar ♀ = rein weiblich, ♂ = rein männlich und ♂ = gemischt aus ♂ und ♀ Sexualorganen. Die übrigen Bezeichnungen erklären sich am besten aus nachfolgender Tabelle:

♀. Eintheilung.

Gruppe I. — laterale Gynandromorphe (seitlich verschieden gekleidete) 38 Fälle.

1. links ♂ — rechts ♀ (17)
2. links ♀ — rechts ♂ (18)
3. kreuzweise — einmal links ♂ u. rechts ♂ S. (3)
 - a. Kopf allein (11)
 - b. Thorax allein (3)
 - c. Abdomen allein 0

- d. Kopf und Thorax (10)
- e. Kopf und Abdomen (2)
- f. Thorax und Abdomen (3)
- g. Der ganze Körper (9)

Gruppe II. — transversale Gynandromorphe (oben und unten verschieden gekleidete) 1 Fall.

- 1. oben ♂ — unten ♀ (1)
- 2. oben ♀ — unten ♂ 0
 - a. Kopf allein (1)
 - b. Thorax allein 0
 - c. Abdomen allein 0
 - d. Kopf und Thorax 0
 - e. Kopf und Abdomen 0
 - f. Thorax und Abdomen 0
 - g. Der ganze Körper 0.

Gruppe III. — frontal Gynandromorphe (vorn und hinten verschieden gekleidete) 16 Fälle.

- 1. vorne ♂ (6)
- 2. vorne ♀ (10)
 - a. Kopf allein (9)
 - b. Kopf und Thorax (3)
 - c. Thorax allein vom andern Geschlechte (4).

Gruppe IV. — Gemischte Gynandromorphe (aus obigen Gruppen zusammengesetzte, also lateral, transversal und frontal durcheinander). 18 Fälle.

- 1. links ♂.
- 2. links ♀.
- 3. vorne ♂.
- 4. vorne ♀.
- 5. oben ♂.
- 6. oben ♀.
- 7. kreuzweise.

Tragen wir nun die bisher bekannten Gynandromorphen, soweit dies nach den vorhandenen, oft mehr als dürftigen Beschreibungen möglich ist, in dieser Tabelle ein, so stehen die lateralen mit 38 Vertretern obenan, bei denen sich jedoch ein Vorherrschen von links ♂ oder links ♀ nicht nachweisen lässt (17 : 18); 3 sind kreuzweise gemischt. Am häufigsten erscheint der Kopf allein (11mal) in Mitleidenschaft gezogen, dann folgt Kopf und Thorax mit 10 und zu dritt der ganze Körper (9mal), während b, e, f, mit 3 und 2 Fällen nicht weiter hervortreten und c,

wo das Abdomen allein als lateral-gynandromorph zu beobachten, noch nicht aufgefunden wurde.

Die transversal halbirtten Gynandromorphen sind in reinem Zustande bisher nur in einem Falle bei *Apis mellifica* (Menzel Nr. 67) bekannt geworden, wohl aber in 9 gemischten Fällen unter Gruppe IV.

Die frontal getheilten Gynandromorphen treten bisher in 16 Fällen auf von denen die meisten (10) vorne ♀ sind, sonst ist der Kopf allein in 9 Fällen, Kopf und Thorax in 3 und Thorax allein in 4 Fällen vom anderen Geschlechte beherrscht worden.

Nehmen wir endlich die gemischten Gynandromorphen (IV.) vor, so weisen sie 18 Fälle auf, von denen 13 die laterale (I.), 10 die transversale (II.) und 11 die frontale Gruppe ergänzen würden. Bei diesen gemischten fällt also das häufigere Vorkommen der transversalen auf, wovon wir im reinen Zustande nur einen Fall bisher kennen lernten; ebenso ist das viel spärlichere Auftreten der lateralen Bildung gegenüber der Gruppe I hervorzuheben, während die frontalen (III.) die Mittelstrasse behalten.

Erwähnenswerth sind nun noch die wirklich hermaphroditisch veranlagten Thiere, soweit dieselben untersucht wurden: diese 5 Fälle, durch ♀ oder ♂ vor die Gruppe gesetzt kenntlich gemacht, ergeben durchweg (4) wirkliche Hermaphroditen in der inneren Genitalanlage*) und nur ein rein weiblicher Fall bei *Abia* von Gerstäcker beschrieben. Auch bei weiteren Fällen, die jedoch nicht klar beschrieben wurden, scheinen, — wenn das Abdomen gynandromorph war (besonders der apicale Pol auch die inneren Genitalorgane mehr oder weniger verkrüppelt und aus ♂ wie ♀ Theilen zusammengesetzt zu sein.

*) Bei *Apis mellifica* n. Menzel dagegen nur immer ein Geschlechtscharakter ausgeprägt! —

Apis mellifica ist ja infolge des Eugster'schen Stockes in Constanz nicht nur in grösserer Anzahl in gynandromorphen Exemplaren bekannt geworden, sondern wurde auch zergliedert und anatomisch untersucht (Siebold). Die Resultate sind aber mehr oder weniger allgemein gehalten, so dass ein Einreihen in unser obiges System unsicher, ja unmöglich wird.

Als Schlussresultat der Untersuchungen von Menzel beachte man (p. 78—79):

„Der Verkümmernng der Geschlechtsorgane entspricht in höherem oder niederem Grade auch eine solche der inneren, insbesondere gilt dies von derjenigen Partie an, wo die Vereinigung der Ei- und Samenleiter geschehen ist. Wir finden z. B. Fälle, in denen vom Ruthenkörper an alle Theile des Begattungsapparates, so eigenthümlich gestaltet sie sein mögen, ganz gut erkenntlich sind: wir finden aber auch diese Theile ganz nahe zusammengerückt und fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Stachel ist in der Regel, wenn schon durchschnittlich von geringer Grösse, doch in allen seinen Theilen vollkommen ausgebildet und stets mit einer umfangreichen Giftblase in Verbindung stehend. Immer fand sich im Innern nur ein Geschlechtscharakter ausgeprägt; entweder waren die Geschlechtstheile ♂ oder ♀, nie halbseitig oder gar doppelt entwickelt.“

Siebold sagt dagegen (p. 80 u. 81):

„Was nun die innere Organisation dieser Zwitterbienen betrifft, so erkannte ich auch hier dieselbe mannigfaltige Unregelmässigkeit und Ungleichheit in der Vermengung, in der Entwicklung und in dem Vorhandensein oder Fehlen der einzelnen Abtheilungen der mehr oder weniger zur vollkommenen Ausbildung gelangten ♂ Fortpflanzungsorgane und der wie bei allen ♀, stets mehr oder weniger verkümmerten ♀ Geschlechtswerkzeuge. Auch hierbei fanden, wie bei der äusseren Organisation dieser Hermaphroditen, die verschiedensten Grade der Zwitterbildung statt. Vor allem muss ich hervorheben, dass die Zwitterbildung der äusseren Körperform fast nie im Einklange stand.“

Ferner Zeile 2 von unten:

„Mit diesen vollkommenen ♂ Geschlechtswerkzeugen sah ich sehr oft einen Giftapparat verbunden, dessen Stachel sich in einem mehr oder weniger verkrüppelten Zustande befand. Eine

sehr auffallende und ganz eigenthümliche Zwitterbildung, die sich mir sehr häufig darbot, bestand darin, dass sich auf beiden Seiten statt eines Hodens mehrere Hodenschläuche mit mehreren Eierstockröhren vereinigt zeigten, während im übrigen die Nebenhoden und das ♂ Begattungsorgan, welches am untern Ende zuweilen einen Giftapparat mit unvollkommenem Stachel neben sich hatte, ganz regelmässig entwickelt waren.

Einige Male wurde ich dadurch überrascht, dass bei ganz normaler Entwicklung der ♂ Geschlechtswerkzeuge statt des einen Hoden ein Eierstock mit leeren Eierstockröhren vorhanden war.*

Während also Menzel und Siebold nicht zu dem gleichen Resultat kommen, steht die Untersuchung von Gerstäcker*) in Uebereinstimmung mit jener von Th. v. Siebold (p. 83).

Zum Schluse empfehlen wir den Interessenten, die Gynandromorphen eingehender Beachtung und, wenn sie äusserlich nicht besonders schön ausgeprägt und erhalten sind, auch einer Untersuchung der inneren Geschlechtsorgane. Dass äusserer wie innerer Befund am besten durch Originalabbildungen darzustellen sind, versteht sich heutigen Tages wohl von selbst.

Vielleicht gelingt es auf diese Weise, tiefer einzudringen in die Ursachen solcher gynandromorphen Bildungen und mit Hilfe der entwicklungsmechanischen Eingriffe nach Roux Licht in diese Frage zu bringen!

Mögen diese Zeilen als ein Baustein zur Lösung derselben betrachtet werden!

*) Objekte von Siebold in Alkohol erhalten! —

Die

Erysipheen Tirols.

Von

P. Magnus.

Beschäftigt mit den Arbeiten zur Pilzflora von Tirol, die ich auf Anregung der Herrn Prof. von Dalla Torre und Graf Sarnthein übernommen habe, habe ich anlässlich der Bearbeitung des auf dem Apfelbaume in Südtirol so verbreitet auftretenden Mehlthaus die mir bisher aus Tirol bekannt gewordenen Erysipheen zusammengestellt. Die Grundlage bildet der werthvolle Zettelcatalog, den die Herren Prof. v. Dalla Torre und Graf Sarnthein über das Auftreten aller Pflanzengruppen in Tirol gewissenhaft zusammengestellt haben, und von dem mir Herr Prof. v. Dalla Torre eine Abschrift bezüglich der Pilze zugesandt hat.

Die wichtigste Litteratur, die für Erysipheen in Tirol in Betracht kommt, ist:

1) F. Unger: Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, nachgewiesen an der Vegetation des nordöstlichen Tirols (Wien 1836) S. 230.

2) H. Kravogl: Zur Kryptogamenflora von Südtirol. (Programm des k. k. Staats-Gymnasiums in Bozen 1886—87).

3) J. Bresadola: Fungi Tridentini novi vel nondum delineati, descripti et iconibus illustrati. Fasc. II (Trient 1882) S. 25 Tab. XXX fig. 2.

4) A. N. Berlese e G. Bresadola: *Micromycetes Tridentini* (Annuario della società degli Alpinisti Tridentini dell'anno 1887—88).

5) P. Magnus: Die von J. Peyritsch in Tirol gesammelten und im Herbarium der k. k. Universität zu Innsbruck aufbewahrten Pilze (Berichte des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines in Innsbruck XXI. Jahrg. 1892—93).

Ausserdem sind noch manche Angaben über das Auftreten des Mehlthaus auf Culturpflanzen in der Litteratur zerstreut, wie z. B. die von C. Mach in der Weinlaube 1873 S. 210, oder gelegentliche Mittheilungen Hugo v. Mohls über das Auftreten des Mehlthaus auf dem Weinstocke in der Bot. Zeitung 1852 Sp. 10. 1853 Sp. 583 und 1854 Sp. 142 und ähnliche.

Ausser diesen litterarischen Quellen wurde ich aufs Wesentlichste unterstützt durch gefällige und werthvolle Mittheilungen einiger Herren. Namentlich Herr stud. phil. F. Stolz in Innsbruck liess mir wiederholt alpine Sammlungen von Pilzen, die er in Tirol gesammelt hatte, zukommen, unter denen auch interessante Erysipheen vertreten waren. Ebenso bin ich den Herren Prof. Dr. Em. Heinricher, Dr. R. v. Wettstein, J. Bornmüller und meinem Neffen Werner Magnus für Mittheilung der von ihnen in Tirol gesammelten Pilze verpflichtet. Herr Hauptlehrer J. N. Schnabl in München und Herr Lehrer G. Wagner in Schmilka i. Sachsen theilten mir je eine Liste der von ihnen in Tirol gesammelten Pilze mit, worunter auch Erysipheen vertreten sind. Herr Pater H. Zurhausen in Feldkirch theilte mir zwei Standorte von Erysipheen mit. Allen diesen Herren, die mich so freundlich unterstützt haben, spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus. Auch konnte ich durch die freundliche Vermittelung des Herrn Prof. v. Dalla Torre das Herbarium des Ferdinandeum in Innsbruck vergleichen.

Schliesslich habe ich selber in mehreren Jahren Pilze in Tirol gesammelt, worunter viele Erysipheen. In der folgenden Aufzählung gebe ich bei jedem Standorte den Sammler in Klammern an und füge nach allgemeinem Brauche ein ! hinzu, wo ich die Art selbst bestimmt oder revidiert habe. Bei denjenigen Arten, die ich selbst am Standorte gesammelt habe, setze ich, wie üblich, !! hinter den Standort.

Gatt. *Sphaerotheca* Lév.

Sph. pannosa (Wallr.) Lév.

Das Oidium auf Rosa bei Feldkirch in Vorarlberg (H. Zurhausen); im Garten des Stiftes Wilten bei Innsbruck (Prantner im Herbar. des Ferdinandeum)! in Gärten in Hall (F. Stolz)! auf Rosa fragrans im Park zu Roncegno!! Das Oidium auf Persica vulgaris: bei Roncegno, (Heufler) bei Bozen (Kravogl l. c.)

Sph. Mali (Duby) Burr.

Auf Pirus Malus bei Bozen auf dem Rosmarinapfel (C. Mach in der Weinlaube 1873 S. 210); im Garten der Landwirthschaftlichen Landes-Lehr-Anstalt und Versuchstation in San Michele a. d. Etsch!!

Von diesem Mehlthau tritt meist nur das Oidium auf dem Apfellaube auf. Doch fand ich die Perithechien an vom Mehlthau befallenen Apfelzweigen, die mir Herr Prof. Mader auf meine Bitte im September 1898 freundlichst von San Michele sandte. Sie erwiesen die Art als *Sphaerotheca Mali* (Duby) Burr. die J. T. Burril in Ellis und Everhart North-American Pyrenomycetes 1892 S. 6 u. 7 aus Nordamerika beschrieben hat (Vgl. meine Mittheilung über einen Mehlthau des Apfels in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft November 1898).

Sie ist gut charakterisirt durch die birnförmigen Peritheecien, von deren oberer Wandung die grade nach oben od. vorn gerichteten Appendiculae ausgehen. Zu dieser Art gehört ohne Zweifel das meiste in Süd-Tirol auf dem Apfellaube sehr verbreitet auftretende *Oidium*.

Dass noch andere Mehlthau-Arten auf dem Apfel in Tirol auftreten, z. B. eine *Podosphaera* (*P. Kunzei* Lév.) oder *P. Oxyacanthae* (DC:) DBy. oder eine *Ucinula* (etwa verwandt der *Unc. Prunastri* Lév.), dafür liegt mir kein Material oder zuverlässige Angabe vor.

Sph. fugax Penz. u. Sacc.

Auf *Geranium silvaticum* im botanischen Garten in Innsbruck (E. Heinricher)!

Auf *Geranium pratense* L. auf einer Bergwiese bei Perdonig in Eppan (v. Heufler)! — Dieser Pilz wurde von dort in Rabenhorst *Fungi europaei* Nr. 1430 als *Erysiphe communis* Fekl f. *Geranii* von v. Heufler ausgegeben.

Sph. Castagnei Lév.

S. Humuli (DC.) *Erysiphe fuliginea* Schlechtld. Er. *Sanguisorbae* DC. auf *Humulus Lupulus*: bei Breinbühel!! bei Tumpen im Oetzthale!! viel bei Innsbruck!! bei Kitzbühel gemein (Unger l. c.); am Schlosse Tirol bei Meran (W. Magnus)! bei Bozen (Hugo v. Mohl in Botanische Zeitung 1853 Sp. 595 und Kravogl l. c.).

Auf *Impatiens noli tangere* L. bei Dölsach!! am Wege von Innsbruck nach Vill, ca. 800 M. (Peyr. l. c.)! im Petersberger Schlossparke bei Silz im Ober-Innthale (F. Stolz)! in der Masulschlucht bei Verdins!! bei Trient (Bresadola l. c.)!

Auf *Caltha palustris* bei Schruns in Vorarlberg (J. Bornmüller)!

Auf *Alchemilla vulgaris* bei Innsbruck am Heiligen Wasser (F. Stolz)!; bei Sistrans (F. Stolz)!; bei Aldrans, ca. 870 M. (Peyr. l. c.)!; bei Trins im Gschnitz-Thale!!

Auf *Poterium Sanguisorba* L. im Aflinger Moor bei Innsbruck (F. Stolz)! bei Kössen (Schnabl); in den Sumpfwiesen zwischen Völs und Afling, ca. 600 M. (Peyr. l. c.)! bei Kematen (Peyr. l. c.)!

Auf *Ulmaria pentapetala* bei Tschagguns bei Schruns in Vorarlberg (J. Bornmüller)! bei Innsbruck, 570 M. (Peyr. l. c.)!

Auf *Sibbaldia procumbens*, das *Oidium* im botanischen Garten zu Innsbruck!!

Unger giebt l. c. S. 230 *Erysiphe fuliginea* Schlechtld. in kastanienbraunen verwaschenen staubigen Flecken an der Unterseite der Blätter von *Saxifraga rotundifolia* vom Ehrenbachwasserfalle bei Kitzbühel im Spätherbste an, und zwar als eine von der *Erysiphe macularis* Fr. auf *Humulus Lupulus* unterschiedene Art, während er die auf *Sanguisorba* mit ihr identificiert. Ich kann leider kein Urtheil hierüber abgeben, da ich diese Form auf *Saxifraga rotundifolia* nie zu Gesicht bekommen habe. Sie möchte in Tirol öfter beobachtet werden, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet.

Auf *Melampyrum pratense* im Volderwalde bei Hall (F. Stolz)! am Tulferberge bei Hall (F. Stolz)!

Auf *Veronica Chamaedrys* das *Oidium* am Innicher Berge (W. Magnus und F. Stolz)!

Auf *Adenostyles albifrons* auf der Passhöhe des Arlberges 1780 M. (Britzelmayr in Rehm *Ascomycetes* Nr. 544)!

Auf *Senecio cordatus* bei Lermoos!!; im Val Cercena bei Rabbi (F. Stolz)!

Auf *Senecio vulgaris* bei Uttenheim im Taufererthale!!

Auf *Arnica montana*: im Langenthale in Stubai (F. Stolz)! in den Silzner Wäldern (F. Stolz)! im Val Pettorina (in Nord-Italien eine Stunde von der Grenze Tirols) (F. Stolz)!

Auf *Taraxacum officinale*: bei Lans (F. Stolz und W. Magnus)! auf der Höttinger Höhe bei Innsbruck!! bei Wilten 570 M. (Peyr. l. c)! am Wege von Innsbruck zum Peterbrünnl (Peyr. l. c)! im Gschnitzthale bei Trins!! bei Schönna!!

Auf *Tragopogon pratense* das *Oidium* am Schützenhause bei Lienz!!

Auf *Erigeron canadense* auf den Wiltener Feldern (F. Stolz)! — C. A. I. A. Oudemans unterscheidet in seiner *Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ces jours dans les Pays-bas* Tome II. 1897 S. 84 *Sphaerotheca Erigerontis* Oudem. (= *Sph. detonsa* West. hauptsächlich auf Grund der sich zurückkrümmenden und die Perithezien emporhebenden *Appendiculæ*. Ich wage nicht darüber ein Urtheil abzugeben.

Auch Burill unterscheidet in Ellis und Everhart *North American Pyrenomycetes Sphaerotheca Humuli* (Dc.) auf *Viola*, *Geranium*, *Spiraeaceen*, *Rosaceen* und *Humulus* und *Sph. Castagnei* Lév. auf *Compositen*, *Pulmonariaceen* und *Labiaten* hauptsächlich auf Grund der grösseren Zellen der Wandung des Peritheciums bei letzteren. Auch hierüber kann ich kein Urtheil abgeben.

Nur möchte ich bemerken, dass ich mit Erfolg das *Oidium* von *Humulus Lupulus* auf *Taraxacum officinale* geimpft habe. Dies braucht nicht zu widersprechen der Anschauung, dass meistens auf *Compositen* und auf *Humulus Lupulus* verschiedene *Sphaerotheca*-Arten auftreten, da recht gut sowohl auf dem Hopfen (auf dem ich selbst *Sphaerotheca Humuli* (Dc.) und *Phyllactinia suffulta* (Rebent.) Sacc. bemerkt habe und auf dem Burill l. c.

noch Erysiphe Cichoriacearum DC. angiebt), als auch auf Taraxacum officinale zwei nahe verwandte Sphaerothecen gedeihen könnten.

Kravogl giebt l. c. S. 15 Sphaerotheca Castagnei Lév. auf Cucurbitaceen bei Bozen an. Es geht aber aus seiner Angabe nicht hervor, dass er die Peritheecien auf Cucurbitaceen gesehen hat und auf Grund derselben die Art bestimmt hat. Auch ich gab in dem Verzeichnisse der von J. Peyritsch in Tirol gesammelten Pilze l. c. S. 141 das Oidium auf Cucurbita Pepo als zu Sphaerotheca Castagnei Lév. gehörig an. Ich that das, gestützt auf die Angaben von Léveillé, Winter, Saccardo u. a. Nun sagt aber J. Schroeter in der Kryptogamen-Flora von Schlesien, 3. Bd., Pilze, Zweite Hälfte S. 235, dass er auf Cucurbita Pepo gut und reichlich entwickelte Peritheecien gefunden habe, auf Grund deren er die Oidien auf Cucurbitaceen zu Erysiphe communis (Lk.) Fr. (= Erys. Polygoni DC.) zieht. Ich werde sie daher auch unter Erysiphe communis (Lk.) Fr. anführen.

Sph. Epilobii (Lk.) Sacc.

Auf Epilobium alpinum im Vicarthal bei Patsch (F. Stolz)!

Auf Epilobium palustre am Wege von Jenbach nach Maurach!!, bei Lans!!

Sph. tomentosa Otth, in Berner Mittheilungen 1865 p. 168. Sph. gigantiascus (Sorok. u. Thm.) Bäumler in Hedwigia 1891 p. 261.

Auf Euphorbia dulcis: Gocciadoro bei Trient!!

Auf Euph. helioscopia auf Weinbergen bei Grlan (v. Heufler).

Gatt. Podosphaera Lév.

Pod. myrtillina (Schub.) Lév.

Auf *Vaccinium Myrtillus* in Wäldern bei Kitzbühel (Unger l. c.)

Pod. Oxyacanthae (DC.) dBy.

Auf *Crataegus Oxyacantha* am Wege zum Peterbrünnl bei Innsbruck ca. 570 M. (Peyr. l. c.)!; Hecke beim Bierstindl bei Innsbruck ca. 600 M. (Peyr. l. c.)!; auf der Mendel!!

Pod. tridactyla (Wallr.) dBy.

Auf *Prunus Armeniaca* das *Oidium* im Garten der Landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt und Versuchstation in San Michele a. d. Etsch!! — Wenn ich diesen Mehlthau zu *Podosphaera tridactyla* (Wallr.) stelle, so folge ich darin Kirchner: Die Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirthschaftlichen Culturpflanzen (Stuttgart 1890) S. 317.

Pod. Bresadolae Quél. in Bresadola: Fungi Tridentini I S. 25.

Auf dem Hute von *Arrhenia Auriscalpium* Fr. in schattigen Wäldern im Val di Sole (L. Bresadola l. c.) — So sehr auffallend auch das Auftreten der *Podosphaera Bresadolae* Quél. auf dem Hute eines Pilzes ist, so giebt es doch noch einige Angaben über solches Auftreten von Erysipheen. So hat St. Schulzer von Muggenburg in der Oesterreichischen Botan. Zeitschrift 1876 S. 58 eine Erysiphe fungicola auf *Boletus duriusculus* aus Slavonien beschrieben, die Saccardo in Sylloge Fungorum I, S. 6 fraglich in die Gattung *Phyllactinia* stellt. Und neuer-

dings hat P. A. Saccardo in der *Malpighia* ann. XI 1897 S. 282 die *Erysiphella Carestiana* beschrieben, die *Carestia* auf dem Hute von *Fomes fomentarius* 1859 bei Riva-Valdobbia gesammelt hatte. Besonders bemerkenswert erscheint es mir, dass Erysipheen aus verschiedenen Gattungen auf diesem so abweichenden Substrate auftreten, d. h. aus verschiedenen Verwandtschaftskreisen auf dieses Substrat übergehen.

Im Anschlusse hieran erwähne ich noch die *Erysibe Chroolepidis* P. Reinsch, die P. F. Reinsch in seinen *Contributiones ad Algologiam et Fungologiam* Vol. I. (Leipzig 1875) S. 96 beschreibt und auf Tafel V Fig. 3 abbildet. Er hat sie auf *Chroolepus aureum* aus Tirol beobachtet. Aber aus seiner Beschreibung und Abbildung lässt sich nichts Bestimmtes über den Pilz entnehmen. Er beschreibt *Erysibe Chroolepidis* l. c. folgendermassen: *Stroma ex filis subramosis in plantae infectae cellulis* ¹⁾ (*Chroolepidis*) *procurrentibus* *formatum*; *sporidiae hemisphaericae usque hemiellipsoideae membrana aculeis latis obtuso-rotundatis obtecta*. — *Latit. filorum stromatis* 0,0056—0,0098 mm. *Diam. sporidiae* 0,0278—0,0333 mm. — Und in der Figurenerklärung sagt er Tab. V fig. 3a: *Chroolepidis aurei fili pars a Fungi filis dense obtecta, fila stromatis in ramo sinistro Chroolepidis se expandientia sporidium singulum evolvens fig. l. c. Chroolepidis filorum duorum partes a Fungi filis obtectae, fila stromatis circum circa fila Chroolepidis spiraliter procurrentia, ramuli singuli Fungi ex cellulis fili primarii cellulis multo minoribus exstituti* (720—1). — Letztere ramuli ex cellulis multo minoribus könnte man nach der Abbildung für Oidienzweige halten, vorausge-

¹⁾ Die Abbildungen zeigen deutlich, dass die Fäden des Pilzes auf den Zellen des *Chroolepus* (nicht in den Zellen) verlaufen, was der Vf. vielleicht durch *procurrentibus* andeuten will.

setzt, dass die Oidien, über deren Farbe und Beschaffenheit er Nichts aussagt, hyalin sind. Und seine Sporidia oder Sporidien müsste man denn für ein Perithecium halten, womit die Grösse und seine hemisphärische Gestalt stimmen. Die aculei wären dann freilich sehr sonderbare appendiculae. Dass diese Sporidia einem Perithecium einer Erysiphee entsprechen könnte, dafür spricht auch die auf derselben Taf. V Fig. 2 gegebene Abbildung der Sporidie der Erysibe Andreaeacearum, die noch mehr einem Perithecium ähnelt. Da aber der Vf. nichts von der zelligen Wandung oder Oberflächenzeichnung der Sporidia oder von den Asci erwähnt, so ist solche Deutung mehr als zweifelhaft, und es ist mit den Angaben von Reinsch über den interessanten Pilz Nichts anzufangen. Es wäre sehr erwünscht, den Pilz wieder aufzufinden und seinen Bau und Entwicklung genauer festzustellen.

Gatt. Erysiphe (Hedw.) Lév.

Er. graminis DC.

Auf *Dactylis glomerata* bei Arzl (F. Stolz)! auf *Avena sativa* am Innicher Berge (F. Stolz und W. Magnus)!

Auf einem Grase bei Wilten (Peyr. l. c.)! Auf verschiedenen Gräsern bei Kitzbühel (Ung. l. c.)

Er. Linkii Lév.

Auf *Artemisia vulgaris* bei Kufstein (G. Wagner); Untermais bei Meran (W. Magnus)!

Auf *Tanacetum vulgare* am Paschberge bei Innsbruck (F. Stolz)!

Er. tortilis (Wallr.) Fr.

Auf *Cornus sanguinea* häufig um Innsbruck; am Berg Isel!! am Wege zum Schlosse Amras (Peyr. l. c.)! Zwischen Amras und Wilten 570—575 m. (Peyr. l. c.)!

Er. Umbelliferarum (Lév.) dBy. (Er. *Heraclei* DC.)

Auf *Pimpinella Saxifraga* am Sonnenburger Hügel (F. Stolz)! bei Schönnä!!

Auf *Heracleum Sphondylium* bei Feldkirch in Vorarlberg (H. Zurhausen); an der Brennerstrasse bei Innsbruck (Peyr. l. c.)!; bei Kössen (Schnabl); bei Schönnä!!; bei Bozen, Lengmoos, Tramin (Kravogl l. c.); am Calvarienberge bei Bozen!!

Auf *Aegopodium Podagraria* bei Bozen, Lengmoos, Tramin (Kravogl l. c.)

Auf *Chaerophyllum hirsutum* L. am Paschberge bei Innsbruck (F. Stolz)!; bei Bozen, Lengmoos, Tramin (Kravogl l. c.)

Auf *Chaer. Villarsii* Koch (Ch. *Cicutaria* Reichbch.) bei Lermoos!! bei Kitzbühel (Ung. l. c.)

Er. Martii Lév.

Die Unterscheidung dieser Art von *Erys. communis* Lév. ist bekanntlich sehr schwankend. G. Winter sucht sie durch die Farblosigkeit der Anhängsel zu charakterisieren; doch kann man sich leicht überzeugen, dass gerade dieser Charakter sehr variirt. Auch J. Schroeter charakterisiert sie zwar durch farblose Anhängsel, spricht aber selbst seine Zweifel aus, dass dieses Merkmal zur Trennung der Art ausreiche. De Bary hat deshalb *Er. Martii* Lév. und *Er. communis* Lév. wieder in eine Art vereinigt. J. Schroeter hat sich die Sache bequem gemacht, indem

er alle auf Papilionaceen auftretende Erysiphen zu Erys. Martii Lév. (Er. Pisi DC) stellt, trotzdem doch viele Formen auf Papilionaceen braune Anhängsel haben, wie ich es z. B. an Trifolium alpestre und an Ononis beobachtet habe. Ich hatte deshalb auch die von J. Peyritsch bei Innsbruck auf Trifolium alpestre gesammelte Art als Erysiphe communis (Wallr.) Fr. bestimmt und l. c. so aufgeführt. Ich werde jetzt der Uebersicht halber, d. h. weil ich nicht jede Form untersuchen konnte, da bei vielen die Perithechien noch nicht reif waren, alle auf Papilionaceen auftretenden Erysiphen unter Erysiphe Martii Lév. aufführen, trotzdem ich recht wohl weiss, dass auf Papilionaceen — auch in Tirol — sowohl Formen mit farblosen Anhängseln der Perithechien also Erys. Martii Lév. — als auch Formen mit braunen und kürzeren Anhängseln — also Erys. communis (Wallr.) Fr. — auftreten. Uebrigens sind braune Anhängsel häufig am vorderen Theile farblos. Eine genauere allgemeinere Studie über die auf Papilionaceen auftretenden Erysipheen denke ich bald abzuschliessen.

Auf Trifolium pratense L. bei Dölsach!! Steinwald bei Silz im Oberinnthale (F. Stolz)! im Garten des Stiftes Wilten bei Innsbruck (v. Heufler); im Zillerthale (Moll b. Schrank Primit 240.); bei Trins (v. Wettstein)!; bei Taufers!! bei Verdins!! bei Girlan (v. Heufler).

Auf Trif. alpestre L. am Wege vom Jesuitenhofe bei Innsbruck nach Unterberg, ca. 867 M. (Peyr. l. c.)!; auf dem Sonnenburger Hügel, ca. 700 M. (Peyr. l. c.)!

Auf Trif. medium L. (Tr. flexuosum Jacq.) im Buchwalde bei Kitzbühel (Ung. l. c.)

Auf Trif. hybridum L. ober Mühlau (F. Stolz)!

Auf Trif. arvense L. bei Pigenó in Eppan (v. Heufler).

Auf *Coronilla varia* L. bei Eppan (v. Heufler).

Auf *Onobrychissativa* Lam. bei Brennbühel!! Zwischen Imst und Starkenberg!! beim Judenbühel nördlich von Innsbruck (F. Stolz)!

Auf *Calystegia sepium* (L.) bei Meran!!

Auf *Urtica dioica* L. im Volderwalde bei Hall (F. Stolz)!

Auf *Galium Aparine* Bretterkeller bei Innsbruck 575 m. (Peyr. l. c.)!

Auf *Thesium alpinum* das *Oidium* im Gschnitzthale (F. Stolz)!

Er. communis (Wallr.) Fr.

Auf *Ranunculus acris* L. bei Sistrans (F. Stolz)!; bei Verdins nächst Meran!!

Auf *Thalictrum aquilegifolium* L. das *Oidium* bei Stams im Oberinnthale (F. Stolz)!

Auf *Caltha palustris* bei Igls (F. Stolz)! bei Niederdorf im Pusterthale 1200 M. (J. Bornmüller)!

Auf *Delphinium Ajacis* im Garten des Stiftes Wilten bei Innsbruck (v. Heufler).

Auf *Delph. tirolense* im Volderthale (F. Stolz)!

Auf *Delph. Consolida* in Gärten bei Trient (Bresadola l. c.)

Auf *Aquilegia vulgaris* im Garten des Stiftes Wilten bei Innsbruck (v. Heufler).

Auf *Actaea spicata* auf der Mendel!!; bei Trins!!

Auf *Paeonia officinalis* im Pfarrgarten in Navis bei Deutsch-Matrei 1375 M. (F. Stolz)!

Auf *Polygonum aviculare* bei Katzenstein nächst Meran!! bei Schönnau!! bei Bozen und Neumarkt (Kra-vogl l. c.) im Schlosshofe von Freienstein bei Eppan (v. Heufler); bei Rovereto!!

Auf *Arabis Turrita* in Gries bei Bozen (v. Heufler);

Auf *Valeriana officinalis* bei Mühlgraben (Schnabl).

Auf *Convolvulus arvensis* L. Katzenstein nächst Meran!!; am Eisakufer bei Bozen!! Rentsch bei Bozen!! bei San Michele a. d. Etsch!!

Auf *Hypericum montanum* L. im Issthale bei Hall i. T. (F. Stolz)!

Auf *Hyper. perforatum* L. im Walde beim Bereiterhof oberhalb Wilten (F. Stolz)! im Horzthale bei Ampass (F. Stolz)! Doch stellt Léveillé in den Ann. d. sc. natur. Bot. III^{me} Série Tome XV. S. 166 die Erysiphe auf *Hypericum* zu Erysiphe Martii: die Anhängsel sind aber bis zu ein Drittel ihrer Länge an der Basis bräunlich. Ich habe schon bei Erysiphe Martii auf den geringen Werth; dieses Merkmals hingewiesen.

Auf *Antirrhinum Orontium* L. bei Denno (v. Heufler) bei der Wieshütte bei Bozen (v. Heufler); bei Eppan (v. Heufler).

Auf *Baptisia* sp. das Oidium im Botanischen Garten zu Innsbruck (E. Heinricher)! — Ich stelle dieses Oidium zu Erysiphe communis, weil Burrill in Ellis und Everhart North-American Pyrenomycetes S. 11 Erysiphe communis (Wallr.) auf *Baptisia tinctoria* angiebt.

Auf *Cucumis sativus* bei Gries (Hausmann); vor Giralh (v. Heufler).

Auf *Cucurbita Pepo* bei Wilten 570 M. (Peyr. l. c.) Auf den Wiltener Feldern bei Innsbruck (F. Stolz)! bei San Michele a. d. Etsch!! — Ich habe schon oben bei *Sphaerotheca Castagnei* angegeben, dass ich auf Grund der Angaben von J. Schroeter dieses Oidium jetzt zur Erysiphe communis (Wallr.) Fr. stelle.

Der v. Hohenbüchel-Heufler in Rabenhorst Fungi Europaei No. 1430 auf *Geranium pratense* von Bergwiesen bei Perdonig als Erysiphe communis (Wallr.) Fr. ausge-

gebene Pilz war fälschlich so bestimmt und ist, wie schon gesagt, *Sphaerotheca fugax* Penz. et Sacc.

Erysiphe Galeopsidis DC.

Auf *Lamium album* L. am Volderberg bei Hall (F. Stolz)!; bei Gschnitz!! in Sand bei Taufers!! vor St. Ulrich St. Christina in Gröden (F. Stolz)!

Auf *Lamium amplexicaule* L. bei Girlan (v. Heufler).

Auf *Calamintha* das *Oidium* in der Mühlauser Klamm (F. Stolz)!

Auf *Galeobdolon luteum* das *Oidium* am Peterbrünnl bei Wilten (F. Stolz)!

Auf *Salvia glutinosa* das *Oidium* am Kerschbuchhofe bei Hötting (F. Stolz)! in Südtirol (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 1854 Sp. 142).

Auf *Galeopsis Tetrahit* beim Lanser See (F. Stolz)! bei Kitzbühel (Unger l. c.)

Auf *Galeopsis speciosa* auf der Mendel!!

Erysiphe Cichoriacearum DC. (*Er. lamprocarpa* Lév., *Er. horridula* Lév.)

Auf *Plantago major* L. häufig bei Innsbruck, am Wege zum Peterbrünnl (Peyr. l. c.)! beim Peterbrünnl (F. Stolz)! auf den Wiltener Feldern (F. Stolz)! in Süd-Tirol (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 1854 Sp. 142).

Auf *Plant. media* L. bei Trient (Bresadola l. c.)

Auf *Lappa major* Gaertn. bei Brennbühel!!; bei Igls (F. Stolz)!; am Sillfalle bei Wilten ca. 600 M. (Peyr. l. c.)!

Auf *Lappa minor* DC. bei Trient (Bresadola l. c.)

Auf *Cirsium oleraceum* Scop. bei Lans bei Innsbruck! bei Aldrans (F. Stolz)!

Auf *Carduus viridis* auf der Höttinger Alpe (F. Stolz)!

Auf *Prenanthes purpurea* L. beim Heiligen Wasser bei Innsbruck (F. Stolz)!

Auf *Sonchus* bei St. Johann in Tirol (G. Wagner); in Süd-Tirol (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 1854 Sp. 142).

Auf *Hieracium incisum* in der Gant bei Eppan (v. Heufler).

Auf *Verbascum phlomoïdes* L. bei Trient!!

Auf *Verbascum Thapsus* L. Ponale am Garda-See!! Diese Form hat aber kurze farblose Anhängsel.

Auf *Myosotis palustris* das *Oidium* beim Lanser-See (F. Stolz)!

Auf *Lithospermum arvense* bei Absam 627 m. (Peyr. l. c.)!; bei Sta. Lucia bei Fondo!! bei Tres (v. Heufler).

Auf *Echium vulgare*, das *Oidium* am Wege von Innsbruck nach Igls (E. Heinricher)!; bei Mühlau (Peyr. l. c.)!

Auf *Symphytum officinale* am Innrain (Peyr. l. c.)! beim Peterbrünnl bei Wilten (Peyr. l. c. und F. Stolz)!

Auf *Parietaria diffusa* am Moarhofe gegen Mendel (v. Heufler). — Ich führe die Erysiphe auf *Parietaria diffusa* als *Er. Cichoriacearum* DC an, weil Burrill l. c. S. 13 diese Art auf *Parietaria debilis* und *Par. Pennsylvannia* in Nordamerika angiebt.

Ein *Oidium* auf *Linum usitatissimum* hat Herr Prof. Dr. Friedr. Wagner in einem davon stark befallenen Leinfelde bei Gries am Brenner gesammelt und mir davon gütigst mitgetheilt. — Ich finde das Auftreten eines Mehlthaus auf dem Lein noch in keinem Buche, speciell nicht in den Lehrbüchern der Pflanzenkrankheiten erwähnt. Hingegen liegt im Herbarium des Berliner Botanischen Museums ein aus dem Herbar Alexander Braun's stammendes *Oidium* auf *Linum usitatissimum* aus Schnepfenthal in Thüringen gesammelt im September 1869. Es steht auf dem Zettel:

Erysiphe — lamprocarpa?

Conidien

Linum cultum frequentissime occupans.

Schnepfenthal Sept. 1869.

Nach der Handschrift zu urtheilen möchte es von A. de Bary stammen.

Der Mehlthau scheint demnach öfter auf dem Lein aufzutreten.

Gattung *Microsphaera* Lév.

Mic. Astragali (DC.) Sacc.

Auf *Astragalus glycyphyllos* bei Afling (F. Stolz)! auf dem Sinnickerkopf bei Meran!! bei Achornach in Taufers!! bei Innichen (W. Magnus)!; bei Bozen (Kra-
vogel l. c.); am Kranfunsenberge und in Weinbergen bei Pigenó (v. Heufler).

Mic. Guarinonii Briosi et Cavara in J. Funghi parassiti delle piante coltivate od utili (No. 172 — 1891).

Im August 1894 habe ich im Botanischen Garten zu Innsbruck ein *Oidium* auf *Cytisus Laburnum* gesammelt, ohne die dazu gehörigen Perithechien zu finden und von demselben Standorte sammelte es Herr Fr. Stolz am 9. Juli 1895. Auch im Herbarium der Universität Innsbruck liegt es von dort ebenfalls ohne Perithechien aus dem Jahre 1894 vor. Dieses *Oidium* möchte zu der *Microsphaera Guarinonii* gehören, die Herr Guarinoni mit schönen Perithechien auf *Cytisus Laburnum* bei Varallo im Thale der Sesia im Sommer 1891 gesammelt hat, und die Briosi und Cavara l. c. genau beschrieben und schön abgebildet haben. Diese Art hat sicher eine weitere Verbreitung; doch scheint sie nicht häufig Perithechien zu bilden. So habe ich bereits im August 1875 ein *Oidium* auf Cy-

tisus Laburnum ebenfalls ohne Perithechien bei Homburg v. d. Höhe angetroffen.

Micr. Grossulariae (Wallr.) Lév.

Auf *Ribes Grossularia* bei Kössen (Schnabl); bei Mühlau 616 m. (Peyr. l. c.)!

Micr. Evonymi (DC.) Sacc.

Auf *Evonymus europaea* bei Lermoos!!; zwischen Imst und Starkenberg!!; bei Kufstein (Schnabl); beim Peterbrünnl bei Wilten (F. Stolz)!; vor Völs (F. Stolz)! am Paschberge bei Innsbruck 622 M. (Peyr. l. c.)! bei Unterberg (Peyr. l. c.)!

Micr. Berberidis (DC.) Lév.

Auf *Berberis vulgaris* am Paschberg (Fr. Stolz)!; im Petersberger Schlossparke bei Silz (F. Stolz)! im Amraser Parke (Peyr. l. c.)! bei Schönna!!; bei Achornach in Taufers!!; Santa Lucia bei Fondo!! bei Bozen (G. Wagner); am Calvarienberg bei Bozen!! Missian (v. Heufler).

Micr. Alni (DC.) Wint.

Auf *Alnus incana* am Tulfer Berge bei Hall i. T. (F. Stolz)!; bei Kitzbühel (Unger l. c.)

Auf *Alnus viridis* in der Masulschlucht bei Verdins!!

Gattung *Uncinula* Lév.

Unc. Salicis (DC.) Wint. *U. adunca* (Wallr.) Lév., *Erysiphe adunca* Fr.

Auf *Salix purpurea* zwischen Imst und Starkenberg!!; am Plansee!!; auf der Höttinger Höhe!!; bei den Kemater Wasserfällen!! bei Kufstein (Schnabl).

Auf *Sal. incana* ober Hötting (Fr. Stolz)!; auf der Höttinger Höhe!!

Auf *Salix daphnoides* bei Kitzbühel gemein (Unger l. c.)

Auf *Salix*-Arten in den Steinbrüchen bei Wilten (Peyr. l. c.)! an der Brennerstrasse (Peyr. l. c.)!; bei Trient (Bresadola l. c.).

Auf *Populus nigra* in Obermais bei Meran (W. Magnus)!; am Gleifbühel bei Bozen (v. Heufler).

Auf *Populus tremula* bei Ranggen ca. 560 m. (Peyr. l. c.)! bei Bozen (v. Heufler).

Unc. Bivonae Lé v.

Auf *Ulmus* bei Bozen (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 1854 Sp. 142, eigentlich nur aus Südtirol ohne nähere Angabe der Localität).

Unc. Prunastri (DC.) Sacc.

Auf *Prunus spinosa* bei Silz im Oberinnthale (F. Stolz)! in der Gant bei Eppan (v. Heufler); aus Südtirol (Hugo v. Mohl l. c.)

Unc. Aceris (DC.) Sacc., *Erysiphe bicornis* Fr.

Auf *Acer Pseudoplatanus* L. ausserhalb Wilten in der Nähe der Brennerstrasse ca. 622 m. (Peyr. l. c.)!; bei Kitzbühel (Unger l. c.)

Auf *Acer campestre* L. in Hecken bei Wilten und zwischen Innsbruck und Wilten (Peyr. l. c.)! vor Berg Isel bei Innsbruck!! bei Kaltern (F. Stolz)! bei Kufstein (J. N. Schnabl); bei Missian, Girlan, Frangart bei Bozen (v. Heufler).

Unc. Tulasnei Fekl.

Auf *Acer platanoides* L. auf den Wiltener Feldern (F. Stolz)! bei Hall (Peyr. l. c. zu *Unc. Aceris* (DC.) Sacc. von mir damals gezogen)!

Unc. necator (Schw.) Burr., *U. spiralis* Berk. *U. Ampelopsidis* Berk. — Mehlthau des Weins, Traubenkrankheit.

Das *Oidium* (*Oidium Tuckeri* Berk.) auf *Vitis vinifera* bei Feldkirch (Tiroler Bote 1878 S. 1603); bei Meran, Bozen, Trient, Rovereto (Hugo v. Mohl in Botan. Zeitung 1852, 1853 und 1854). — Nach den Mittheilungen von Viala und Ravaz und von v. Jaczewski ist es ganz sicher, dass zum *Oidium Tuckeri* diese in Nordamerika weit verbreitete Art gehört. Die Peritheecien sind in Süd-Frankreich an vielen Localitäten beobachtet worden.

Gattung *Phyllactinia* Lév.

Phyll. suffulta (Rebent.) Sacc. (*Ph. guttata* Lév.)

Auf *Corylus Avellana* L. am Calvarienberge bei Bieberwier!!; häufig bei Innsbruck; im Amraser Parke Peyr. l. c. und F. Stolz)! am Kerschbuchhof (Peyr. l. c.)!; bei Mühlau (Peyr. l. c.)! im Hofgarten (v. Heufler)! am Berg Isel!!; an der Höttinger Bergwand!!; an der Strasse von Aldrans nach Amras!! — Im Gschnitzthale bei Trins 1200 M. (A. Kerner in Flora exs. Austr. Hung. No. 381)!; bei Kufstein (J. N. Schnabl); bei Kitzbühel (Ung. l. c.); bei Lienz!!; bei Verdins!!; bei Bozen, Neumarkt (Kravogl l. c.); bei Unterplanitzing und Kaltern (v. Heufler); bei Meran am Passeier!!; bei Trient: Gocciadoro!! im ganzen Gebiete von Trient und Rovereto (Bresadola l. c.)

Auf *Alnus glutinosa*: am Passerufer bei Meran (W. Magnus)!; bei Schönna (W. Magnus)! am Küchelberge (W. Magnus)!

Auf *Alnus incana*: an der Brennerstrasse bei Innsbruck ca. 620 m. (Peyr. l. c.)! am Höttinger Graben (F. Stolz)! bei Kitzbühel (Unger l. c.)

Auf *Betula alba* bei Kitzbühel (Unger l. c.); bei Taufers!!; bei Verdins!!

Auf *Quercus Robur* L: bei Stams im Oberinnthale (F. Stolz)!

Auf *Fraxinus excelsior* L. bei Kitzbühel (Ung. l. c.); bei Trins im Gschnitzthale (A. Kerner in *Flora exsiccata Austro-Hungarica* No. 2368)!!; bei Verdins!!; bei Seis (Hausmann)!!; bei St. Constantin bei Atzwang 1142 m. (Peyr. l. c.)!

Auf *Fraxinus Ornus* L. in St. Valentin bei Meran (W. Magnus)!!; bei Matschatsch auf den östlichen Abhängen und auf dem Lannbühel (v. Heufler); bei Eppan (v. Heufler); in den Eislöchern bei Eppan (v. Heufler).

Im Anschlusse gebe ich noch die mir bekannt gewordenen Tiroler Standorte der beiden Parasiten auf *Erysipheen*.

Gattung *Cicinnobolus* Ehrenb.

Cic. Cesatii dBy.

Verbreitet auf verschiedenen *Erysipheen*.

Das *Oidium* auf dem Rosmarinapfel bei Bozen (C. Mach in: *Die Weinlaube*. 1873 S. 210—211.)

Auf *Oidium* auf *Prunus Armeniaca* bei San Michele!!

Auf *Sphaerotheca Castagnei* Lév. auf *Senecio cordatus* im Val Cercena bei Rabbi (F. Stolz)!

Auf *Sphaerotheca Castagnei* Lév. auf *Taraxacum officinale* bei Innsbruck!! — A. G. Eliassohn hat in: *Fungi Upsalienses* (Bihang till K. Svenska Vet. — Akad. Handlingar Bd. 22 Afd. III No. 12. Stockholm 1897) S. 15 einen *Cicinnobolus Taraxaci* n. sp. auf *Oidium erysipheoï-*

des auf *Taraxacum officinale* aufgestellt, genau beschrieben und abgebildet.

Ich muss aber gestehen, dass ich noch nicht die *Cicinnobolen* auf verschiedenen *Erysipheen* verschiedener Wirthspflanzen von einander unterscheiden kann, weshalb ich sie noch als eine Art anführe.

Auf *Sphaerotheca Castagnei* Lév. auf *Arnica montana* im Langenthale in Stubai (F. Stolz)!

Auf *Sphaerotheca Castagnei* Lév. auf *Alchemilla vulgaris* am Heiligen Wasser bei Innsbruck (F. Stolz)!

Auf *Sphaerotheca Castagnei* Lév. auf *Humulus Lupulus* (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 11. Jahrg. 1853. Sp. 595.)

Auf *Erysiphe Martii* Lév. auf *Urtica dioica* in Volderwald bei Hall (F. Stolz)!

Auf *Erysiphe Martii* Lév. auf *Verbascum thapsiforme* zwischen Ponale und Riva am Gardasee!!

Auf *Erysiphe Martii* Lév. auf *Lathyrus pratensis* im Fassa-Thale zwischen Vigo und Cavalese!!

Auf *Erysiphe Umbelliferarum* DBy. auf *Heracleum Sphondylium* am Calvarienberge bei Bozen!!

Auf *Microsphaera Berberidis* (DC.) Lév. bei Meran (Hugo v. Mohl in Bot. Zeitung 1854 Sp. 142).

Auf *Uncinula adunca* Lév. auf *Salix purpurea* zwischen Imst und Starkenberg!!

Auf *Oidium Tuckeri* Berk. (*Uncinula necator* (Schw.) Burr.) in Südtirol (Hugo v. Mohl in Botan. Zeitung 1854 Sp. 144.)

Auf *Phyllactinia suffulta* (Rebent.) Sacc. auf *Corylus Avellana* beim Schlosse Amras bei Innsbruck (F. Stolz)!

Hugo v. Mohl theilt in der Botan. Zeitung 1854 S. 142 mit, dass er in Südtirol die *Cicinnobolus*-Frucht, wie er sie nennt, noch an vielen *Erysipheen* beobachtet hat, so an *Erisiphe Galeopsidis* auf *Salvia glutinosa*, *Erysiphe lamprocarpa* auf *Sonchus oleraceus* und *Plantago major*,

an Erysiphe Martii Lév. auf Trifolium pratense, Erys. communis Fr. auf Ranunculus acris, Brassica oleracea und Cucurbita Pepo, an Erysiphe Umbelliferarum auf Heracleum Sphondylium und an Erysipheen auf Pyrus Malus und Viola tricolor. Letztere Erysiphee kenne ich leider gar nicht und konnte sie daher nicht in der Liste aufführen. H. v. Mohl theilt ausdrücklich mit, dass er nur die Conid. und Cicinnobolusfrüchte von ihr fand, aber keine Peritheecien.

Gattung Naegelia Rabenh.

Naeg. penicillata (Naeg. sub *Schinzia*) Rbh.

Auf den Peritheecien von *Phyllactinia suffulta* (Rebent.) Sacc.

Auf *Corylus Avellana* L. beim Kerschbuchhof 766 m. (Peyr. l. c.)!; bei Lienz!!

Auf *Fraxinus Ornus* L. in St. Valentin bei Meran (W. Magnus)!

Beobachtungen
des meteorologischen Observatoriums

der Universität

Innsbruck.

im Jahre 1898.

Die diesjährigen Beobachtungen werden in etwas ausführlicherer Weise mitgetheilt, um auch die stündlichen Aufzeichnungen der wichtigsten meteorologischen Elemente allgemeiner zugänglich zu machen.

Die gesammten Beobachtungen zerfallen in 2 Abtheilungen:

Abtheilung I. enthält die täglichen Beobachtungen zu den 3 Terminen 7^h, 2^h, 9^h, wie sie von allen Stationen I und II Ordnung in Oesterreich für die meteorologische Centralanstalt in Wien geliefert und in dessen Jahrbuche publiciert werden.

Abtheilung II. enthält die stündlichen Aufzeichnungen des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, des Regenfalles und des Sonnenscheines. Im Anschlusse sind dann die Jahresübersichten über die einzelnen Monatsmittel gegeben.

Die Autogramme wurden stets auf die gleichzeitigen Terminbeobachtungen bezogen und die Abweichungen auf die zwischenliegenden Stundenwerthe vertheilt.

Bezüglich des Luftdruckes wurde auch der tägliche Gang im Monate durch die Bessel'sche Formel dargestellt. Diese Formel hat durch die Untersuchungen von Hofrath Prof. Dr. J. Hann gerade für dieses Element eine solche Bedeutung gewonnen, dass es zweckdienlich erscheint diese Darstellung den Beobachtungen anzuschliessen.

Die Temperaturaufzeichnungen wurden auch zur Bestimmung der Extremwerthe für die Terminbeobachtungen benützt, da der Station kein Maximum- und Minimumthermometer zur Verfügung steht.

Die Aufzeichnungen der relativen Feuchtigkeit wurden nicht auf die Terminbeobachtungen bezogen, da der Hygrograph, mit einem Haarbündel versehen, ziemlich gut controlierbar ist und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkte gewiss verlässlichere Werthe liefert als die Beobachtungen am Psychrometer. Für das Auftreten des Föhn sind diese Aufzeichnungen besonders charakteristisch.

Der stündliche Regenfall wurde auf die 24stündigen directen Messungen bezogen, da das registrierende Ombrometer durch eine längere Rohrleitung und durch seine Situierung am Dachfirste stets geringere Mengen angiebt.

Der Sonnenschein wird besonders in den Wintermonaten, bei niedrigem Sonnenstande mit nebligem Wetter auch etwas in der Dauer verkürzt erscheinen und kann da wenigstens als sichere untere Grenze dienen. Bei Berechnung der wirklichen Sonnenscheindauer in Procenten der möglichen Dauer wurde die Verspätung des Sonnenaufganges und die Verfrühung des Unterganges durch den Einfluss der Berge berücksichtigt. Für Innsbruck ist dies besonders in den Wintermonaten von erheblichem Einflusse und wurde die Berechnung nach der graphischen Methode von Dr. K. Peuker gemacht.

Die Auswertung der sämmtlichen Registrierstreifen hat der Unterfertigte selbst ausgeführt, während die Berechnung der Stunden-, Tages- und Monatsmittel Herr stud. phil. K. Krüse besorgte. Die Originale der Autogramme sind genau geordnet aufbewahrt und werden für wissenschaftliche Arbeiten zur leihweisen Benützung überlassen.

Wenn es gelingt die Beobachtungen in diesem Ausmasse aufrecht zu erhalten und wenn insbesondere die von dem Gefertigten angesuchte wissenschaftliche Hilfskraft von massgebender Seite bewilligt wird, so sind für das nächste Jahr auch die Bearbeitungen der Autogramme des registrierenden Anemometers in Aussicht genommen. Dadurch würde die Publikation erst ihre ganze Vollständigkeit erreicht haben.

Innsbruck, Jänner 1899.

Dr. Paul Czermak

o. ö. Universitäts-Professor
und Leiter des meteorologischen Observatoriums
der Universität.

I.

Tägliche Beobachtungen

um 7^h 2^h 9^h

von Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung,
Wind und Niederschlag im Jahre 1898.

Barometer, Fortin Nr. 259 Seehöhe 575 m.

Thermometer, Höhe über dem Erdboden 1·7 m.

Regenmesser, Höhe über dem Erdboden 0·8 m.

Windrichtung und Geschwindigkeit, Anemometer von Schöffler.

Länge von Gr. 11° 24' E.

Breite 47° 16' N.

Schwerecorrection (Breite und Höhe) + 0·06 mm.

Erklärung der Zeichen:

Regen	☉	Schneegestöber	⊕
Schnee	✱	Gewitter	⚡
Hagel	△	Mondhof	☾
Nebel	≡	Höhenrauch	∞
Reif	⌊	Schneedecke	⊠

Jänner.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	703.2	702.2	704.9	703.4	8.0	10.5	8.9	9.1	11.2	7.5	3.8	4.3	3.6	3.9
2	67.1	68.8	13.1	09.7	4.4	7.1	4.3	5.3	7.7	3.5	3.9	4.6	4.9	4.4
3	18.7	20.5	23.2	20.8	2.4	5.5	-0.6	2.4	5.7	-0.6	5.1	5.8	4.1	5.0
4	21.9	19.8	22.6	21.4	-1.9	4.5	-1.4	0.4	4.9	-2.4	3.7	4.2	3.7	3.9
5	20.3	17.6	17.5	18.5	-3.1	2.0	-1.4	-0.8	2.1	-3.3	3.2	3.7	3.6	3.5
6	16.4	15.5	15.4	15.8	-1.3	4.7	-0.6	0.9	4.8	-3.5	3.8	4.4	3.8	4.0
7	13.4	12.3	14.6	13.4	-1.0	4.9	2.7	2.2	5.6	-2.1	3.9	5.0	5.3	4.7
8	16.1	13.7	13.5	14.4	1.2	5.8	3.2	3.4	5.9	1.1	4.7	5.8	5.4	5.3
9	10.9	10.4	11.3	10.9	3.6	6.6	4.1	4.8	9.6	0.8	4.5	4.6	4.6	4.6
10	14.3	14.4	17.1	15.3	0.5	7.1	1.6	3.1	7.7	-0.6	4.5	4.9	4.6	4.7
11	19.7	21.4	23.7	21.6	1.3	5.7	1.4	2.8	5.9	0.2	4.5	5.0	4.6	4.7
12	26.2	25.5	27.2	26.3	-1.3	5.0	-1.4	0.8	5.4	-1.9	3.8	4.0	3.6	3.8
13	27.2	25.3	24.2	26.3	-4.7	3.5	-2.2	-1.1	3.9	-4.8	2.9	3.0	3.3	3.1
14	25.6	24.7	24.7	24.6	-5.1	5.7	-0.5	0.0	6.6	-5.2	2.7	3.3	3.2	3.1
15	26.0	24.7	25.3	25.3	-4.0	5.8	-1.9	-0.1	6.9	-4.4	2.9	3.8	3.1	3.9
16	26.3	24.0	25.4	25.2	-5.4	5.2	-2.6	-0.9	5.6	-5.6	2.6	3.1	3.1	2.9
17	25.2	23.6	24.0	24.3	-6.1	3.5	-3.2	-2.0	4.3	-6.6	2.5	2.5	3.0	2.6
18	23.6	23.0	24.4	24.3	-7.1	2.9	-3.5	-2.6	4.2	-7.1	2.3	3.1	2.9	2.8
19	26.3	23.7	24.3	24.8	-7.2	3.1	-3.6	-2.6	3.5	-7.5	2.3	2.8	2.6	2.6
20	25.3	23.2	24.8	24.1	-7.7	3.0	-4.0	-2.9	3.8	-7.8	2.2	3.3	2.9	2.8
21	24.8	23.4	21.3	24.2	-8.2	2.8	-3.4	-2.9	3.7	-8.4	2.1	2.9	2.6	2.5
22	23.8	20.8	20.3	21.6	-5.6	5.6	0.9	0.3	6.3	-6.0	2.7	2.9	3.4	3.0
23	21.0	21.7	21.3	21.3	0.6	4.9	1.6	2.4	5.6	-0.1	4.5	5.7	4.9	5.1
24	20.0	18.9	19.2	19.4	1.3	3.0	1.3	1.9	3.4	1.2	4.8	5.6	4.8	4.8
25	20.0	20.3	20.8	20.4	0.6	3.9	2.0	2.1	4.5	0.5	4.5	5.2	4.8	4.8
26	20.9	20.8	20.8	20.8	1.2	5.0	2.8	3.0	5.8	1.1	4.7	5.3	4.8	4.9
27	21.1	21.0	23.1	21.7	-1.8	4.0	-0.2	0.7	4.3	-2.1	3.8	4.0	4.1	4.0
28	25.0	24.7	27.1	25.6	0.4	3.1	-0.2	1.1	3.9	-0.2	3.6	3.8	4.0	3.9
29	27.5	26.1	27.4	27.0	-2.9	5.1	-0.6	0.5	6.1	-3.3	3.1	3.5	3.7	3.5
30	27.0	23.6	22.6	24.1	-3.8	6.9	1.0	1.4	8.1	-4.1	3.2	3.4	4.3	3.6
31	16.2	12.8	16.3	15.1	3.1	10.5	4.4	6.0	16.3	0.5	5.3	4.7	4.8	4.9
M.	20.68	19.59	20.91	20.39	-1.6	5.1	0.3	1.2	5.9	-2.3	3.6	4.1	4.0	3.9

Februar.

1	721.0	719.5	719.0	719.8	1.7	4.8	3.6	3.7	5.4	1.1	4.5	4.5	4.4	4.5
2	15.1	07.3	05.6	09.3	0.4	12.1	8.5	7.0	13.7	-0.1	4.4	5.8	5.8	5.3
3	06.3	05.8	06.4	06.2	2.9	0.8	-1.2	0.8	10.8	-1.3	2.5	4.2	3.5	3.1
4	697.0	691.9	688.4	692.4	-2.5	-0.1	-1.8	-1.5	0.2	-2.6	3.5	4.3	3.7	3.8
5	94.4	97.6	703.8	98.6	-2.4	0.2	-2.7	-1.6	0.9	-2.7	3.6	4.4	3.5	3.8
6	711.6	713.3	13.0	12.6	-4.8	-1.3	-7.3	-4.5	-1.0	-7.6	2.9	3.8	2.2	3.0
7	09.8	07.9	08.8	08.8	-7.6	-1.1	-3.2	-4.0	0.0	-8.2	3.2	3.8	3.2	3.8
8	10.8	11.9	13.1	11.9	-3.4	1.3	-3.2	-1.8	1.7	-5.9	3.4	3.9	3.4	3.7
9	10.9	11.4	13.7	12.0	-3.8	-1.0	-1.3	-2.0	-0.5	-4.2	3.3	4.1	4.0	3.8
10	18.5	20.3	22.1	20.3	-1.7	1.0	-4.6	-1.8	1.8	-4.6	3.8	3.3	3.0	3.4
11	22.6	20.6	21.2	21.5	-11.9	-1.9	-3.9	-5.9	-1.3	-12.1	1.6	3.7	3.1	2.8
12	20.6	20.7	20.9	20.7	-5.2	1.4	-1.5	-1.7	2.0	-5.7	2.9	4.5	3.9	3.8
13	20.9	18.1	18.7	19.2	-9.5	1.2	-4.6	-4.3	1.2	-9.6	2.0	4.6	3.0	3.2
14	17.1	16.0	20.0	17.7	-7.0	2.6	0.2	-1.4	3.3	-7.4	2.4	3.9	4.4	3.6
15	21.7	21.2	20.3	21.1	0.4	4.0	1.3	1.9	4.2	0.2	4.4	5.2	4.8	4.8
16	15.0	14.0	10.3	13.1	1.2	4.9	1.0	2.4	5.4	0.8	4.6	5.5	4.7	4.9
17	06.4	08.3	08.8	07.8	2.0	2.0	-0.4	1.2	6.2	-0.4	5.0	3.9	4.1	4.3
18	06.3	03.6	03.2	04.4	-1.0	0.7	-0.2	-0.2	0.7	-1.0	3.9	4.6	4.4	4.3
19	03.7	04.6	05.1	04.5	-1.1	1.9	-1.1	-0.1	2.0	-1.2	4.0	4.1	3.9	4.0
20	03.8	02.3	02.3	02.8	-6.0	0.6	-4.3	-3.2	1.5	-6.3	2.6	3.8	5.1	3.2
21	01.0	699.1	00.1	00.1	-9.0	3.6	-0.4	-1.9	6.5	-9.7	2.0	3.2	3.5	2.9
22	699.7	99.4	698.3	699.1	-3.0	8.5	8.2	4.6	8.2	-3.2	2.9	3.7	3.6	3.4
23	98.0	99.7	702.2	700.6	3.2	1.6	0.6	1.8	8.2	0.6	5.4	4.8	4.6	4.9
24	705.1	707.7	10.7	07.8	0.6	3.9	-0.6	1.3	4.9	-0.6	4.6	4.9	4.1	4.5
25	14.4	14.1	16.6	15.0	-3.7	2.9	0.0	-0.3	3.5	-3.8	3.2	3.6	4.1	3.7
26	16.5	12.3	14.1	14.9	-4.0	2.5	-0.4	-0.6	4.8	-4.5	3.1	4.7	4.3	4.0
27	16.5	13.4	13.3	14.4	0.0	5.0	0.0	1.7	5.2	-0.5	4.3	4.8	4.3	4.5
28	12.7	11.4	12.2	12.1	-0.6	4.3	1.2	1.6	5.4	-1.2	4.1	4.7	4.7	4.5
M.	10.62	09.76	10.43	10.28	-2.7	2.4	-0.6	-0.3	3.7	-3.6	3.4	4.3	3.9	3.9

Jänner.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke				Nieder-schlag	Anmerkung	
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a			
1	48	45	42	45	7	6	5	6	N	3	S	1	S	3	Föhn
2	62	61	79	67	4	5	10	6	W	3	—	0	W	2	2-7 Nachts ☉
3	93	86	92	90	10	2	0	4	—	0	—	0	W	1	Früh ☉
4	94	66	90	83	4	3	0	2	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
5	89	69	88	82	0	4	2	2	—	0	—	0	—	0	Früh ☉ und ☉
6	92	88	86	82	3	3	0	2	—	0	—	0	—	0	Früh ☉ und ☉
7	92	76	91	87	5	9	10	8	—	0	—	0	—	0	0-2 Früh ☉ Abds. ☉
8	94	85	94	91	10	2	10	7	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
9	77	61	76	72	9	9	3	7	W	4	W	4	W	4	☉ Föhn
10	94	65	89	83	1	1	7	3	—	0	—	0	—	0	
11	89	73	91	84	10	9	0	6	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
12	92	61	88	80	0	1	0	0	S	1	—	0	—	0	Früh ☉ Boden☉
13	90	51	85	75	0	0	0	0	—	0	—	0	S	1	Früh ☉ Boden☉
14	88	48	73	70	0	2	0	1	—	0	—	0	W	1	Früh ☉ Boden☉
15	84	85	78	82	0	1	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉ Boden☉
16	85	47	83	75	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
17	90	42	82	71	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
18	87	54	85	75	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
19	90	50	76	72	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
20	89	57	84	76	0	0	0	0	—	0	—	0	W	1	Früh ☉
21	88	53	74	71	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
22	87	42	68	66	0	1	7	3	—	0	—	0	—	0	1-9 Früh☉Nachts☉
23	94	87	94	91	10	8	10	9	—	0	—	0	—	0	0-4 Früh☉ und ☉
24	94	85	94	91	10	9	3	7	—	0	—	0	—	0	2-5 Nachts ✱
25	94	85	91	90	10	8	10	9	—	0	—	0	—	0	2-4 ☉ Früh☉ u. ☉
26	94	81	86	87	10	8	10	9	—	0	—	0	—	0	Früh dichter ☉
27	94	66	90	83	0	1	9	3	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
28	83	66	89	79	10	2	5	6	—	0	—	0	E	2	Früh ☉
29	91	51	85	77	0	1	0	0	—	0	—	0	—	0	Früh ☉
30	93	45	87	75	0	2	3	2	—	0	—	0	—	0	0-2 Früh☉Nachts☉
31	93	50	77	73	9	10	10	10	—	0	W	4	NE	3	5-9 FrühBoden☉Föhn
M.	87-8	63-4	83-5	78-2	3-9	3-4	3-7	3-7	0-4	0-3	0-6	16-2			

Februar.

1	88	70	75	78	4	10	8	7	—	0	—	0	—	0	Berge ✱
2	92	55	70	72	6	4	8	6	NE	1	—	0	—	0	Föhn
3	44	87	81	71	10	10	6	9	SW	4	—	0	SW	1	3-8 ✱ Sturm
4	92	94	83	91	10	10	10	10	W	3	W	1	W	1	5-9 ✱ Nachts ✱
5	94	94	94	94	10	5	10	8	E	1	E	2	—	0	3-3 ✱ ☉ Bergen ✱
6	90	92	87	90	10	4	0	5	—	0	—	0	W	2	☉ Früh ☉, ☉
7	92	67	91	83	5	10	9	8	—	0	—	0	—	0	2-7 ✱ Fr. ☉ N. ✱
8	93	85	96	91	10	10	4	8	—	0	—	0	—	0	0-4 ✱ Früh ☉, ✱
9	95	96	96	96	10	10	10	10	—	0	—	0	—	0	14-4 ✱ Fr. ☉, ☉, ✱
10	94	66	93	84	10	3	4	6	—	0	NE	1	—	0	☉ Früh ☉
11	89	94	93	92	0	6	10	5	NE	1	—	0	—	0	☉ Früh ☉
12	96	89	94	93	10	9	3	7	—	0	—	0	N	1	☉ Früh ☉, ☉
13	91	92	93	92	2	3	2	2	—	0	—	0	—	0	☉ Früh ☉
14	92	70	92	85	6	7	10	8	—	0	—	0	—	0	4-7 ✱ Früh ☉, ✱
15	92	85	96	91	10	6	10	9	—	0	—	0	—	0	5-6 ✱ ☉ u. ✱ ☉
16	92	84	96	91	6	9	0	5	E	1	—	0	E	1	1-8 ✱ Fr. ☉ M. ☉ Föhn
17	94	73	92	86	10	10	10	10	SW	2	—	0	—	0	31-5 ✱ F. ☉, ✱ N. ✱
18	92	94	96	94	10	10	10	10	—	0	—	0	—	0	3-7 ✱
19	94	78	92	88	10	7	6	8	—	0	—	0	—	0	☉
20	93	78	93	88	4	1	0	2	—	0	—	0	—	0	☉ Früh ☉
21	88	54	79	74	1	3	0	1	SE	1	NW	2	W	2	☉ Fr. ☉ Föhn
22	80	46	44	57	3	4	1	3	W	3	SE	4	E	2	2-4 ✱ Fr. ☉ Föhn☉
23	94	93	96	94	10	10	10	10	S	1	—	0	—	0	GS-7 ✱ ☉ ✱
24	96	80	94	90	10	8	2	7	—	0	—	0	—	0	3-2 ✱ Früh ✱
25	93	64	89	82	2	10	2	5	S	2	—	0	—	0	☉ Früh ☉
26	93	85	96	91	4	3	2	3	—	0	—	0	E	1	Sp ✱ Früh ☉ ✱
27	94	74	92	87	10	2	2	5	—	0	—	0	—	0	☉ Früh ☉
28	94	76	94	88	9	9	6	8	—	0	—	0	—	0	Sp ✱ Früh ☉ ✱
M.	90-4	79-1	89-0	86-2	7-2	6-9	5-5	6-5	0-7	0-3	0-4	183-1			

März.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	712.6	711.0	709.2	710.9	— 0.8	4.8	1.2	1.7	6.2	— 0.8	3.6	3.9	4.2	3.9
2	04.5	05.0	07.5	05.7	— 0.5	3.1	— 1.0	0.5	8.6	— 1.6	3.7	4.5	4.0	4.1
3	07.5	05.7	06.7	06.6	— 3.8	5.7	— 0.8	0.4	6.0	— 5.2	3.2	2.8	3.6	3.2
4	08.0	05.3	04.5	05.9	— 7.8	2.4	0.3	— 1.6	4.4	— 7.7	2.2	1.8	4.1	1.3
5	02.0	01.0	00.6	01.2	2.0	10.6	8.4	7.0	10.7	0.3	4.4	3.3	4.3	4.0
6	01.9	03.0	04.7	03.2	1.3	2.6	1.0	1.6	8.4	1.0	4.0	4.6	4.4	4.3
7	03.3	01.2	699.8	01.4	0.6	2.9	0.4	1.3	3.0	0.4	4.4	4.5	4.4	4.4
8	00.3	02.4	705.5	02.7	— 2.3	13.2	9.3	6.7	13.8	— 2.7	3.6	4.7	4.9	4.4
9	09.4	08.7	09.7	09.3	1.8	10.9	2.4	5.1	11.1	1.8	4.8	5.9	4.9	5.2
10	10.2	08.3	09.2	09.3	0.6	7.3	1.8	3.2	7.4	0.5	4.6	6.0	4.7	5.1
11	09.4	08.6	07.9	08.6	1.6	3.3	1.8	2.2	3.7	1.6	4.8	4.6	4.7	4.7
12	07.4	06.8	08.3	07.5	— 1.5	9.2	2.1	3.3	9.8	— 1.5	3.9	2.5	3.8	3.4
13	10.8	09.1	10.6	10.2	— 2.3	9.3	2.2	3.0	10.4	— 2.4	3.5	4.2	4.9	4.2
14	12.7	11.1	12.2	12.0	— 2.1	9.7	2.8	3.5	10.3	— 2.2	3.6	4.2	4.4	4.1
15	13.8	11.9	12.8	12.8	0.6	11.2	5.3	5.7	11.7	0.0	4.2	4.1	4.9	4.4
16	13.7	11.3	11.3	12.1	1.9	10.9	6.4	6.4	11.0	0.6	4.7	3.8	4.8	4.4
17	12.2	12.9	12.7	12.6	3.0	8.9	5.3	5.7	9.3	3.0	5.4	6.2	6.0	5.9
18	12.3	13.5	14.2	13.3	3.9	5.0	3.8	4.2	5.7	3.9	5.9	6.2	5.7	5.9
19	14.2	10.4	10.4	11.5	3.5	15.2	7.6	8.8	17.4	3.3	5.6	8.1	6.1	6.6
20	10.2	6.9	09.7	08.9	1.0	14.3	6.9	7.4	14.8	0.3	4.2	6.4	6.7	5.8
21	10.5	10.8	12.0	11.1	2.1	4.0	2.0	2.7	6.9	1.9	5.1	5.5	4.9	5.2
22	11.3	09.4	09.2	10.0	1.7	8.9	2.9	4.5	9.9	1.6	4.8	4.8	4.8	4.8
23	06.6	02.4	01.1	03.4	0.0	9.9	4.1	4.7	11.0	— 0.3	4.3	4.3	4.8	4.5
24	696.3	696.0	698.3	696.8	1.0	4.0	0.7	1.9	4.6	0.7	4.7	5.1	4.7	4.8
25	98.5	95.4	95.2	96.4	0.0	3.5	2.0	1.8	4.0	— 0.6	4.3	4.5	5.0	4.6
26	92.5	94.6	95.3	94.1	1.9	8.4	3.1	4.8	8.5	1.6	4.9	2.2	3.4	3.5
27	96.8	96.3	97.2	96.8	— 0.3	8.7	4.4	4.3	9.0	— 0.6	3.7	2.4	3.1	3.1
28	98.1	98.3	701.0	99.1	0.3	10.9	4.2	5.1	11.1	— 0.6	3.9	3.5	4.3	3.9
29	700.4	96.7	694.1	97.1	2.7	14.1	11.3	9.3	14.5	0.0	3.7	4.3	4.4	4.1
30	696.1	98.5	702.7	99.1	4.7	6.7	4.9	5.4	7.9	4.6	5.9	6.2	5.8	6.0
31	704.9	704.4	04.7	704.7	3.0	13.0	10.7	8.9	13.0	2.9	5.1	3.8	4.1	4.3
M.	06.08	05.06	05.74	05.62	0.6	8.2	3.8	4.2	9.2	0.1	4.4	4.6	4.7	4.5

April.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	703.1	699.8	697.9	700.3	4.5	14.5	7.8	8.9	15.7	4.0	4.8	5.6	6.6	5.7
2	694.5	94.5	700.2	696.1	5.7	13.1	4.2	7.7	14.9	5.0	6.4	6.1	5.2	5.9
3	701.5	705.4	09.1	706.4	2.2	7.7	3.7	4.5	9.0	2.0	4.7	4.5	4.6	4.6
4	10.4	08.6	10.3	09.8	1.8	8.1	5.2	5.0	9.1	1.3	4.9	8.3	4.9	4.4
5	10.4	11.8	14.6	12.3	3.5	7.0	4.0	4.8	7.9	2.8	5.3	4.6	4.2	4.7
6	16.8	14.4	16.0	15.7	— 1.0	10.4	5.6	5.0	12.7	— 1.2	3.9	3.9	4.4	4.1
7	19.7	17.8	19.1	18.9	0.0	14.4	7.6	7.3	15.5	— 0.8	4.2	4.0	4.1	4.1
8	21.0	17.7	18.0	18.9	1.2	17.0	8.7	9.0	17.5	0.2	4.5	3.9	5.4	4.6
9	13.7	14.8	14.1	15.9	2.6	18.7	11.1	10.8	20.1	1.5	4.9	4.4	5.6	5.0
10	15.0	13.3	12.0	13.4	8.3	14.7	8.2	10.4	15.1	7.8	6.2	7.9	7.2	7.1
11	11.2	08.7	07.3	09.1	6.3	17.2	9.5	11.0	18.8	5.8	6.7	6.5	4.3	5.8
12	04.4	04.0	07.0	05.1	3.9	15.2	7.8	9.0	15.8	2.7	4.9	4.1	4.2	4.4
13	08.1	09.2	11.6	09.6	4.5	7.5	4.0	5.3	9.5	2.7	4.4	4.0	5.4	4.6
14	15.1	14.0	15.0	14.7	2.9	11.8	4.7	6.5	12.6	2.5	5.2	4.5	5.1	4.9
15	14.4	10.4	11.1	12.0	1.0	16.8	13.2	10.3	17.6	— 0.7	4.3	3.4	3.9	3.9
16	10.5	09.4	09.2	09.7	12.2	16.6	12.1	13.6	17.1	11.4	4.4	5.1	5.4	5.0
17	09.0	07.0	05.5	07.2	7.9	15.2	13.0	12.0	16.7	6.9	5.3	5.5	5.2	5.3
18	00.6	00.6	04.0	01.7	11.4	17.2	12.3	13.6	17.4	8.5	6.0	4.1	5.7	5.3
19	10.0	09.4	12.5	10.6	8.4	18.3	10.3	12.3	18.4	6.6	6.3	5.1	6.6	6.0
20	13.7	11.1	13.7	12.8	5.4	17.4	11.1	11.3	17.7	2.9	5.8	6.8	7.1	6.6
21	14.8	10.8	09.7	11.8	8.2	16.9	12.3	12.5	17.1	7.7	7.6	6.2	7.1	7.0
22	07.4	04.7	04.5	05.5	8.4	13.0	10.2	10.5	13.8	8.4	7.8	7.8	7.5	7.7
23	05.2	05.4	08.6	06.4	8.1	12.9	9.3	10.1	13.7	8.0	7.4	7.5	7.6	7.5
24	19.5	10.4	11.3	10.7	8.6	16.7	11.6	12.3	17.8	8.3	7.4	7.4	8.2	7.7
25	11.6	09.4	10.1	10.4	10.3	19.4	11.7	13.8	20.3	9.4	8.3	8.8	8.5	8.5
26	09.3	05.5	04.8	06.5	7.1	21.3	14.2	14.2	21.7	6.0	7.1	6.5	7.4	7.0
27	04.5	01.5	02.5	02.8	9.1	22.0	14.5	15.2	22.2	8.3	6.8	6.6	8.9	7.4
28	04.3	03.0	04.0	03.8	9.8	22.5	14.4	15.6	23.1	7.8	7.2	7.2	8.0	7.8
29	04.9	03.6	06.3	04.9	10.3	19.2	12.0	13.8	19.8	8.5	8.1	8.6	7.6	8.1
30	11.0	09.8	11.9	10.9	9.8	18.6	12.7	13.7	19.4	8.6	8.1	6.8	7.8	7.6
M.	09.82	08.20	09.40	09.13	6.1	15.4	9.6	10.3	16.3	5.1	6.0	5.7	6.1	5.9

März.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Niederschlag	Anmerkung		
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h			7a	
1	83	61	83	76	8	4	8	7	E 1	—	0	—	0	1-6	☀, ☁, *
2	85	79	94	86	10	10	2	7	W 2	E 2	—	—	0		☀, ☁, *
3	93	41	83	72	4	2	0	2	—	0	SW 3	S 1	1		☀, ☁, *
4	89	87	87	87	0	1	3	1	—	0	E 1	N 1	1		☀, ☁, *
5	84	34	52	57	7	3	5	5	W 3	S 5	S 5	S 2	2		☀, ☁, *
6	80	82	89	84	9	10	10	10	—	0	—	0	SE 1		☀, ☁, *
7	92	79	92	88	10	8	8	9	—	0	—	0	E 1		☀, ☁, *
8	94	41	56	64	2	2	4	3	—	0	SE 2	N 1	1		☀, ☁, *
9	91	61	89	80	8	8	8	8	—	0	—	0	—		☀, ☁, *
10	96	79	90	88	8	7	10	8	—	0	NE 1	NE 1	1		☀, ☁, *
11	93	80	90	88	10	10	4	8	—	0	—	0	—		☀, ☁, *
12	96	29	71	65	3	1	0	1	—	0	SW 2	—	0		☀, ☁, *
13	89	47	91	76	0	0	0	0	—	0	—	0	—		☀, ☁, *
14	92	47	77	72	0	0	0	0	—	0	—	0	—		☀, ☁, *
15	89	41	74	68	7	6	3	5	—	0	NE 1	—	0		☀, ☁, *
16	90	40	66	65	5	7	3	5	—	0	E 1	—	0	6-4	
17	95	73	91	86	10	8	10	9	—	0	—	0	—	5-4	
18	97	95	95	96	10	10	0	7	—	0	—	0	—	26-3	
19	95	63	79	79	9	0	0	3	—	0	—	0	—	Früh ☀	
20	82	53	90	75	0	7	10	6	—	0	E 2	E 1	4-5	Nachts ☀	
21	94	90	93	92	10	10	10	10	—	0	E 2	—	0	4-2	
22	93	57	85	78	10	6	0	5	—	0	—	0	—	☀	
23	94	47	79	73	1	2	0	1	—	0	—	0	—	5-7	
24	96	84	96	92	10	10	10	10	—	0	E 1	—	0	13-7	
25	92	77	94	88	10	10	10	10	—	0	—	0	—	8-1	
26	93	26	59	59	7	5	0	4	SW 2	S 4	SW 1	—	—	☀, ☁, *	
27	88	28	50	54	2	7	1	3	W 2	S 5	W 2	—	—	☀, ☁, *	
28	83	37	70	63	6	4	2	4	E 1	S 4	E 1	—	—	☀, ☁, *	
29	65	36	43	48	8	4	4	5	SW 3	S 4	NE 3	1-2	—	☀, ☁, *	
30	92	84	90	89	10	10	10	10	—	0	NE 1	E 1	4-7	☀, ☁, *	
31	91	34	42	56	3	2	8	4	E 1	S 5	NE 1	—	—	☀, ☁, *	
M.	89-7	58-5	78-7	75-6	6-3	5-6	4-6	5-5	0-5	1-5	0-6	81-8			

April.

1	76	46	83	68	6	8	10	8	—	0	SW 4	NW 1	2-1	☉	
2	94	54	84	77	4	5	10	6	SW 1	SW 2	E 1	3-0	Früh ☐ u. ☉,		
3	84	58	77	73	10	10	8	9	—	0	E 1	—	0	Sp. Berge ✕	
4	93	41	74	69	10	8	8	9	—	0	N 3	—	0	Früh ☐	
5	90	62	69	74	9	7	7	8	—	0	SW 2	—	0	Fr. ☐ Berge ✕	
6	92	42	65	66	1	1	0	1	—	0	—	0	—	Früh ☐	
7	90	33	53	59	0	0	0	0	—	0	SE 1	—	0	Früh ☐	
8	91	27	64	61	0	1	0	0	—	0	—	0	—		
9	89	27	57	58	0	0	0	0	—	0	—	0	—		
10	75	63	89	76	8	8	0	5	SE 2	SE 1	—	—	0	etwas ☉	
11	94	45	48	62	4	3	0	2	—	0	E 1	—	0		
12	80	33	55	56	9	6	4	6	—	0	W 2	N 1	—		
13	70	52	88	70	4	10	10	8	NW 3	NW 3	—	—	0	3-7 Nachm. ☉ Föhn	
14	93	44	79	72	10	2	0	4	E 1	SE 2	—	—	0		
15	87	24	34	48	0	3	0	1	—	0	S 5	S 6	—	Föhn	
16	41	36	52	43	8	5	1	5	S 3	S 5	W 3	—	—	Föhn	
17	67	43	47	52	9	8	1	6	W 3	SE 5	E 2	—	—	Föhn	
18	59	28	53	47	1	3	2	2	NW 2	S 5	W 1	—	—	Föhn u. ☉	
19	77	33	71	60	3	6	2	4	—	0	S 4	—	0	Föhn	
20	86	46	72	68	1	2	9	4	—	0	E 2	W 1	1-3	Nachts ☉	
21	93	44	66	68	10	2	9	7	—	0	E 2	E 1	1-6	☉	
22	94	70	81	82	10	10	10	10	—	0	E 1	—	0	1-9	☉
23	92	68	88	83	10	10	10	10	—	0	NW 1	—	0	0-4	☉
24	89	52	80	74	10	8	9	9	—	0	E 1	—	0		
25	89	52	84	75	8	4	0	4	—	0	SE 1	—	0		
26	94	35	61	63	2	3	0	2	—	0	S 3	—	0	Föhn	
27	79	34	73	62	0	2	0	1	W 1	S 4	—	—	0	Föhn	
28	80	36	74	63	0	4	2	2	SW 2	S 4	—	—	0	Föhn	
29	88	52	73	71	3	5	7	5	—	0	SE 1	W 2	1-8	Nachts ☉	
30	89	43	71	68	6	2	3	4	—	0	SE 1	—	0	Früh ☐	
M.	83-8	44-1	68-8	65-6	5-2	4-9	4-1	4-7	0-6	2-2	0-6	15-8			

Mai.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	9h	9h	Mittel	7h	9h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	9h	9h	M.
1	714.1	710.8	711.0	712.0	9.2	23.0	15.7	16.0	23.9	7.6	7.2	7.1	7.7	7.4
2	11.5	07.7	08.6	09.3	10.5	23.9	19.0	17.8	24.3	8.6	6.5	5.2	6.6	6.1
3	08.3	05.8	06.8	07.0	11.5	21.3	15.8	16.2	21.8	9.6	7.1	6.2	8.9	7.4
4	11.9	11.3	12.2	11.8	9.0	11.7	9.8	10.2	16.2	8.9	8.0	7.8	7.7	7.8
5	14.9	13.4	13.1	13.8	7.9	15.9	11.8	11.9	17.5	6.6	7.3	5.6	7.2	6.7
6	11.0	05.9	08.3	08.4	10.2	17.5	9.1	12.3	18.3	8.9	7.8	7.9	7.9	7.9
7	09.8	11.4	13.7	11.6	6.7	10.4	7.5	8.2	11.4	6.6	5.8	6.3	6.4	6.2
8	14.6	13.2	14.3	14.0	6.8	14.2	9.8	10.3	14.4	5.8	6.5	6.1	6.9	6.5
9	12.9	10.4	10.0	11.1	8.2	17.0	12.0	12.4	17.8	6.6	7.2	6.8	7.6	7.2
10	09.8	07.5	09.5	08.9	10.8	13.6	8.9	11.1	15.2	8.8	8.1	7.2	7.6	7.6
11	06.6	01.5	699.8	02.6	8.5	21.8	17.2	15.8	21.8	7.2	7.5	6.1	6.4	6.7
12	698.2	698.1	99.3	698.5	12.7	10.7	6.3	9.9	17.2	5.9	8.4	6.6	6.6	7.2
13	703.2	705.2	710.2	706.2	3.2	12.5	7.2	7.6	14.1	1.3	5.3	5.5	5.9	5.6
14	14.0	11.4	12.4	12.6	4.9	15.6	12.3	10.9	17.4	3.1	5.6	5.2	5.2	5.3
15	15.2	12.3	12.1	13.4	7.8	21.8	16.2	15.3	22.6	5.2	6.0	5.6	6.3	6.0
16	14.1	10.5	11.7	12.1	9.8	22.9	13.3	15.3	22.9	8.0	8.2	7.7	10.3	8.7
17	10.4	07.4	08.0	08.6	12.5	21.8	14.6	16.3	23.1	10.7	9.3	9.0	8.1	8.8
18	08.4	05.6	05.2	06.4	12.2	22.5	17.9	17.5	22.9	10.0	8.7	6.1	6.5	7.1
19	04.6	03.5	02.1	03.4	16.9	21.7	16.5	18.4	22.9	14.0	7.2	6.9	7.1	7.1
20	01.1	02.8	06.9	03.6	14.5	20.0	15.9	16.8	20.7	12.6	8.3	6.4	4.9	6.5
21	10.9	08.5	09.6	09.7	9.5	22.1	14.0	15.2	22.6	7.8	5.9	7.4	8.9	7.4
22	10.1	07.0	07.9	08.3	10.7	23.3	17.0	17.0	23.9	8.9	7.9	5.2	6.2	6.4
23	07.4	05.9	06.6	06.6	16.0	22.6	16.4	18.3	23.2	13.1	6.9	7.2	5.5	6.5
24	06.9	04.1	06.0	05.7	12.2	21.1	12.5	15.3	21.8	9.2	8.6	8.1	9.1	8.6
25	05.3	03.5	04.3	04.4	11.2	18.8	14.5	14.8	19.7	9.3	8.4	8.3	9.2	8.6
26	05.1	03.7	03.3	05.4	11.2	19.7	11.7	14.2	20.4	9.6	8.7	7.2	9.5	8.5
27	09.6	09.5	10.0	09.7	11.4	16.5	12.2	13.4	18.8	10.5	9.1	8.0	9.3	8.8
28	07.7	05.7	08.1	07.2	11.4	17.1	11.7	13.4	18.0	9.8	8.9	8.5	8.9	8.8
29	08.3	08.7	09.1	08.7	11.2	12.4	9.6	11.1	12.5	10.6	9.3	8.8	8.1	8.7
30	08.2	07.6	07.1	07.6	9.3	12.9	11.2	11.1	15.4	8.6	8.3	8.1	8.8	8.4
31	07.9	06.9	06.8	07.2	9.4	15.5	10.8	11.9	16.7	8.2	8.1	8.6	8.7	8.5
M.	09.11	07.31	08.32	08.25	10.2	18.1	12.9	13.7	19.3	8.4	7.6	7.0	7.6	7.4

Juni.

1	706.6	705.5	710.9	707.7	8.8	18.0	9.4	12.1	19.0	6.5	7.5	8.5	7.4	7.8
2	11.6	11.3	11.1	11.3	9.5	13.5	11.5	11.5	14.5	8.1	7.4	7.5	8.6	7.8
3	13.3	14.6	14.6	14.2	8.6	12.2	8.2	9.7	13.1	7.7	7.7	6.6	7.1	7.1
4	15.5	12.3	13.1	13.6	5.3	18.7	12.2	12.1	20.3	3.1	5.7	6.0	6.8	6.2
5	14.2	10.6	11.2	12.0	9.3	24.0	15.8	16.4	25.4	5.7	7.5	5.6	10.1	7.7
6	13.4	11.2	13.0	12.5	13.0	21.8	15.1	16.6	23.3	12.1	9.3	9.4	11.5	10.1
7	13.6	13.7	14.8	14.0	13.5	19.7	15.4	16.2	22.7	9.8	9.9	10.8	12.6	11.1
8	14.8	12.1	13.0	13.3	11.5	26.0	18.6	18.7	26.9	9.6	9.6	10.3	12.8	10.9
9	14.9	11.8	11.2	12.6	15.5	25.9	17.3	19.6	26.3	14.6	12.0	11.0	13.5	12.2
10	11.5	09.3	10.0	10.3	15.8	21.3	15.1	17.4	22.5	14.3	12.4	11.6	12.4	12.1
11	09.6	09.2	10.9	09.9	14.5	17.5	16.0	16.0	23.3	13.8	11.5	10.6	12.8	11.6
12	12.1	13.1	14.4	13.2	16.2	19.3	12.5	16.0	20.7	12.5	11.4	10.4	9.4	10.4
13	15.0	11.6	12.1	12.9	11.9	24.2	18.4	18.2	25.1	9.4	8.8	7.7	10.5	9.0
14	14.8	10.1	10.7	11.9	14.2	21.6	14.6	16.8	22.7	12.9	10.0	10.8	11.8	10.9
15	08.1	08.8	08.0	08.3	13.8	13.6	10.9	12.8	15.2	10.9	11.1	10.5	9.1	10.2
16	05.6	07.7	10.0	07.8	8.9	10.6	8.5	9.3	12.8	8.5	8.0	7.6	7.8	7.8
17	12.2	13.7	14.5	13.5	10.2	16.7	12.4	13.1	17.5	8.1	8.4	7.2	8.9	8.2
18	17.0	15.9	16.1	16.2	9.3	20.5	13.9	14.6	21.3	6.4	7.4	13.8	9.3	10.2
19	16.2	12.1	13.3	13.9	10.7	22.5	17.1	16.8	24.3	7.9	8.0	5.9	9.5	7.8
20	13.6	12.7	14.7	13.7	14.5	20.7	15.9	17.0	22.0	13.0	10.9	9.5	11.2	10.5
21	14.8	11.0	10.5	12.1	14.2	28.1	19.6	20.6	29.1	12.2	10.2	8.6	12.5	10.4
22	11.1	08.6	10.2	10.0	17.4	27.4	18.2	21.0	29.0	14.5	11.6	12.8	12.2	12.2
23	09.5	08.2	13.0	10.2	15.6	21.0	13.0	16.5	22.8	14.9	12.3	12.3	10.4	11.7
24	14.9	10.5	09.1	11.5	12.8	20.6	16.6	16.7	22.7	10.0	8.8	8.6	11.0	9.5
25	09.9	06.3	06.9	07.7	13.6	25.4	18.3	19.1	25.5	11.3	8.6	5.3	12.4	8.8
26	05.3	02.6	08.4	05.4	16.4	23.4	10.9	16.9	24.0	10.9	11.2	9.0	9.0	9.7
27	08.4	05.4	06.5	06.8	9.8	17.3	13.5	13.5	17.4	8.9	8.1	9.5	10.5	9.4
28	11.1	09.4	12.3	10.9	11.4	17.7	12.1	13.7	18.0	9.0	8.8	9.4	9.8	9.3
29	14.3	11.5	14.4	13.4	10.0	21.0	11.8	14.3	21.5	8.3	8.1	8.6	8.6	8.4
30	17.8	16.7	18.4	17.6	11.0	20.5	16.2	15.9	20.9	10.2	9.0	8.1	7.9	8.3
M.	12.36	10.58	11.91	11.61	12.2	20.4	14.3	15.6	21.7	10.2	9.4	9.1	10.2	9.6

Mai.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Niederschlag	Anmerkung
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a	
1	83	35	58	59	0	3	0	1	—	0	—	0	
2	69	24	40	44	0	1	0	0	W	1	S	5	
3	70	33	66	56	2	7	7	5	W	3	S	6	Föhn
4	93	76	86	85	10	10	10	10	—	0	—	0	Föhn tagsüber
5	92	42	71	68	3	3	8	5	—	0	E	1	
6	84	53	92	76	10	9	10	10	—	0	—	0	
7	80	68	83	77	10	10	10	10	NW	1	NE	2	Sturm
8	88	51	76	72	8	10	8	9	—	0	E	1	Berge Neu
9	89	47	73	70	9	7	10	9	—	0	SW	1	ab und zu
10	84	62	89	78	6	10	10	9	—	0	E	3	etwas
11	91	31	44	55	9	4	3	5	—	0	S	5	etwas
12	77	70	93	80	8	10	10	9	E	3	SE	3	Früh Föhn
13	92	51	77	73	9	5	4	6	—	0	NE	1	kalter Wind
14	86	39	49	58	1	0	3	1	—	0	—	0	Früh Neu
15	76	29	46	50	8	2	0	3	—	0	S	3	
16	91	38	91	73	0	2	7	3	—	0	E	2	
17	87	46	65	66	4	5	6	5	—	0	E	2	
18	83	30	42	52	2	2	4	3	—	0	S	4	Föhn
19	51	36	51	46	7	7	8	7	S	1	S	4	Föhn
20	68	37	37	47	7	5	2	5	NW	1	S	5	Föhn
21	66	38	75	60	0	2	1	1	—	0	E	2	
22	83	25	43	50	0	2	4	2	E	1	S	4	Föhn
23	51	36	40	42	4	5	1	3	S	3	S	5	Föhn
24	82	44	86	71	1	6	8	5	—	0	E	2	
25	85	51	75	70	5	6	8	6	—	0	SE	1	
26	88	43	94	75	2	7	10	6	W	1	W	2	
27	91	57	89	79	10	10	10	10	—	0	E	2	
28	89	59	87	78	9	9	10	9	—	0	E	2	
29	94	83	91	89	9	10	10	10	—	0	—	0	
30	95	74	89	86	10	8	7	8	—	0	E	1	
31	92	65	90	82	10	7	3	7	—	0	E	2	
M.	82.3	47.5	70.6	66.8	5.6	5.9	6.2	5.9	0.5	2.3	0.9	59.2	

Juni.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Niederschlag	Anmerkung
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a	
1	89	56	86	77	10	6	10	9	—	0	E	4	
2	86	65	86	79	10	10	8	9	—	0	E	1	
3	92	63	88	81	10	4	2	5	—	0	—	0	
4	86	37	64	62	0	0	0	0	—	0	SE	1	Früh tagsüber
5	87	25	76	63	1	2	0	1	W	1	—	0	Berge Neu
6	85	48	90	74	9	6	3	6	—	0	SE	1	Boden
7	87	63	97	82	7	7	7	7	—	0	—	0	
8	96	42	81	78	10	5	7	7	—	0	E	3	
9	91	45	92	76	6	6	7	6	W	1	NE	1	Früh
10	92	62	97	84	9	8	10	9	—	0	NW	2	etwas
11	94	71	95	87	10	10	10	10	—	0	NE	2	
12	83	62	88	78	5	7	1	4	—	0	W	1	
13	85	33	66	61	1	2	0	1	NW	1	N	1	
14	84	57	96	79	8	8	10	9	—	0	SE	2	
15	95	92	94	94	10	10	10	10	—	0	—	0	
16	95	80	94	90	10	10	10	10	—	0	—	0	
17	91	51	85	76	10	9	10	10	—	0	—	0	
18	86	77	79	81	3	6	2	4	—	0	SE	1	
19	84	29	65	59	3	5	7	5	—	0	N	2	
20	90	52	83	75	8	8	7	8	—	0	NE	3	
21	85	31	74	63	1	2	0	1	—	0	—	0	
22	79	47	78	68	0	6	3	3	SW	1	E	2	
23	93	67	94	85	9	8	10	9	W	1	NE	3	
24	81	47	78	69	9	2	1	4	—	0	E	1	
25	74	22	80	59	7	3	6	5	—	0	E	1	
26	82	42	93	72	5	7	10	7	—	0	SE	2	
27	89	65	91	82	1	7	1	3	—	0	E	1	
28	88	62	94	81	7	8	10	8	—	0	E	2	
29	88	47	84	73	1	3	10	5	—	0	E	2	
30	92	45	58	65	9	4	6	6	—	0	—	0	
M.	87.6	52.8	84.2	74.9	6.3	6.0	5.9	6.1	0.2	1.3	0.2	172.0	

Juli.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	719.3	716.4	716.1	717.1	10.4	22.5	17.0	16.6	23.3	8.6	7.4	8.7	11.3	9.1
2	15.1	12.1	14.8	14.1	15.8	24.6	16.0	18.8	24.7	13.3	10.5	10.7	12.8	11.3
3	13.3	10.8	12.9	12.3	14.3	21.7	15.7	17.2	23.0	12.5	10.6	10.5	11.8	11.0
4	11.9	09.1	12.2	11.1	15.3	19.7	14.6	16.5	22.9	14.3	11.3	10.5	11.8	11.2
5	15.0	15.5	16.0	15.5	11.1	15.5	11.7	12.8	16.1	11.0	9.0	8.3	8.1	8.5
6	17.1	16.5	17.7	17.1	10.2	15.5	11.7	12.5	15.5	8.9	8.1	7.3	9.0	8.1
7	17.6	15.7	14.8	16.0	10.0	19.0	14.6	14.5	19.4	8.8	8.3	7.0	9.9	8.4
8	12.4	11.9	12.6	12.3	12.5	14.2	11.8	12.8	14.9	11.8	9.6	11.1	9.6	10.1
9	11.7	12.3	13.4	12.5	11.0	14.8	12.1	12.6	16.1	10.1	9.2	8.8	9.1	9.0
10	13.9	11.9	13.0	12.9	10.3	20.9	15.2	15.5	21.3	9.2	8.5	8.4	9.3	8.7
11	13.7	11.5	13.2	12.8	11.0	22.3	15.9	16.4	22.9	9.3	8.6	8.8	9.7	9.1
12	14.4	13.6	13.3	13.8	13.3	18.8	15.1	15.7	19.8	12.4	10.2	10.8	12.1	11.0
13	11.5	07.7	05.4	08.2	14.1	20.2	16.3	16.9	21.8	14.0	11.6	11.4	11.3	11.4
14	07.9	11.7	15.0	11.5	12.0	16.5	11.1	13.2	16.7	11.1	9.9	7.2	8.0	8.4
15	17.7	15.0	16.3	16.3	2.3	20.9	14.9	15.0	22.5	7.1	7.3	7.7	9.6	8.2
16	17.5	15.4	14.3	15.7	10.7	24.4	16.7	17.3	25.2	8.9	8.5	7.5	11.1	9.0
17	15.4	12.0	13.0	13.5	12.7	27.0	20.0	19.9	28.5	10.8	9.6	11.0	11.7	10.8
18	13.5	12.2	12.5	12.7	15.6	28.2	19.4	21.1	28.5	13.8	11.2	12.4	14.2	12.6
19	13.7	10.1	10.4	11.4	15.0	31.8	20.8	22.4	32.1	13.5	11.2	8.0	10.9	10.0
20	11.9	10.1	11.7	11.2	16.1	23.4	16.5	18.6	23.5	15.3	12.6	11.9	13.2	12.6
21	14.4	13.7	15.3	14.5	14.6	21.7	15.6	17.3	21.8	13.8	11.0	9.8	10.5	10.4
22	15.9	12.6	12.6	13.7	12.5	26.0	18.2	18.9	26.2	11.1	9.5	10.0	12.8	10.8
23	12.2	07.4	11.2	10.2	15.2	28.0	16.3	19.8	28.9	12.7	11.5	12.5	12.9	12.3
24	12.7	10.9	12.1	11.9	15.0	24.0	18.8	19.3	25.6	14.3	11.7	11.7	11.0	11.5
25	14.4	12.2	13.9	13.5	15.1	25.9	17.6	19.5	26.5	13.1	11.1	10.8	12.3	11.4
26	15.7	14.1	14.9	14.9	15.4	26.2	18.6	20.1	26.4	12.9	11.0	11.3	11.9	11.4
27	14.6	09.8	12.3	12.2	14.2	26.2	16.4	18.9	28.8	12.2	10.7	11.3	11.6	11.2
28	11.9	09.1	10.2	10.4	14.8	22.4	15.6	17.6	25.0	13.5	11.4	9.3	12.3	11.0
29	10.0	05.8	10.7	08.8	15.1	22.8	11.4	16.4	23.8	11.4	11.1	9.6	9.2	9.9
30	10.5	09.0	11.7	10.4	11.4	19.0	13.2	14.5	20.4	10.7	8.9	9.0	8.7	8.9
31	15.1	14.6	15.2	15.0	12.1	18.7	13.8	14.9	20.3	10.7	9.4	8.6	9.9	9.3
M.	13.94	11.96	13.18	13.03	13.1	22.0	15.6	16.9	23.0	11.7	10.0	9.7	10.9	10.2

August.

1	715.8	712.3	713.4	713.8	12.2	23.2	16.5	17.3	23.9	11.3	9.6	9.1	11.8	10.2
2	15.1	12.5	13.2	13.6	11.8	25.6	18.0	18.5	25.9	10.8	9.6	10.2	12.7	10.8
3	15.0	12.2	13.9	13.7	13.7	26.6	17.3	19.2	28.0	12.2	10.6	12.0	11.3	11.3
4	14.2	14.4	16.8	15.1	13.8	20.0	15.6	19.8	22.4	12.2	10.7	11.5	12.1	11.4
5	18.0	16.0	16.5	16.8	14.2	23.8	16.7	18.2	24.3	12.2	10.7	8.3	12.0	10.3
6	16.4	12.2	12.7	13.8	12.8	26.6	20.0	19.8	29.0	11.7	10.1	12.3	13.7	12.0
7	14.0	10.2	09.0	11.1	15.4	29.0	26.6	23.7	29.7	13.9	11.8	12.4	13.3	12.5
8	10.5	06.3	04.8	07.1	16.8	28.0	24.6	23.1	28.5	16.3	11.2	10.2	9.2	10.2
9	09.7	12.3	14.5	12.2	11.7	11.4	9.6	10.9	24.6	8.0	9.8	7.2	8.2	8.4
10	17.7	17.8	19.1	18.2	10.0	16.7	11.2	12.6	16.8	9.3	8.6	8.0	8.4	8.3
11	20.3	18.8	18.7	19.3	9.5	19.5	13.5	14.2	20.0	8.5	7.4	6.4	9.3	7.7
12	18.6	14.5	14.5	15.9	11.2	23.0	16.8	17.0	23.7	10.6	8.3	9.9	12.6	10.3
13	15.8	13.5	14.6	14.6	13.0	26.4	19.2	19.5	27.7	11.5	9.2	13.5	13.7	12.1
14	15.7	12.6	13.7	14.0	14.4	27.3	16.3	19.3	27.7	13.4	11.4	12.9	12.9	12.4
15	14.0	11.4	13.2	12.8	13.8	27.2	21.1	20.7	27.9	11.9	10.4	12.1	11.0	11.2
16	14.4	12.3	13.0	13.2	14.6	28.0	21.4	21.3	29.0	13.3	10.7	11.8	14.1	12.2
17	15.2	13.0	14.3	14.2	15.7	28.2	19.9	21.3	29.0	14.5	11.8	12.4	13.3	12.5
18	16.4	14.6	14.4	15.1	14.9	21.2	19.4	18.5	26.3	14.5	11.9	16.6	12.9	13.8
19	16.2	14.4	15.8	15.5	15.0	28.0	19.4	20.8	30.0	13.9	11.3	13.0	15.6	13.3
20	17.3	14.9	15.5	15.9	15.0	28.2	21.0	21.4	29.5	14.0	11.3	12.4	14.5	12.8
21	17.4	15.4	16.2	16.3	15.9	28.0	20.3	21.4	29.1	14.9	11.7	13.7	14.4	13.3
22	18.1	15.7	16.0	16.6	15.0	28.0	20.9	21.3	29.1	14.3	11.6	13.0	12.8	12.4
23	16.7	13.1	19.5	16.4	14.4	26.3	18.2	20.6	30.6	14.0	10.8	12.2	12.3	11.8
24	16.2	14.5	15.1	15.3	15.7	20.1	16.7	17.6	21.9	15.2	12.4	13.9	13.6	13.3
25	14.7	14.3	14.3	14.4	15.3	17.8	16.3	16.5	18.2	15.0	12.5	12.7	13.2	12.8
26	15.2	14.3	14.5	14.7	16.0	22.9	16.8	18.6	22.9	15.4	12.7	12.4	13.0	12.7
27	15.8	13.7	14.6	14.7	12.6	23.8	18.4	18.3	25.6	11.9	10.3	12.6	14.0	12.3
28	14.3	10.7	12.6	12.5	14.7	23.8	16.0	18.1	25.0	14.5	11.8	12.6	13.1	12.5
29	13.7	14.3	15.4	14.5	13.7	18.6	12.6	14.9	19.1	13.6	10.7	8.6	9.7	9.7
30	15.6	13.2	14.3	14.3	9.0	18.7	15.2	14.3	20.5	8.4	7.5	9.2	10.9	9.2
31	15.6	12.3	12.5	13.5	11.3	23.6	19.4	18.1	24.4	9.2	8.9	11.5	10.0	10.1
M.	15.59	13.48	14.40	14.49	14.0	24.0	17.9	18.6	25.5	12.6	10.6	11.4	12.3	11.4

Juli.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Nieder- schlag	Anmerkung
	7h	9h	2h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a	
1	78	43	79	66	0	6	4	3	—	0	0	—	0
2	79	47	95	74	2	6	10	6	—	0	SE 1	—	0
3	88	54	89	77	4	7	9	7	—	0	SW 1	E 1	3·7
4	87	61	96	81	3	8	10	7	—	0	W 1	—	0
5	91	63	79	78	10	9	9	9	—	0	—	0	16·9
6	87	56	88	77	8	9	10	9	—	0	—	0	0
7	91	43	81	72	5	5	7	6	—	0	E 1	—	0
8	90	93	94	92	10	10	10	10	—	0	—	0	0
9	94	70	88	84	10	8	7	8	—	0	E 1	—	0
10	92	46	72	70	5	4	5	5	—	0	E 1	—	0
11	87	44	72	68	3	5	9	6	—	0	E 1	—	0
12	90	67	94	84	8	9	10	9	—	0	NE 1	—	0
13	97	65	82	81	10	10	8	9	—	0	E 3	—	0
14	96	52	81	76	10	9	8	9	—	0	W 1	—	0
15	84	42	76	67	3	4	2	3	—	0	—	0	1·9
16	90	33	78	67	0	0	0	0	S 1	E 1	—	0	0
17	89	41	67	66	0	3	4	2	S 2	E 2	—	0	0
18	85	43	85	71	0	4	0	1	—	0	E 2	—	0
19	88	23	60	57	0	3	7	3	—	0	SW 2	NW 2	Sp
20	92	56	95	81	8	7	8	8	—	0	NW 1	—	0
21	89	51	80	73	9	4	0	4	—	0	E 2	—	0
22	89	41	82	71	3	3	0	2	—	0	E 2	—	0
23	89	44	94	76	0	7	7	5	—	0	—	0	0
24	92	53	68	71	10	2	0	4	—	0	—	0	3·9
25	87	44	82	71	2	3	1	2	—	0	SE 2	—	0
26	85	45	75	68	2	4	1	2	—	0	E 1	—	0
27	90	45	83	73	1	6	2	3	—	0	N 5	—	0
28	91	47	93	77	7	8	10	8	—	0	W 3	—	0
29	87	49	92	76	10	6	10	8	W 1	SW 1	E 1	7·9	22·4
30	89	55	77	74	6	5	8	6	—	0	NE 1	—	0
31	90	54	85	76	8	5	4	6	—	0	E 2	—	0
M.	88·8	50·6	82·6	74·0	5·1	5·8	5·8	5·5	0·1	1·3	0·2	114·2	

August.

1	91	43	84	73	1	2	1	1	—	0	E 2	—	0	Früh ∞
2	94	43	78	72	0	3	0	1	—	0	E 2	—	0	Früh ∞
3	92	47	77	72	0	4	6	3	—	0	E 1	W 2	2	Früh ∞
4	92	66	92	83	1	4	10	5	—	0	NE 1	—	0	2·8
5	90	37	84	70	8	4	0	4	—	0	E 2	—	0	Früh ∞
6	93	17	78	73	0	2	1	1	—	0	E 1	—	0	Früh ∞
7	90	42	52	61	0	1	4	2	—	0	E 2	SE 2	2	Früh ∞
8	78	36	40	51	0	3	6	3	—	0	SE 3	S 4	32·9	stürm., Nachts
9	96	72	92	87	10	6	10	9	—	0	—	0	0	43·1
10	91	56	85	78	7	6	6	6	—	0	E 2	—	0	1·3
11	84	38	81	68	6	3	2	4	SW 1	E 2	—	0	0	Früh ∞
12	84	47	89	73	0	1	0	0	—	0	E 2	—	0	0
13	83	53	83	73	0	3	0	1	—	0	E 1	—	0	0
14	94	48	94	78	0	2	0	1	—	0	E 2	—	0	0
15	90	44	60	65	0	4	4	3	—	0	E 2	SW 1	1	0
16	87	42	74	68	0	3	3	2	—	0	SE 2	E 1	1	0
17	89	43	77	69	2	4	2	3	—	0	E 2	—	0	0
18	94	39	77	87	4	7	0	4	—	0	SE 1	—	0	0
19	89	46	93	76	0	2	1	1	—	0	—	0	0	0·7
20	89	43	81	71	0	2	3	2	—	0	—	0	0	0
21	87	49	82	73	0	4	1	2	—	0	E 2	—	0	0
22	91	46	70	69	0	3	0	1	—	0	E 1	—	0	0
23	90	40	79	70	0	2	10	4	—	0	SE 1	SW 5	23·5	Platz ∞
24	93	78	96	89	10	8	10	9	—	0	SW 1	—	0	9·3
25	97	84	96	92	10	10	10	10	—	0	—	0	0	2·3
26	93	60	92	82	8	7	0	5	—	0	E 1	—	0	0
27	96	58	89	81	0	7	9	5	—	0	—	0	0	Sp
28	94	58	97	83	6	6	10	7	—	0	E 1	—	0	31·3
29	93	54	90	79	10	6	4	7	—	0	E 3	—	0	0
30	83	61	85	78	3	7	5	5	—	0	—	0	0	0
31	89	52	60	67	3	3	8	5	—	0	E 1	W 2	4·7	Früh ∞
M.	90·5	52·3	80·9	74·5	2·9	4·1	4·0	3·7	0·0	1·3	0·5	151·9		

September.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	716.7	717.1	718.7	717.5	12.9	18.7	13.0	14.9	18.8	12.4	9.3	9.5	9.0	9.3
2	20.8	19.0	19.9	19.9	10.1	18.4	12.3	13.6	19.4	9.9	7.9	8.4	9.1	8.5
3	21.9	20.0	21.0	21.0	9.1	21.3	15.6	15.3	21.8	7.8	7.9	8.9	10.2	9.0
4	21.7	19.2	19.8	20.2	11.7	21.7	17.3	16.9	23.1	11.2	9.0	10.5	13.2	10.9
5	20.0	17.4	18.0	18.5	14.7	23.8	16.4	18.3	24.2	13.0	11.3	12.8	12.6	12.2
6	18.4	16.2	16.2	16.9	14.3	24.4	16.9	18.5	25.2	12.5	11.2	12.4	11.7	11.8
7	17.3	15.2	16.2	16.2	11.8	25.0	16.3	17.7	25.3	11.2	9.7	11.7	11.3	10.9
8	17.9	15.3	16.0	16.4	11.6	25.0	16.7	17.8	25.6	10.1	9.1	13.3	11.7	11.4
9	16.6	13.5	13.9	14.7	11.4	25.0	17.3	17.9	26.2	10.5	9.1	18.4	12.3	13.2
10	16.2	14.3	15.4	15.3	12.5	25.0	17.5	18.3	27.4	11.7	9.8	11.7	10.3	10.6
11	17.6	14.2	16.5	16.1	10.6	25.4	16.4	17.5	25.8	10.5	8.1	10.2	12.1	10.1
12	14.8	11.3	13.5	13.2	13.3	23.6	16.4	17.8	24.9	12.5	9.9	17.4	12.1	13.1
13	14.1	13.7	15.7	14.5	12.0	19.5	15.4	15.6	21.5	11.3	9.4	10.8	11.9	10.7
14	18.8	18.4	20.3	19.2	14.1	19.7	13.5	15.8	20.1	13.5	11.6	14.5	10.7	12.3
15	22.2	20.5	21.4	21.4	9.4	20.3	13.5	14.4	21.0	8.6	8.1	9.9	10.3	9.4
16	22.2	19.7	19.0	20.3	8.5	20.8	14.7	14.7	22.3	8.3	7.8	10.6	9.9	9.4
17	19.0	16.0	16.1	17.0	9.2	22.9	15.0	15.7	23.6	8.5	8.1	11.4	11.2	10.2
18	17.0	13.8	13.7	14.8	10.1	24.0	16.5	16.9	24.3	8.7	8.7	11.2	11.8	10.6
19	16.2	15.7	17.1	16.3	12.2	18.4	13.8	14.8	19.4	11.5	9.8	11.6	10.2	10.5
20	16.6	14.3	15.3	15.4	13.0	19.5	12.0	14.8	19.7	12.0	9.9	8.6	9.2	9.2
21	16.5	12.8	13.3	14.2	7.5	19.9	12.3	13.2	20.8	6.6	7.2	8.3	8.6	8.0
22	14.2	12.0	12.8	13.0	8.5	21.3	13.4	14.4	22.0	7.6	7.5	13.3	9.6	10.1
23	13.3	10.7	12.6	12.2	7.3	19.3	11.0	12.5	19.3	7.1	7.1	14.1	8.9	10.0
24	11.4	08.3	09.5	09.7	9.0	16.1	10.4	11.8	16.4	8.9	7.6	11.2	6.6	8.5
25	09.9	08.7	11.0	09.9	7.5	15.5	8.0	10.3	15.8	6.7	6.9	6.2	7.6	6.9
26	11.9	10.3	11.0	11.1	2.1	15.6	8.1	8.6	16.1	2.0	5.0	7.0	7.3	6.4
27	11.3	08.8	08.3	09.2	4.1	20.5	11.4	12.0	21.2	4.0	5.7	11.7	9.1	8.8
28	07.2	07.3	09.3	07.9	10.1	13.0	10.7	11.3	13.4	9.0	8.3	10.5	9.2	9.3
29	10.5	11.0	10.7	10.7	10.5	12.5	9.7	10.9	13.3	10.4	9.2	9.5	8.6	9.1
30	07.9	05.3	06.0	06.4	9.2	15.2	11.6	12.0	16.1	9.2	8.2	8.9	9.2	8.8
M.	16.01	13.97	14.94	14.97	10.3	20.4	13.8	14.8	21.1	9.6	8.6	11.2	10.2	10.0

October.

1	709.0	709.7	712.6	710.4	11.3	17.5	12.0	13.6	17.8	11.0	9.4	9.4	9.4	9.4
2	14.1	12.7	13.8	13.5	11.9	18.6	13.7	14.7	19.0	10.5	9.6	9.9	10.6	10.0
3	15.7	14.2	15.3	15.1	12.2	20.8	13.3	15.4	21.8	11.1	9.3	8.7	10.6	9.5
4	17.0	15.0	17.0	16.3	8.1	21.6	12.0	13.9	22.0	7.9	7.7	8.5	9.8	8.7
5	18.3	15.2	16.4	16.6	7.2	19.7	12.0	13.0	20.3	6.8	7.3	14.2	9.1	10.4
6	16.0	11.3	11.5	12.9	8.2	19.8	12.3	13.4	20.8	8.0	7.3	10.3	9.9	9.2
7	11.0	09.6	09.7	10.1	11.3	14.1	12.0	12.5	14.2	10.1	9.4	9.6	9.3	9.4
8	09.6	08.0	08.9	08.8	10.8	16.8	10.6	12.7	17.7	10.6	8.8	9.3	8.7	8.9
9	11.1	11.1	12.7	11.6	8.6	14.0	10.4	11.0	14.5	8.0	7.7	9.9	8.9	8.8
10	14.8	14.3	15.0	14.7	8.5	13.6	7.4	9.8	17.3	7.4	7.7	7.1	7.0	7.3
11	12.9	09.7	07.6	10.1	5.7	13.5	9.4	9.5	13.5	4.8	6.3	7.8	7.9	7.3
12	05.6	07.3	08.1	07.0	9.2	5.3	2.1	5.5	10.3	2.0	7.5	5.9	5.2	6.2
13	08.1	08.0	09.2	08.4	1.8	9.2	5.7	5.6	9.8	1.4	5.0	7.5	6.3	6.2
14	09.4	06.4	04.4	06.7	5.3	10.8	5.8	7.3	12.1	5.2	5.9	6.4	5.7	6.0
15	699.4	697.0	696.9	697.8	6.0	11.8	8.7	8.8	12.2	4.2	6.6	7.4	6.8	6.9
16	95.6	95.8	98.4	96.6	6.0	15.6	9.2	10.3	15.9	5.6	6.4	7.8	7.6	7.3
17	97.2	92.3	95.7	95.1	4.6	15.0	9.4	9.6	16.5	4.3	5.9	7.7	7.9	7.2
18	700.1	97.5	97.6	98.4	5.4	15.5	13.8	11.6	16.0	5.2	6.4	6.9	6.2	6.5
19	00.5	700.3	701.0	700.6	6.0	11.0	9.2	8.7	11.4	5.8	6.6	8.1	8.3	7.6
20	04.7	07.7	11.1	07.8	9.7	12.1	8.6	10.1	12.6	3.6	8.6	8.3	7.7	8.2
21	13.0	11.7	14.0	12.9	6.4	13.0	8.6	9.3	13.1	6.1	6.9	6.7	8.1	7.2
22	15.9	16.5	19.1	17.2	8.4	15.2	11.1	11.6	15.3	8.3	7.9	10.1	9.5	9.2
23	20.5	18.4	18.7	19.2	9.7	15.2	8.6	11.2	15.8	8.6	7.9	9.0	8.1	8.3
24	18.5	14.3	15.7	16.2	4.3	14.8	7.2	8.7	15.9	3.7	5.9	7.9	7.1	7.0
25	16.6	14.1	17.0	15.9	4.6	13.5	9.2	9.1	13.7	3.4	5.9	7.8	8.3	7.3
26	18.1	17.6	18.1	17.9	7.2	13.0	7.0	9.1	13.4	7.0	7.0	7.8	7.2	7.3
27	17.9	15.7	16.7	16.8	4.2	13.8	7.9	8.6	14.5	3.7	5.9	8.2	7.8	7.3
28	16.5	13.4	13.8	14.6	3.0	15.0	7.9	8.6	15.4	2.8	5.5	8.4	7.5	7.2
29	14.7	11.2	12.2	12.7	3.3	15.1	7.5	8.6	15.7	3.3	5.6	7.7	7.2	6.8
30	09.0	07.4	09.1	08.5	6.0	17.3	11.2	11.5	17.6	5.3	5.9	6.0	7.0	6.3
31	09.3	07.8	09.0	08.7	7.3	18.1	10.2	11.8	18.4	7.1	6.5	6.6	7.4	6.8
M.	10.97	09.39	10.05	10.30	7.2	14.9	9.5	10.5	15.8	6.4	7.1	8.3	8.0	7.8

September.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Niederschlag	Anmerkung
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a	
1	85	59	81	75	9	4	5	6	E 2	NE 3	— 0	Sp	Früh —
2	86	54	87	76	7	3	0	3	NE 1	E 1	— 0		Früh —
3	92	47	77	72	1	2	2	2	— 0	E 1	— 0		Früh —
4	88	54	90	77	0	2	9	4	— 0	SE 1	— 0		
5	91	59	91	80	7	2	0	3	E 1	E 2	— 0		Früh ∞
6	93	55	82	77	6	2	1	3	— 0	E 1	SE 1		Früh —
7	95	50	82	76	0	1	0	0	— 0	SE 2	S 1		
8	89	57	82	76	0	0	0	0	— 0	SE 1	— 0		
9	91	73	84	84	0	0	0	0	— 0	SE 1	— 0		
10	91	50	69	70	1	5	0	2	— 0	NE 1	S 1		Früh ∞
11	85	43	87	72	4	5	10	6	— 0	S 1	S 1	4.2	Früh — Abends 1/2
12	88	81	87	85	5	4	7	5	W 1	S 1	N 1	12.0	1/2
13	91	64	91	82	3	9	10	8	S 1	SW 3	E 1	1.3	Früh —, ⊙
14	97	85	94	92	10	5	0	5	— 0	SE 1	— 0	0.8	Früh —
15	92	75	90	79	4	3	0	2	— 0	SE 1	— 0		
16	94	58	80	77	0	0	0	0	— 0	SE 1	SE 1		
17	93	55	88	79	0	0	0	0	— 0	E 2	— 0		
18	95	51	84	77	0	0	0	0	— 0	SE 1	— 0		
19	94	74	87	85	6	9	10	8	— 0	E 2	— 0	2.8	zeitweise ⊙
20	89	51	89	76	8	2	0	3	— 0	E 2	— 0		
21	93	48	82	74	0	2	0	1	— 0	E 1	— 0		
22	91	71	85	82	4	3	1	3	— 0	E 1	— 0		Früh ∞
23	93	85	91	90	0	4	1	2	— 0	E 3	E 1		
24	89	82	70	80	9	7	10	9	— 0	E 2	E 1		Früh ∞
25	89	49	94	77	6	1	0	2	— 0	E 3	SE 1		Abends —, ()
26	93	53	91	79	0	1	0	0	— 0	E 2	NE 1		
27	93	65	91	83	1	3	2	2	— 0	E 1	— 0		Früh ∞ Abends ()
28	89	95	97	94	10	10	10	10	— 0	— 0	— 0	24.4	⊙
29	98	89	96	94	10	10	8	9	— 0	— 0	— 0	4.1	⊙
30	95	69	91	85	4	6	9	6	— 0	E 1	E 1		Berge Neu ✕
M.	91.4	62.9	86.3	80.2	3.8	3.5	3.2	3.5	0.2	1.4	0.4	49.6	

October.

1	94	63	91	83	10	9	3	7	— 0	NE 2	— 0		
2	94	62	92	83	9	2	6	6	— 0	E 2	— 0		Früh —
3	89	48	94	77	7	2	0	3	— 0	E 3	E 1		Früh ∞
4	96	44	95	78	0	1	0	0	— 0	E 2	— 0		
5	96	87	88	90	0	0	0	0	— 0	SE 1	— 0		Früh —
6	91	60	94	82	0	0	0	0	— 0	E 1	— 0		Früh —
7	94	80	90	88	10	10	10	10	— 0	— 0	— 0		sig
8	92	65	91	83	10	4	0	5	— 0	SE 1	— 0		
9	92	84	95	90	9	7	10	9	— 0	SE 1	— 0	12.9	⊙
10	93	61	91	82	10	4	0	5	— 0	SE 2	— 0		Berge Neu ✕
11	93	68	89	83	10	8	0	6	— 0	— 0	W 3		Früh — Föhn
12	87	89	96	91	9	10	10	10	E 1	SE 1	— 0	32.3	⊙
13	95	87	93	92	10	7	4	7	— 0	SE 1	— 0	0.6	Früh ⊙
14	89	67	84	80	9	3	0	4	— 0	NE 1	SW 2		Föhn
15	94	72	81	82	9	9	1	6	SW 3	W 1	SW 2		Föhn
16	91	59	89	80	6	3	0	3	NW 1	— 0	— 0		
17	94	61	89	81	2	10	3	5	SE 1	S 4	SW 3	5.4	Früh —, ⊙, Föhn
18	95	53	53	67	3	9	3	5	— 0	NE 2	SW 2		Früh —
19	94	82	96	91	9	10	10	10	— 0	— 0	— 0	11.1	Nachm. ⊙
20	96	79	92	89	10	7	7	8	— 0	NW 1	— 0	1.2	Vorm. ⊙
21	96	61	96	84	4	8	10	7	— 0	— 0	NW 1	25.3	Abends ⊙
22	96	78	96	90	10	8	10	9	— 0	— 0	— 0	1.6	Früh — Vorm. ⊙
23	88	70	96	85	9	0	0	3	NW 1	— 0	— 0		
24	96	63	94	84	0	1	1	1	— 0	— 0	SW 1		Früh —
25	94	68	96	86	0	4	5	3	SW 1	— 0	— 0		Früh —
26	93	70	96	86	8	4	3	5	— 0	— 0	— 0		
27	96	70	98	88	1	1	0	1	— 0	— 0	— 0		Früh —
28	96	66	94	85	0	1	0	0	— 0	— 0	NW 1		Früh —
29	97	60	93	83	0	1	0	0	— 0	— 0	— 0		Fr. — Nachts. Föhn
30	85	41	71	66	0	6	6	4	W 3	S 5	E 2		Tagsüber Föhn
31	86	43	79	70	4	4	4	4	W 2	S 4	W 2		Tagsüber Föhn
M.	92.9	66.5	90.1	83.2	5.7	4.9	3.4	4.7	0.4	1.1	0.7	90.4	

November.

Datum	Luftdruck				Temperatur C°.						Dampfdruck mm.			
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	Mittel	Max.	Min.	7h	2h	9h	M.
1	708.3	706.0	709.7	708.0	8.2	16.0	10.3	11.5	16.1	8.1	7.3	6.9	8.3	7.5
2	15.7	15.0	16.7	15.8	7.4	10.7	5.3	7.8	10.2	5.3	7.1	6.9	6.2	6.7
3	16.6	13.3	13.7	14.5	1.6	14.2	6.0	7.3	14.7	1.5	5.0	6.9	6.5	6.1
4	13.5	10.6	11.0	11.7	2.1	15.2	7.0	8.1	15.5	2.0	5.2	7.8	6.9	6.6
5	11.6	09.2	10.5	10.4	2.8	12.2	8.2	7.7	13.0	2.7	5.3	7.0	7.3	6.5
6	12.8	15.3	17.1	15.1	7.4	10.5	7.6	8.5	10.6	7.3	7.4	8.4	7.3	7.7
7	16.8	14.5	15.4	15.5	6.7	11.4	5.7	7.9	12.0	5.6	7.0	7.4	6.4	6.9
8	16.0	14.4	16.0	15.5	2.4	12.2	5.6	6.5	12.8	2.2	5.2	7.7	6.2	6.4
9	16.8	15.5	16.3	16.2	2.0	12.2	4.0	6.1	12.5	1.5	5.3	7.0	5.8	5.9
10	17.2	14.1	16.5	15.9	0.8	13.3	4.0	6.0	13.4	0.7	4.7	5.8	5.6	5.4
11	17.1	15.0	15.6	15.9	1.4	10.2	3.6	5.1	10.9	0.7	4.8	6.0	5.4	5.4
12	15.7	13.0	13.5	14.1	0.0	11.4	4.0	5.1	11.5	-0.1	4.3	7.4	5.8	5.8
13	13.5	13.5	16.2	14.4	2.6	12.6	4.6	6.1	13.2	2.4	4.8	6.1	5.6	5.5
14	17.6	16.8	19.9	18.1	0.5	11.0	2.5	4.7	11.5	0.2	4.5	5.8	5.2	5.2
15	22.3	17.8	18.9	19.0	-0.3	8.2	2.4	3.4	8.9	-1.0	4.3	5.8	5.2	5.1
16	18.3	17.4	17.5	17.7	1.4	5.8	4.4	3.9	6.1	1.3	4.8	6.1	5.8	5.7
17	16.1	15.7	16.2	16.0	3.8	7.4	5.8	5.7	7.8	3.7	5.8	6.3	6.3	6.1
18	16.4	16.1	17.0	16.5	2.0	8.0	1.5	3.8	8.5	1.4	5.0	5.2	4.7	5.0
19	18.5	17.1	18.8	18.1	-2.7	6.8	5.5	3.2	8.3	-2.8	3.6	4.9	3.2	3.9
20	19.1	16.5	16.7	17.4	0.6	10.2	2.2	4.3	11.0	0.4	3.9	3.9	4.7	4.1
21	15.7	11.1	09.6	12.1	-0.8	8.1	0.9	2.7	8.2	-1.0	4.2	5.2	4.5	4.6
22	06.1	03.1	03.4	04.2	-0.6	8.0	2.7	3.4	8.1	-0.8	4.1	5.2	5.1	4.8
23	02.7	699.5	696.2	699.5	1.7	4.6	3.3	3.2	4.6	1.3	4.9	5.5	5.4	5.3
24	694.2	92.6	94.2	93.7	0.8	13.4	11.1	8.4	13.4	0.3	4.5	5.1	4.9	4.8
25	97.4	96.8	94.2	96.1	10.7	13.1	11.0	11.6	13.1	9.8	4.7	4.9	5.4	5.0
26	22.1	96.7	97.3	95.4	6.7	7.6	2.8	5.7	11.9	2.5	7.0	6.0	5.0	6.0
27	92.4	96.1	700.2	96.2	7.1	11.5	5.2	7.9	11.6	2.1	5.7	4.3	5.0	5.0
28	703.5	702.7	05.2	703.8	-0.5	10.4	9.6	6.5	10.4	-0.8	4.2	3.9	4.0	4.0
29	02.6	03.0	03.0	02.9	9.8	9.2	5.0	8.0	12.1	5.6	4.8	6.2	5.8	5.6
30	03.1	07.5	10.8	07.1	2.0	1.5	1.2	1.6	5.0	0.8	5.0	4.7	4.7	4.8
M.	10.92	09.86	10.91	10.56	2.9	10.2	5.0	6.1	10.9	2.1	5.1	6.0	5.6	5.6

December.

1	714.2	715.8	717.4	15.8	1.0	2.9	-1.5	0.8	3.2	-1.5	4.7	4.3	3.8	4.3
2	17.4	15.9	16.1	16.5	-4.3	1.0	-3.0	-2.1	1.3	-4.5	2.9	4.0	3.3	3.4
3	15.4	16.0	17.6	16.3	-2.7	2.6	-0.8	-0.3	2.7	-4.2	3.5	4.3	4.2	4.0
4	17.9	18.1	21.1	19.0	-3.0	3.8	-1.0	-0.1	4.2	-3.1	3.4	4.8	4.0	4.1
5	20.4	19.5	20.7	20.2	-2.2	4.3	0.1	0.7	4.6	-2.7	3.7	5.2	4.4	4.4
6	21.0	19.0	19.4	19.8	-2.7	4.3	-0.8	0.3	4.3	-2.8	3.6	5.0	4.2	4.3
7	17.8	13.5	11.5	14.3	-3.2	4.5	-2.4	1.2	4.8	-3.3	3.5	4.8	3.8	4.0
8	12.3	13.2	16.6	14.0	1.4	6.0	-0.8	2.2	6.4	-0.8	4.6	4.9	4.2	4.6
9	17.4	14.8	14.3	15.5	-4.2	2.2	1.2	-0.3	2.2	-4.3	3.2	3.3	4.7	3.7
10	20.3	22.8	23.5	22.2	0.0	4.6	1.5	2.0	5.1	0.0	4.3	5.1	4.8	4.7
11	25.8	26.0	27.0	26.3	-1.8	3.8	-1.2	0.3	4.2	-2.4	3.8	4.8	4.0	4.2
12	25.5	23.0	21.0	23.2	-3.2	2.8	0.0	-0.1	2.9	-3.5	3.4	4.0	4.3	3.9
13	18.5	18.8	19.0	15.4	-2.0	1.0	0.0	0.7	1.2	-2.4	3.7	4.5	4.3	4.2
14	18.0	16.2	14.5	16.2	0.8	4.5	0.1	1.5	4.6	-0.4	4.6	5.0	4.4	4.7
15	07.4	07.8	10.5	08.6	0.9	7.2	5.2	4.5	8.8	-1.2	4.1	4.6	3.4	4.0
16	12.4	15.8	19.1	15.7	0.3	1.2	0.1	0.5	5.2	0.1	4.6	4.4	4.4	4.5
17	19.4	20.8	21.2	20.5	0.9	3.8	1.4	1.7	3.8	-0.1	4.3	5.2	4.8	4.8
18	20.8	19.2	19.0	19.6	1.4	3.8	-0.7	1.5	3.9	-0.7	4.7	5.1	4.2	4.7
19	16.4	12.4	11.9	13.6	-3.5	1.9	1.2	-0.1	2.2	-3.4	3.4	4.8	4.7	4.3
20	11.6	12.8	13.4	12.6	1.1	2.0	-1.3	0.6	2.7	-1.3	4.8	4.7	4.1	4.5
21	14.8	15.7	17.4	16.0	-3.8	-1.7	-3.5	-3.0	-1.1	-4.4	3.2	3.9	3.4	3.5
22	21.8	22.4	25.0	23.1	-8.3	-6.3	-11.3	-8.6	-3.5	-11.3	2.3	2.7	1.8	2.3
23	24.8	24.4	25.4	24.8	-8.2	-5.5	-10.5	-8.1	-5.3	-12.4	2.3	2.9	1.9	2.4
24	24.7	23.7	25.0	24.5	-13.1	-5.8	-10.6	-9.8	-5.3	-13.2	1.6	2.8	2.1	2.2
25	25.0	23.5	23.9	24.1	-13.2	-4.2	-10.4	-9.3	-4.1	-13.2	1.5	3.2	1.9	2.2
26	24.0	22.3	22.8	23.1	-12.6	-4.1	-9.4	-8.7	-3.7	-12.7	1.6	3.1	2.1	2.2
27	21.1	18.3	15.6	18.3	-12.6	-3.9	-8.3	-8.2	-3.7	-12.7	1.6	3.2	2.2	2.3
28	13.0	11.1	10.2	11.4	-3.1	3.3	-0.2	0.0	7.2	-8.3	3.2	3.8	3.2	3.4
29	11.1	09.5	05.7	08.8	0.4	2.0	-3.5	-0.4	2.7	-4.3	4.4	4.3	3.4	4.1
30	02.0	04.5	04.4	03.6	-5.0	1.8	0.0	-1.1	2.6	-5.2	2.8	4.7	4.4	4.0
31	08.0	08.4	08.0	08.1	-1.1	1.8	0.3	0.3	2.0	-1.7	4.1	4.6	4.4	4.4
M.	17.42	16.94	17.04	17.13	-3.5	1.6	-2.1	-1.3	2.2	-4.6	3.5	4.3	3.7	3.8

November.

Datum	Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Windrichtung und Stärke			Niederschlag	Anmerkung
	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	M.	7h	2h	9h	7a	
1	91	51	89	77	10	9	10	10	E 1	NE 1	W 1	12.8	Früh ☹ ☹ ☹
2	93	72	94	86	10	8	0	6	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
3	96	57	92	82	0	1	0	0	— 0	W 2	— 0		Fr. dicht. ☹ ☹ ☹
4	96	60	92	83	2	2	0	2	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
5	93	66	91	83	1	5	9	5	— 0	NW 1	— 0	4.3	Früh ☹ ☹ ☹
6	96	89	94	93	10	10	10	10	— 0	N 1	— 0	2.1	etwas ☹
7	96	73	94	88	10	4	0	5	— 0	W 1	— 0		
8	94	73	95	87	1	1	0	1	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹
9	94	66	95	85	2	0	0	0	— 0	— 0	— 0		
10	96	50	92	79	3	0	0	1	— 0	W 1	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
11	94	65	92	84	4	3	0	2	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
12	94	73	95	87	3	1	0	1	— 0	— 0	NW 1		Früh ☹ ☹ ☹
13	85	56	92	78	1	0	0	0	W 3	W 2	SW 1		Vorm. Wind
14	94	59	94	82	1	2	0	1	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
15	96	71	94	87	1	2	0	1	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
16	94	88	93	92	8	8	10	9	— 0	— 0	— 0	3.4	Nachts ☹
17	97	82	91	90	10	9	10	10	— 0	SE 1	— 0	Sp	Früh ☹ ☹ ☹
18	94	64	93	84	6	0	0	2	— 0	SE 1	SW 1		etwas ☹
19	96	67	48	70	1	0	0	0	— 0	SW 1	W 3		Früh ☹ ☹ ☹
20	82	43	87	70	2	0	0	1	W 1	SW 3	— 0		Fr. ☹ ☹ ☹
21	96	64	92	84	1	3	0	1	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
22	92	64	91	82	1	5	4	3	— 0	W 1	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
23	94	87	93	91	10	10	10	10	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
24	92	45	50	62	9	4	4	6	NW 1	SE 4	S 4		Früh ☹ ☹ ☹
25	49	44	55	49	5	6	3	5	SE 4	SE 5	N 3	1.2	Föhn ☹ ☹ ☹
26	96	77	89	87	8	4	5	6	W 2	E 1	SW 2	12.4	☹ ☹ ☹
27	76	42	75	64	10	5	1	5	SW 2	SE 3	E 2	Sp	☹ ☹ ☹
28	94	42	44	60	2	7	8	6	— 0	SW 3	S 4		Früh ☹ ☹ ☹
29	53	71	89	71	7	10	10	9	S 3	W 1	E 1	39.4	Nachts Föhn ☹ ☹ ☹
30	94	92	94	94	10	10	10	10	— 0	— 0	— 0	31.4	☹ ☹ ☹
M.	90.2	65.1	86.0	80.4	4.9	4.3	3.5	4.2	0.6	1.1	0.8	107.0	

December.

1	94	76	92	87	10	2	0	4	S 1	SE 1	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
2	89	81	91	87	0	1	0	0	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
3	94	77	96	89	6	8	0	5	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
4	94	80	94	89	1	0	0	0	— 0	— 0	SE 1		Früh ☹ ☹ ☹
5	96	85	96	92	0	0	0	0	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
6	96	80	96	91	0	0	0	0	— 0	— 0	SE 1		Früh ☹ ☹ ☹
7	98	76	70	81	0	0	0	0	— 0	— 0	SW 3		Früh ☹ ☹ ☹
8	91	70	96	86	1	2	0	1	— 0	— 0	— 0		Nachts Föhn
9	95	61	94	83	0	6	6	4	S 1	— 0	SE 1	2.1	Fr. ☹ ☹ ☹
10	94	81	94	91	9	3	8	7	— 0	— 0	— 0		Nachts ☹ ☹ ☹
11	96	80	96	91	5	5	0	3	— 0	— 0	— 0		Früh dicht. ☹ ☹ ☹
12	96	70	94	87	0	1	2	1	— 0	SW 2	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
13	94	73	94	87	7	6	0	4	— 0	— 0	— 0		Früh ☹ ☹ ☹
14	94	79	96	89	10	3	0	4	— 0	— 0	SW 1		Früh dichter ☹ ☹ ☹
15	84	61	51	65	10	10	10	10	— 0	SW 4	SW 3	7.4	Fr. ☹ ☹ ☹
16	98	89	96	94	10	10	10	10	E 1	NE 2	— 0	13.8	☹ ☹ ☹
17	94	87	91	92	10	7	10	9	— 0	— 0	— 0	5.7	☹ ☹ ☹
18	93	85	96	91	10	0	0	3	— 0	— 0	— 0		☹ ☹ ☹
19	96	91	94	94	0	1	6	2	— 0	— 0	SW 1	1.8	☹ ☹ ☹
20	96	89	98	94	10	8	4	7	— 0	— 0	— 0	3.3	☹ ☹ ☹
21	95	96	95	95	10	10	4	8	— 0	— 0	SW 1	5.0	☹ ☹ ☹
22	97	95	97	96	0	3	0	1	— 0	— 0	— 0		☹ ☹ ☹
23	94	96	97	96	8	2	2	4	— 0	SW 2	— 0		☹ ☹ ☹
24	96	95	97	96	0	0	0	0	— 0	— 0	— 0		☹ ☹ ☹
25	96	95	93	95	0	0	0	0	— 0	— 0	SW 1		☹ ☹ ☹
26	96	94	94	95	0	1	2	1	— 0	— 0	SW 1		☹ ☹ ☹
27	92	96	94	94	0	2	0	1	— 0	— 0	W 1		☹ ☹ ☹
28	89	65	70	75	2	1	6	3	W 4	S 4	W 3		☹ ☹ ☹
29	92	82	95	90	10	3	0	4	— 0	— 0	SW 2		☹ ☹ ☹
30	90	90	96	92	2	7	6	5	SW 3	W 2	W 2		☹ ☹ ☹
31	96	88	94	93	8	9	9	9	— 0	NW 1	— 0		☹ ☹ ☹
M.	94.0	82.7	91.9	89.6	4.5	3.6	2.7	3.6	0.3	0.6	0.7	39.1	

Monats- und

1898	Beobach- tungs- Termine			Luftdruck 700 +						
				7h	2h	9h	Mitt.	Max.	Tag	Min. Tag
Jänner	7h	2h	9h	20·68	19·59	20·91	20·39	22·5	22.	02·2 1.
Februar	„	„	„	10·62	09·76	10·43	10·26	22·6	11.	88·2 1.
März	„	„	„	06·08	05·06	05·74	05·62	14·2	18·19	92·5 26.
April	„	„	„	09·82	08·20	09·40	09·13	21·0	8.	94·5 2.
Mai	„	„	„	09·11	07·31	08·32	08·25	15·7	15.	98·1 12.
Juni	„	„	„	12·36	10·58	11·91	11·61	18·4	30.	02·6 26.
Juli	„	„	„	13·94	11·96	13 18	13·03	19·3	1.	05·4 13.
August	„	„	„	15·59	13·48	14·40	14·49	20·3	11.	04·6 8.
September	„	„	„	16·01	13·97	14·94	14·97	22·3	15.	07·2 28.
October	„	„	„	10·97	09·39	10·05	10·30	20·5	23.	92·3 17.
November	„	„	„	10·92	09·86	10·91	10·56	20·3	15.	92·1 26.
December	„	„	„	17·42	16·91	17·04	17·13	27·0	11.	02·0 30.
Jahr	7h	2h	9h	12·79	11·34	12·27	12·14			

1898	Bevölkungs- Mittel	Niederschlag			Zahl der Tage mit Nieder- schlag	Zahl der Tage mit					Wind 6—10
		Summe	Max.	Tag		mm	≠	⌒	▲	≡	
Jänner	3·7	16·2	5 9	31.	7	2	0	0	13	3	
Februar.	6·5	183·1	68·7	23.	16	14	0	0	10	4	
März	5·5	81·8	26·3	18.	11	4	0	0	12	9	
April	4·7	15·8	3 7	13.	9	0	0	0	4	7	
Mai	5·9	59·2	18·9	12.	16	1	2	0	3	8	
Juni	6·1	172·0	29·3	15.	19	0	2	1	3	2	
Juli	5·5	114·2	22·4	28.	16	0	5	1	2	1	
August	3·7	151·9	43·1	9.	11	0	6	0	3	2	
September	3·5	49·6	24·4	28.	8	0	2	0	7	0	
October	4·7	90·4	32·3	12.	8	0	0	0	13	4	
November	4·2	107·0	39·4	29.	10	1	0	0	12	4	
December	3·6	39·1	13 8	16.	7	6	0	0	11	4	
Jahr	4·8	1080 3			138	28	17	2	93	48	

Jahresübersicht.

Luft-Temperatur										Dampfdruck-Mittel	Relative Feuchtigkeit			
7h	2h	9h	Mittel		Max.	Tag	Min.	Tag	7h		2h	9h	Mittel.	
				corrig.										
- 1.6	5.1	0.3	1.2	1.0	10.5	1.31.	- 8.2	21.	3.9	87.8	63.4	83.5	78.2	
- 2.7	2.4	- 0.6	- 0.3	- 0.4	12.1	2.	- 11.9	11.	3.9	90.4	79.1	89.0	86.2	
0.6	8.2	3.8	4.2	4.1	15.2	19.	- 7.6	4.	4.5	89.7	58.5	78.7	75.6	
6.1	15.4	9.6	10.3	10.2	22.5	28.	- 1.0	6.	5.9	83.8	44.1	68.8	65.6	
10.2	18.1	12.9	13.7	13.5	23.9	2.	3.2	13.	7.4	82.3	47.5	70.6	66.8	
12.2	20.4	14.3	15.6	15.3	28.1	21.	5.3	4.	9.6	87.6	52.8	84.2	74.9	
13.1	22.0	15.6	16.9	16.6	31.6	19.	9.3	15.	10.2	88.8	50.6	82.6	74.0	
14.0	24.0	17.9	18.6	18.5	29.3	23.	9.0	30.	11.4	90.5	52.3	80.9	74.5	
10.3	20.4	13.8	14.8	14.6	25.4	11.	2.1	26.	10.0	91.4	62.9	86.3	80.2	
7.2	14.9	9.5	10.5	10.3	21.6	4.	1.8	13.	7.8	92.9	66.5	90.1	83.2	
2.9	10.2	5.0	6.1	5.8	16.0	1.	- 2.7	19.	5.6	90.2	65.1	86.0	80.4	
- 3.5	1.6	- 2.1	- 1.3	- 1.5	7.3	15.	- 13.2	25.	3.8	94.0	82.7	91.9	89.6	
5.7	13.6	8.3	9.2	9.0					7.0	89.1	60.4	82.7	77.4	

Windvertheilung									Temperatur				
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	
1	1	1	0	4	0	9	0	77.	5.9	-2.3	16.3	-8.4	
1	3	6	2	2	3	6	1	60	3.7	-3.6	13.7	-12.7	
2	6	13	2	8	5	4	0	53	9.2	0.1	17.4	-7.7	
2	0	10	8	9	5	7	5	44	16.3	5.1	23.1	-1.2	
1	2	13	4	17	2	7	4	43	19.3	8.4	24.3	1.3	
2	4	10	8	0	1	5	2	58	21.7	10.2	29.1	3.1	
1	2	15	2	2	3	4	2	62	23.0	11.7	32.1	7.1	
0	1	20	5	1	4	2	0	60	25.5	12.6	30.6	8.0	
1	4	21	11	6	1	1	0	45	21.1	9.6	27.4	2.0	
0	3	7	7	3	7	5	5	56	15.8	6.4	22.0	1.4	
2	1	4	6	3	7	11	3	53	10.9	2.1	16.1	-2.8	
0	1	1	4	3	12	5	1	66	2.2	-4.6	8.8	-13.2	
13	28	121	59	58	50	66	23	677	14.6	4.6			

II.

Stündliche Aufzeichnungen

der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur,
Feuchtigkeit, Regenfall und Sonnenschein.

Barograph, grosses Model, System Richard, von J. Fabri Wien,
für 48 Stunden.

Thermograph, grosses Model, System Richard, von J. Fabri Wien,
für 48 Stunden.

Hydrograph, System Richard, von J. Fabri Wien.
für eine Woche.

Ombrograph, System Hottinger, von Usteri-Reinacher in Zürich
Nr. 80, für 24 Stunden.

Sonnenscheinautograph, System Campbell.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	04.5	03.9	03.9	03.9	03.7	03.2	03.2	03.2	02.9	02.8	02.9	02.5
2	05.4	05.5	06.1	06.3	06.3	06.7	07.1	07.7	08.2	08.8	09.0	08.6
3	15.2	15.8	16.6	17.0	17.3	17.9	18.7	19.6	20.2	21.0	21.4	21.5
4	23.0	22.9	22.7	22.2	21.8	21.8	21.9	22.4	23.3	23.3	23.0	22.3
5	21.8	21.5	21.4	21.0	20.5	20.4	20.3	20.1	20.2	19.9	19.5	18.8
6	17.3	17.2	17.2	17.1	16.7	16.3	16.4	16.4	16.5	16.7	16.5	16.5
7	15.1	14.7	14.7	14.2	13.7	13.5	13.4	13.3	13.3	13.4	13.3	13.1
8	15.1	15.3	15.4	15.6	15.6	15.7	16.1	16.2	16.3	16.2	15.9	15.3
9	12.3	12.0	11.7	11.5	11.1	10.9	10.9	10.9	11.1	11.3	11.1	10.8
10	13.0	13.2	13.5	13.6	13.6	14.0	14.3	15.0	15.6	15.9	16.0	15.7
11	17.7	18.0	18.3	18.7	18.8	19.1	19.7	20.4	21.1	21.5	21.6	21.5
12	24.5	24.7	25.3	25.4	25.4	25.7	26.2	26.6	27.2	27.4	27.4	26.7
13	27.3	27.2	27.2	27.2	27.1	27.1	27.2	27.5	27.7	27.8	27.4	26.7
14	25.7	25.8	26.0	25.9	25.5	25.2	25.6	25.7	25.8	25.8	25.5	25.0
15	25.2	25.4	25.5	25.6	25.7	25.9	26.0	26.5	26.6	26.6	26.5	25.8
16	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.5	26.5	26.5	26.3	25.5
17	25.4	25.3	25.2	25.1	25.1	25.0	25.2	25.4	25.4	25.3	24.9	24.5
18	24.2	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	24.6	24.8	25.0	25.0	24.8	24.1
19	25.6	25.6	25.6	25.6	25.7	26.8	26.3	26.5	26.6	26.6	26.2	25.3
20	25.8	25.9	25.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.6	25.8	25.8	25.6	25.0
21	25.1	25.0	24.9	24.8	24.6	24.5	24.8	25.3	25.6	25.6	25.5	24.8
22	24.3	24.3	24.3	24.3	23.7	23.6	23.8	23.0	23.8	23.7	23.2	22.3
23	20.4	20.4	20.4	20.4	20.6	20.6	21.0	21.9	22.3	22.6	22.7	22.7
24	21.9	21.7	21.6	20.9	20.6	20.3	20.0	19.7	19.6	19.4	19.5	19.5
25	19.2	19.3	19.6	19.5	19.7	19.8	20.0	20.4	20.6	21.3	21.2	21.1
26	20.7	20.8	20.8	20.6	20.7	20.7	20.9	21.4	21.6	21.6	21.5	21.4
27	21.7	21.7	21.7	21.4	21.4	21.4	21.4	21.8	22.1	22.4	22.4	22.0
28	23.8	23.9	24.0	24.6	24.8	24.9	25.0	25.4	25.9	26.1	26.3	26.3
29	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5	27.5	27.5	28.0	28.2	28.2	28.1	27.6
30	28.0	27.9	27.6	27.4	27.2	27.1	27.0	27.2	27.2	26.8	26.1	25.8
31	20.1	20.0	19.7	19.0	18.4	17.9	16.9	15.5	14.5	12.5	11.7	10.4
M.	20.73	20.73	20.79	20.70	20.60	20.59	20.74	20.99	21.18	21.22	21.07	20.62

Februar.

1	18.2	18.8	19.0	19.3	20.2	20.7	21.0	21.5	21.6	21.5	21.5	21.6
2	18.4	17.5	17.1	16.7	16.3	15.9	15.1	14.6	13.9	13.5	12.4	10.9
3	07.1	07.0	06.6	06.3	05.9	05.7	06.8	06.8	06.9	06.7	06.8	06.6
4	03.8	02.9	01.5	00.3	99.1	98.3	97.0	96.5	96.1	95.3	95.0	94.0
5	89.7	90.7	91.6	92.1	92.7	93.3	94.4	95.2	96.0	96.4	96.6	96.7
6	06.7	07.4	08.2	08.8	09.7	10.5	11.6	13.0	13.4	13.7	13.8	13.7
7	11.3	11.0	10.5	10.1	09.8	09.6	09.8	10.4	10.2	10.0	09.7	09.4
8	08.7	08.7	08.6	09.0	09.4	10.1	10.8	11.6	12.1	12.2	12.4	12.5
9	12.7	12.3	12.1	11.7	11.5	11.0	10.9	10.8	10.7	10.5	10.7	11.2
10	14.7	14.9	15.1	15.6	16.1	16.9	17.5	18.5	19.0	19.5	20.1	20.3
11	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.6	22.8	22.9	22.9	22.7	22.5
12	21.0	20.9	20.9	20.6	20.6	20.7	20.6	20.7	21.1	21.4	21.4	21.3
13	21.2	21.0	21.0	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	20.4	20.2	19.9
14	18.6	18.5	18.3	17.9	17.4	17.1	17.1	17.3	17.5	17.4	17.2	17.0
15	20.9	20.9	21.0	21.1	21.2	21.5	21.7	21.9	22.1	22.2	22.2	22.2
16	18.4	18.1	17.4	17.0	16.9	16.0	15.0	14.7	14.3	14.5	15.0	15.0
17	08.6	08.3	07.3	06.5	06.2	06.5	06.4	06.5	07.8	08.2	08.4	08.7
18	08.3	08.1	07.8	07.3	07.1	06.7	06.3	06.0	05.9	05.6	05.3	04.9
19	03.0	02.9	02.8	03.0	03.3	03.5	03.7	03.8	04.3	04.4	04.5	04.7
20	04.9	04.6	04.2	03.9	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.7	03.5	03.2
21	02.3	02.1	01.5	01.4	01.3	01.2	01.0	00.9	00.6	00.3	00.2	00.2
22	00.2	00.1	99.9	99.7	99.8	99.8	99.7	00.1	00.2	99.7	99.7	99.4
23	97.9	97.4	97.9	97.6	97.5	97.7	98.0	98.6	99.1	99.4	99.4	99.4
24	03.0	03.2	03.2	03.7	04.2	04.5	05.1	05.9	06.3	06.8	07.0	07.5
25	12.2	12.8	12.9	13.1	13.5	13.7	14.4	14.5	14.6	14.5	14.2	14.1
26	16.6	16.6	16.5	16.3	16.2	16.4	16.5	16.7	16.4	16.0	15.3	14.5
27	15.3	15.3	15.2	15.0	14.9	15.0	15.5	15.6	15.5	15.4	15.1	14.6
28	13.3	13.2	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	12.6	12.5	12.7	12.4	12.0
M.	10.70	10.63	10.49	10.36	10.39	10.43	10.55	10.80	10.92	10.89	10.81	10.64

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	02.3	02.2	02.3	02.5	02.8	03.3	03.8	04.5	04.9	05.4	05.5	05.5	3.6	05.5	02.2
2	08.6	08.8	09.2	09.8	10.2	10.9	11.7	12.3	13.1	13.8	14.3	14.8	9.3	14.8	05.4
3	21.2	20.5	20.5	20.8	21.6	22.3	22.8	23.0	23.2	23.3	23.2	23.0	20.3	23.3	15.2
4	21.2	19.8	19.6	20.3	20.6	21.3	21.7	21.8	22.6	22.4	22.3	22.1	21.9	23.0	19.6
5	18.2	17.6	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	17.5	17.5	17.5	17.5	19.0	21.8	17.3
6	15.8	15.5	15.3	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	16.1	17.3	15.2
7	12.5	12.3	12.4	12.6	12.9	13.3	13.8	14.3	14.6	14.7	15.0	15.0	13.7	15.1	12.3
8	14.5	13.7	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.5	13.4	13.0	12.7	14.6	16.3	12.7
9	10.3	10.4	10.6	10.8	10.9	11.2	11.5	11.9	12.3	12.5	12.5	12.7	11.4	12.7	10.3
10	14.8	14.4	14.5	15.1	15.6	15.9	16.4	16.8	17.1	17.4	17.5	17.5	15.3	17.5	13.0
11	21.4	21.4	21.6	21.8	22.3	22.6	23.1	23.4	23.7	24.0	24.3	24.4	21.3	24.4	17.7
12	26.1	25.5	25.6	25.7	26.0	26.4	26.6	26.8	27.2	27.2	27.2	27.2	26.2	27.4	24.5
13	25.9	25.3	25.4	25.4	25.5	25.8	26.2	26.3	26.2	26.3	26.3	26.1	26.6	27.8	25.3
14	24.2	23.7	23.6	23.6	24.0	24.1	24.1	24.4	24.7	25.0	25.0	25.1	25.0	26.0	23.6
15	25.1	24.7	24.6	24.7	24.8	24.9	25.1	25.1	25.3	25.8	26.1	26.1	25.6	26.6	24.6
16	24.5	24.0	23.9	24.2	24.5	24.9	25.1	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	26.5	23.9
17	23.9	23.6	23.4	23.5	23.6	23.7	23.7	23.9	24.0	24.1	24.2	24.1	24.5	25.4	23.4
18	23.4	23.0	22.8	22.9	23.3	23.9	24.5	24.9	25.4	25.5	25.6	25.6	24.4	25.6	22.8
19	24.3	23.7	23.3	23.3	23.6	23.9	24.1	24.2	24.3	24.5	24.7	24.8	25.0	26.6	23.3
20	23.9	23.2	23.1	23.1	23.3	24.0	24.2	24.3	24.8	24.9	25.0	25.0	24.8	25.9	23.1
21	24.1	23.4	23.1	23.1	23.3	23.6	24.0	24.3	24.3	24.4	24.4	24.3	24.4	25.6	23.1
22	21.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.3	20.3	20.3	20.4	22.1	24.3	20.2
23	22.5	21.7	21.7	21.7	21.4	21.9	21.9	22.3	22.3	22.3	22.2	22.1	21.7	22.7	20.4
24	19.4	18.9	18.6	18.5	18.8	19.1	19.3	19.2	19.2	19.1	19.1	19.1	19.7	21.9	18.5
25	20.8	20.3	20.2	20.2	20.1	20.2	20.3	20.8	20.8	20.8	20.7	20.3	21.2	21.9	19.2
26	21.2	20.8	20.8	20.8	20.9	21.0	21.1	21.3	21.5	21.7	21.7	21.7	21.1	21.7	20.6
27	21.6	21.0	21.0	21.1	21.8	22.2	22.9	23.0	23.4	23.7	23.8	23.8	22.1	23.8	21.0
28	25.3	24.7	24.9	25.1	25.5	26.0	26.5	26.6	27.1	27.1	27.3	27.5	25.6	27.5	23.8
29	26.9	26.1	26.1	26.0	26.0	26.1	26.5	27.1	27.4	27.4	27.9	28.1	27.2	28.2	26.0
30	24.7	23.6	23.1	22.8	22.8	22.9	22.9	22.9	22.6	21.9	21.2	20.6	24.9	28.0	20.6
31	11.7	12.8	13.2	13.8	14.4	14.9	15.5	15.8	16.3	17.0	16.7	17.6	15.7	20.1	10.4
M.	20.06	19.59	19.54	19.67	19.91	20.23	20.52	20.75	20.98	21.11	21.14	21.16	20.61	22.10	18.68

Februar.

1	20.6	19.5	19.0	18.2	18.2	18.1	18.3	18.6	19.0	19.0	18.9	18.7	19.6	21.6	18.1
2	09.1	07.3	06.3	05.6	05.2	05.3	04.7	05.3	05.6	05.7	06.0	06.6	10.6	18.4	04.7
3	06.3	05.9	05.7	05.4	05.6	05.7	06.3	06.5	06.4	06.1	05.5	04.9	06.2	07.1	04.9
4	92.7	91.9	92.0	91.8	91.0	90.4	89.6	88.9	88.4	88.6	88.9	89.2	94.3	03.8	88.4
5	96.9	97.6	99.2	01.1	02.3	02.1	02.8	03.2	03.8	04.6	05.3	06.0	97.8	06.0	89.7
6	13.4	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1	13.0	12.7	12.2	12.0	11.9	13.8	06.7
7	08.6	07.9	08.1	08.5	08.6	08.7	08.7	08.8	08.8	08.7	08.8	08.8	09.4	11.3	07.9
8	12.2	11.9	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	13.1	13.1	13.1	13.0	11.5	13.1	08.7
9	11.4	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	13.0	13.3	13.7	14.0	14.2	14.4	12.2	14.4	10.5
10	20.4	20.3	20.3	20.4	20.7	21.0	21.6	21.9	22.1	22.4	22.4	22.5	19.3	22.5	14.7
11	22.0	21.2	20.6	20.1	20.0	19.8	20.2	20.7	21.2	21.1	21.0	21.0	21.7	22.2	19.8
12	21.1	20.7	20.6	20.7	20.8	20.8	20.9	20.8	20.9	20.9	21.0	21.1	20.9	21.4	20.6
13	19.0	18.1	17.9	17.9	17.8	18.0	18.3	18.5	18.7	18.7	18.7	18.8	19.6	21.2	17.8
14	16.7	16.0	16.1	16.7	17.5	18.4	18.7	19.5	20.0	20.1	20.2	20.6	18.0	20.6	16.0
15	21.9	21.2	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.3	20.0	19.4	19.1	21.0	22.2	19.1
16	14.6	14.0	13.0	12.0	11.3	10.8	10.6	10.3	10.3	10.2	09.9	09.3	13.7	18.4	09.3
17	08.5	08.3	07.9	07.5	07.5	08.0	08.6	08.8	08.8	08.8	08.7	08.6	07.9	08.8	06.2
18	04.2	03.6	03.3	03.2	03.0	03.1	03.1	03.2	03.2	03.2	03.1	03.0	04.9	08.3	03.0
19	04.7	04.6	04.3	04.3	04.4	04.7	04.9	05.0	05.1	05.1	05.1	05.0	04.2	05.1	02.8
20	02.8	02.3	02.1	02.0	02.0	02.0	02.1	02.2	02.3	02.3	02.3	02.3	03.1	04.9	02.0
21	99.5	99.1	98.8	98.8	98.8	99.2	99.5	99.8	00.1	00.2	00.2	00.3	00.3	02.3	98.8
22	99.3	99.4	99.3	99.1	98.6	98.6	98.6	98.3	98.3	98.3	98.1	97.8	99.2	00.2	97.8
23	99.5	99.7	00.1	00.4	00.8	01.2	01.7	01.7	02.2	02.4	02.7	02.7	99.8	02.7	97.4
24	07.6	07.7	07.9	08.1	08.5	09.0	09.5	10.1	10.7	11.0	11.3	11.9	07.3	11.9	03.0
25	14.1	14.1	14.2	14.4	15.1	15.7	16.1	16.3	16.6	16.6	16.5	16.5	14.6	16.6	12.2
26	13.4	12.3	13.1	11.9	12.0	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	16.1	16.3	14.8	16.7	11.9
27	14.0	13.4	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.0	13.3	13.7	13.5	13.4	14.2	15.6	13.0
28	11.6	11.4	11.3	11.2	11.4	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.7	12.3	13.3	11.2
M.	10.21	09.79	09.67	09.64	09.71	09.86	10.06	10.23	10.44	10.52	10.56	10.59	10.37	13.03	07.72

März.

Luftdruck in Millimetern. 700 mm +

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	12.8	12.9	12.8	12.4	12.4	12.6	12.6	12.8	12.7	12.9	12.8	12.3
2	07.8	07.2	06.6	06.0	05.5	04.8	04.5	04.5	04.7	04.0	03.7	03.2
3	07.5	07.5	07.3	07.3	07.3	07.5	07.5	07.8	07.6	07.3	06.9	06.6
4	07.5	07.7	07.7	07.8	07.8	07.9	08.0	08.2	08.2	08.0	07.4	07.0
5	03.4	03.5	02.8	02.5	02.4	02.2	02.0	01.9	01.6	01.4	01.4	01.4
6	00.6	00.6	01.0	01.1	01.1	01.5	01.9	02.5	02.6	02.8	02.8	03.2
7	04.5	04.5	04.1	03.8	03.6	03.5	03.3	03.2	03.1	02.9	02.6	02.1
8	00.1	00.2	00.1	00.2	00.1	00.1	00.3	00.6	00.9	01.0	01.1	01.3
9	07.5	07.9	08.3	08.5	08.8	09.1	09.4	09.4	09.4	09.3	09.3	09.2
10	10.1	10.2	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	09.9	09.6	09.4
11	09.8	09.7	09.5	09.4	09.3	09.3	09.4	09.4	09.5	09.5	09.2	09.0
12	07.3	07.1	06.8	06.9	07.0	07.1	07.4	07.9	07.1	08.0	07.7	07.5
13	09.7	10.0	10.1	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.1	10.9	10.6	10.2
14	11.7	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.7	12.7	12.9	12.8	12.5	12.1
15	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.8	13.9	13.8	13.6	13.3	13.0
16	13.6	13.7	13.7	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.1	12.7
17	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	12.2	12.4	12.8	13.3	13.7	13.8
18	13.1	12.8	12.7	12.7	12.5	12.3	12.3	12.4	12.9	12.9	13.0	13.1
19	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	13.4	13.0	12.0
20	10.6	10.6	10.4	10.3	10.2	10.1	10.2	10.1	09.7	09.0	08.5	08.0
21	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.5	10.6	10.8	11.1	11.1	11.1
22	12.0	12.0	11.6	11.3	11.4	11.4	11.3	11.3	11.2	11.2	10.9	10.2
23	09.1	08.7	08.3	08.1	07.4	07.2	06.6	06.6	06.4	05.6	05.1	04.2
24	99.2	98.7	98.3	97.7	97.4	96.7	96.3	96.2	96.2	96.1	96.2	96.1
25	99.2	99.2	98.9	98.7	98.5	98.4	98.4	98.4	98.2	97.4	97.0	97.0
26	92.7	92.2	91.6	91.5	91.8	92.1	92.5	92.8	93.5	93.6	94.2	94.5
27	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.3	96.3	96.3	96.1	96.1	96.3
28	97.7	97.7	97.7	97.6	97.5	97.7	98.1	98.5	98.6	98.8	98.9	98.6
29	01.8	01.8	01.3	01.1	00.8	00.7	00.4	00.0	09.7	09.0	98.1	97.6
30	94.6	94.8	94.9	94.9	94.8	95.4	96.1	96.4	96.6	97.2	97.8	98.0
31	03.4	03.7	03.7	04.0	04.0	04.2	04.9	05.2	05.2	05.2	04.9	04.8
M.	06.22	06.21	06.07	06.00	05.93	05.95	06.06	06.16	06.20	06.06	05.90	05.66

April.

1	04.1	03.7	03.3	03.0	03.1	03.2	03.1	02.7	02.5	02.2	01.5	00.6
2	96.2	95.4	95.3	94.9	94.6	94.5	94.5	94.3	94.3	94.4	94.4	94.3
3	01.8	02.1	02.5	02.7	03.0	03.9	04.5	05.0	05.3	05.3	05.4	05.5
4	09.5	09.6	09.6	09.7	09.8	09.9	10.4	10.5	10.4	10.2	09.9	09.6
5	10.9	10.9	10.6	10.4	10.2	10.2	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	10.9
6	15.5	15.7	15.8	15.9	16.1	16.5	16.8	17.0	17.0	16.5	16.2	15.7
7	17.8	18.0	18.3	18.5	18.9	19.3	19.7	19.8	19.8	19.6	19.2	18.5
8	20.3	20.3	20.4	20.6	20.6	20.7	21.0	21.1	20.8	20.3	19.8	19.0
9	18.3	18.3	18.3	18.4	18.4	18.5	18.7	18.4	18.1	17.6	16.9	16.2
10	14.9	14.7	14.8	14.8	14.9	15.0	15.0	15.0	15.2	15.2	15.0	14.3
11	11.6	11.1	11.2	11.5	11.4	11.4	11.2	11.1	10.7	10.8	10.4	10.0
12	07.0	06.6	06.0	05.2	04.8	04.6	04.2	04.1	04.2	04.0	04.4	04.4
13	08.1	08.0	08.0	08.0	08.0	08.0	08.1	08.1	07.7	07.7	07.9	08.1
14	12.8	13.2	13.5	13.8	14.0	14.7	15.1	15.5	15.5	15.4	15.0	14.4
15	15.6	15.3	15.3	15.1	14.6	14.5	14.4	14.1	13.2	12.7	12.3	11.5
16	11.8	11.7	11.3	10.8	10.7	10.6	10.5	10.2	10.3	10.1	10.1	09.8
17	09.7	09.3	09.4	09.2	09.0	09.1	09.0	08.9	08.7	08.4	08.1	07.4
18	03.1	01.9	01.0	00.4	00.4	00.7	00.6	01.5	01.3	01.0	00.9	00.4
19	06.4	07.0	07.5	08.1	08.8	09.5	10.0	10.3	10.3	10.4	10.0	09.8
20	13.1	12.9	12.9	13.1	13.2	13.4	13.7	13.6	13.3	12.9	12.3	12.0
21	14.8	14.8	14.8	14.7	14.5	14.7	14.8	14.7	14.6	13.9	13.5	12.6
22	09.0	08.5	08.1	07.8	07.8	07.7	07.4	07.1	06.8	06.7	06.1	05.3
23	04.8	04.8	04.7	04.7	04.8	05.0	05.2	05.3	05.4	05.6	05.7	05.6
24	09.3	09.4	09.6	09.8	09.9	10.1	10.5	10.7	10.9	10.9	10.7	10.6
25	11.8	11.6	11.5	11.4	11.4	11.5	11.6	11.5	11.4	11.2	10.8	10.3
26	10.2	10.1	10.1	09.8	09.3	09.3	09.3	09.0	08.2	07.7	07.2	06.4
27	04.8	04.7	04.5	04.4	04.5	04.5	04.5	04.2	03.9	03.2	02.8	02.1
28	03.3	03.4	03.6	03.7	03.8	04.1	04.3	04.3	04.3	03.9	03.5	03.3
29	04.2	04.2	04.3	04.3	04.8	04.9	04.9	04.9	04.8	04.2	03.9	03.7
30	09.0	09.4	09.7	09.8	10.1	10.5	11.0	11.1	11.1	10.9	10.4	10.3
M.	09.06	09.55	09.53	09.48	09.51	09.68	09.81	09.81	09.68	09.45	09.16	08.75

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	11.7	11.0	10.4	10.2	10.0	09.9	09.9	09.6	09.2	09.2	09.0	08.6	11.3	12.9	08.6
2	03.7	05.0	05.0	05.8	06.4	06.9	07.1	07.3	07.5	07.1	07.4	07.3	05.8	07.8	03.2
3	06.1	05.7	05.5	05.3	05.3	05.6	06.0	06.5	06.7	07.0	07.4	07.5	06.8	07.8	05.3
4	06.3	05.3	05.0	04.7	04.7	04.8	04.9	04.9	04.5	04.5	04.2	03.7	06.3	08.2	03.7
5	01.5	01.0	00.7	00.4	00.4	00.3	00.1	00.4	00.6	01.0	00.9	00.7	01.4	03.5	00.3
6	03.1	03.0	03.1	03.4	03.5	03.9	04.1	04.3	04.7	04.7	04.6	04.6	02.9	04.7	00.6
7	01.6	01.2	00.8	00.5	00.1	00.1	00.2	00.0	09.8	00.1	00.2	00.1	01.9	04.5	09.8
8	01.7	02.4	02.6	03.0	03.5	04.0	04.6	04.9	05.5	05.8	06.2	07.0	02.1	07.0	00.1
9	09.0	08.7	08.7	08.7	08.8	08.9	09.0	09.4	09.7	09.8	09.9	10.1	09.0	10.1	07.5
10	09.0	08.3	08.2	08.1	08.0	08.3	08.7	09.0	09.2	09.7	09.7	09.7	09.4	10.2	08.0
11	08.7	08.6	08.4	08.3	08.1	08.1	08.2	08.0	07.9	07.9	07.8	07.9	08.8	09.8	07.8
12	07.1	06.8	06.8	06.7	06.8	06.9	07.4	07.9	08.3	09.0	09.1	09.3	07.5	09.3	06.7
13	09.8	09.1	09.1	09.1	09.1	09.3	09.9	10.2	10.6	10.9	11.1	11.3	10.2	11.3	09.1
14	11.5	11.1	11.0	10.7	10.7	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.0	12.0	13.0	10.7
15	12.4	11.9	11.7	11.5	11.3	11.7	12.2	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	12.8	13.9	11.3
16	12.0	11.3	11.2	11.1	10.8	11.1	11.4	11.4	11.3	11.3	11.5	11.6	12.4	13.7	10.8
17	13.3	12.9	12.7	12.5	12.4	12.2	12.5	12.5	12.7	12.9	13.2	13.0	12.6	13.8	11.7
18	13.2	13.5	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3	14.5	14.5	14.5	14.7	14.6	13.5	14.7	12.3
19	11.2	10.4	10.0	09.7	09.4	09.5	09.7	09.8	10.0	10.1	10.3	10.6	12.0	14.5	09.4
20	07.2	06.9	06.9	07.1	07.7	08.2	08.5	09.4	09.7	10.0	10.2	10.3	09.1	10.6	06.9
21	11.0	10.8	10.8	10.8	11.0	11.4	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.0	12.0	10.3
22	09.9	09.4	09.0	08.7	08.5	08.6	08.7	09.0	09.2	09.3	09.3	09.3	10.2	12.0	08.5
23	03.5	02.4	01.8	00.9	00.8	00.8	01.0	01.1	01.1	00.8	00.3	09.8	04.2	09.1	09.8
24	96.1	96.0	96.0	96.0	96.1	96.2	97.0	97.8	98.3	98.6	98.9	99.1	97.1	99.2	96.0
25	96.1	95.4	95.6	95.6	95.7	95.6	95.3	95.5	95.2	94.5	94.1	93.3	96.7	99.2	93.3
26	94.6	94.6	94.6	94.5	94.7	94.7	95.0	95.2	95.3	95.7	96.1	96.1	93.9	96.1	91.5
27	96.5	96.8	96.7	96.3	96.3	96.6	97.0	97.1	97.2	97.6	97.7	97.8	96.6	97.8	96.1
28	98.3	98.3	98.3	98.5	98.9	99.4	00.1	00.7	01.0	01.3	01.7	01.8	99.0	01.8	97.5
29	97.2	96.7	96.4	96.1	95.8	95.6	95.2	94.7	94.1	94.3	94.4	94.5	97.8	01.8	94.1
30	98.5	98.5	98.6	99.2	99.9	00.4	01.1	02.0	02.7	03.1	03.4	03.4	98.4	03.4	94.6
31	04.5	04.4	04.5	04.4	04.3	04.4	04.6	04.7	04.7	04.7	04.6	04.4	04.5	05.2	03.4
M.	05.36	05.08	05.07	04.90	04.94	05.12	05.10	05.62	05.75	05.91	06.00	05.99	05.73	07.71	03.84

April.

1	00.2	99.8	99.6	99.4	99.1	99.0	98.7	98.3	97.9	97.3	97.0	96.4	00.7	04.1	96.4
2	94.3	94.5	94.7	95.2	96.2	97.4	98.5	99.4	00.2	00.6	01.0	01.6	96.3	01.6	94.2
3	05.4	05.4	05.6	05.9	06.5	07.2	07.9	08.6	09.1	09.3	09.4	09.5	05.7	09.5	01.8
4	09.1	08.6	08.4	08.4	08.7	09.1	09.6	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	09.7	10.5	08.4
5	11.3	11.8	11.7	12.3	12.3	12.9	13.5	14.1	14.6	14.6	15.1	15.3	11.9	15.3	10.2
6	15.0	14.4	14.0	13.8	13.9	14.0	14.6	15.1	16.0	16.3	17.0	17.4	15.7	17.4	13.8
7	18.1	17.8	17.2	17.0	17.0	17.0	17.5	18.2	19.1	19.4	20.1	20.2	18.6	20.2	17.0
8	18.2	17.7	17.3	17.1	17.0	17.1	17.4	17.8	18.0	18.1	18.2	18.2	19.0	21.1	17.0
9	15.4	14.8	14.2	13.7	13.5	13.6	13.6	13.9	14.1	14.5	14.7	14.8	16.1	18.7	13.5
10	13.9	13.3	13.2	12.9	12.2	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.7	15.2	11.9
11	09.4	08.7	08.0	07.4	07.1	07.0	07.0	07.3	07.3	07.3	07.3	07.3	09.3	11.6	07.0
12	04.1	04.0	04.1	04.2	04.4	05.1	05.5	06.6	07.0	07.3	07.4	08.0	05.3	08.0	01.0
13	08.5	09.2	09.5	09.8	10.0	10.3	10.7	11.3	11.6	12.1	12.3	12.5	09.3	12.5	07.7
14	14.2	14.0	14.0	13.9	13.9	14.0	14.1	14.8	15.0	15.1	15.2	15.6	14.4	15.6	12.8
15	11.0	10.4	10.3	10.4	10.2	10.4	10.6	11.0	11.1	11.5	11.8	11.9	12.6	15.6	10.2
16	09.4	09.4	08.9	08.7	08.7	08.7	08.9	09.1	09.2	09.2	09.5	09.6	09.9	11.8	08.7
17	07.2	07.0	06.4	06.2	06.2	05.7	05.6	05.6	05.5	05.0	04.7	04.0	07.3	09.7	04.6
18	00.5	00.0	00.6	00.5	00.5	01.2	02.0	03.2	04.0	04.6	05.3	06.0	01.8	06.0	00.1
19	09.4	09.4	09.5	10.0	10.1	10.7	11.4	12.2	12.5	12.9	12.9	13.1	10.1	13.1	06.4
20	11.6	11.1	10.8	10.9	11.1	11.4	12.0	12.8	13.7	14.3	14.4	14.6	12.7	14.6	10.8
21	11.6	10.8	10.2	09.6	09.6	09.5	09.6	09.7	09.7	09.6	09.6	09.3	12.1	14.8	09.3
22	00.1	04.7	04.3	04.2	04.1	04.0	04.1	04.4	04.5	04.6	04.7	04.8	05.9	09.0	01.0
23	05.4	05.4	05.5	06.1	06.4	07.1	07.5	08.2	08.6	08.9	09.1	09.1	06.2	09.1	04.7
24	10.5	10.4	10.2	10.1	10.0	10.2	10.7	11.1	11.3	11.5	11.8	11.9	10.5	11.9	09.3
25	09.9	09.4	08.9	08.8	08.9	09.0	09.5	09.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.5	11.8	08.8
26	06.0	05.5	05.1	04.7	04.5	04.3	04.3	04.5	04.8	04.8	04.9	04.9	06.9	10.2	01.3
27	02.0	01.5	01.5	01.5	01.5	01.6	01.9	02.1	02.5	02.8	03.0	03.1	03.0	04.8	01.5
28	03.1	03.0	02.6	02.3	02.4	02.7	03.1	03.3	04.0	04.1	04.1	04.2	03.5	04.3	02.3
29	03.6	03.6	03.5	03.6	03.9	04.1	04.7	05.5	06.3	06.9	07.7	08.4	04.8	08.4	03.5
30	10.1	09.8	09.5	09.1	09.2	09.6	10.1	11.0	11.9	12.2	12.9	13.1	10.5	13.1	09.0
M.	08.45	08.20	07.98	07.92	07.97	08.19	08.55	09.04	09.40	09.55	09.79	09.92	09.13	11.65	07.10

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	13.1	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.1	14.0	13.7	13.2	12.7	11.8
2	11.5	11.5	11.7	11.8	11.7	11.7	11.5	11.0	10.4	09.6	09.0	08.4
3	08.7	08.6	08.5	08.5	08.6	08.5	08.3	08.1	07.3	06.9	06.7	06.6
4	09.3	09.7	10.2	10.3	10.7	11.3	11.9	12.0	12.0	11.9	12.0	11.9
5	13.5	13.9	14.0	14.1	14.3	14.6	14.9	14.9	14.9	14.8	14.6	14.2
6	12.6	12.3	11.7	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	10.4	09.9	08.7	07.3
7	08.9	09.0	09.0	09.0	09.0	09.1	09.8	10.1	10.2	10.4	11.0	11.2
8	14.3	14.3	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	13.9
9	14.1	13.8	13.2	13.0	12.9	12.9	12.9	12.8	12.3	12.0	11.7	11.2
10	10.0	09.9	09.8	09.6	09.6	09.7	09.8	09.7	09.2	08.9	08.7	07.8
11	08.6	08.4	08.0	07.5	07.4	06.9	06.6	06.0	05.3	04.7	03.9	03.2
12	99.0	98.6	98.4	98.4	98.3	98.0	98.2	98.3	98.3	97.7	97.2	97.3
13	00.4	00.7	01.1	01.5	01.8	02.6	03.2	03.7	04.1	04.4	04.4	04.6
14	11.3	11.9	12.3	12.4	13.1	13.6	14.0	14.0	13.7	13.2	12.9	12.2
15	14.1	14.3	14.8	15.0	15.3	15.5	15.7	15.7	15.3	14.7	14.2	13.4
16	13.3	13.3	13.4	13.4	13.8	14.0	14.1	14.1	13.5	12.9	12.4	11.4
17	12.0	12.0	12.0	11.8	11.7	11.6	11.4	11.0	10.6	10.0	09.4	08.7
18	08.5	08.5	08.5	08.5	08.5	08.3	08.4	08.3	08.0	07.5	07.1	06.4
19	05.1	05.0	05.0	04.9	04.7	04.6	04.6	04.6	04.6	04.5	04.5	04.2
20	01.5	01.5	01.1	01.0	01.0	01.1	01.1	01.1	01.0	01.0	02.2	03.2
21	08.5	08.8	09.4	09.9	10.2	10.4	10.9	10.7	10.4	10.1	09.6	09.3
22	10.6	10.8	10.6	10.6	10.6	10.5	10.1	09.8	09.3	08.9	08.5	07.9
23	07.9	07.8	07.6	07.5	07.5	07.5	07.4	07.3	07.1	07.0	06.9	06.6
24	07.0	06.9	06.8	06.9	06.9	06.9	06.9	06.9	06.8	06.3	05.7	05.2
25	06.0	05.9	05.5	05.4	05.3	05.3	05.3	05.2	05.2	05.0	04.4	04.0
26	05.0	05.0	05.1	05.1	05.2	05.1	05.1	05.0	04.9	04.8	05.1	04.9
27	08.2	08.3	08.4	08.6	08.8	09.4	09.6	09.8	09.8	09.7	09.6	09.4
28	09.3	09.9	08.5	08.3	08.1	08.0	07.7	07.6	07.1	06.9	06.9	06.3
29	07.3	07.3	07.3	07.4	07.6	07.9	08.3	08.3	08.4	08.5	08.6	08.6
30	09.0	08.4	08.0	08.2	08.4	08.3	08.2	08.0	07.9	07.8	07.6	07.5
31	07.7	07.6	07.5	07.5	07.6	07.7	07.9	07.9	07.9	07.8	07.4	07.1
M.	08.91	08.92	08.89	08.89	08.97	09.05	09.15	09.08	08.84	08.56	08.31	07.93

Juni.

1	06.8	06.7	06.6	06.5	06.5	06.6	06.6	06.6	06.6	06.5	06.2	06.0
2	11.7	11.6	11.6	11.3	11.3	11.4	11.6	12.0	12.0	12.1	12.1	12.0
3	10.4	10.6	10.9	11.3	11.9	12.5	13.3	13.6	13.7	14.5	14.7	14.9
4	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	15.4	15.5	15.2	14.8	14.4	14.0	13.6
5	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	14.0	13.4	12.8	12.1	11.5
6	12.0	12.1	12.2	12.3	12.6	13.1	13.4	13.5	13.4	13.2	12.9	12.5
7	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1	14.2	14.3
8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.7	14.4	13.8	13.4	12.8
9	14.9	15.0	15.1	15.0	14.9	14.9	14.9	14.7	14.2	14.0	13.5	12.6
10	12.1	12.0	11.9	11.8	11.8	11.5	11.5	11.4	11.1	10.8	10.6	10.4
11	09.9	09.8	09.8	09.7	09.7	09.6	09.6	09.7	09.7	09.6	09.4	09.2
12	11.2	11.2	11.3	11.4	11.8	12.0	12.1	12.3	12.1	12.4	13.4	13.8
13	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.2	15.0	14.9	14.7	14.1	13.7	13.1
14	12.5	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7	12.8	12.7	12.4	12.0	11.6	11.1
15	10.1	09.7	09.5	09.0	08.6	08.3	08.1	07.7	07.7	07.6	07.9	08.5
16	07.5	06.9	06.6	06.4	06.0	05.8	05.6	05.8	06.0	06.5	07.0	07.1
17	11.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.7	12.2	12.5	12.7	13.0	13.1	13.2
18	15.7	15.8	15.8	16.1	16.4	16.5	17.0	17.0	16.9	16.5	16.2	16.2
19	16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.4	14.8	14.3	13.9
20	13.7	13.8	13.7	13.6	13.5	13.4	13.6	13.8	13.3	13.0	12.9	12.8
21	15.2	15.2	15.2	14.9	14.9	14.9	14.8	14.5	14.0	13.6	13.0	12.5
22	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	10.8	10.7	10.3	10.0	09.6
23	10.3	09.8	09.7	09.7	09.5	09.5	09.5	09.4	09.8	08.2	08.1	08.0
24	13.9	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.9	14.7	14.1	13.7	13.0	12.4
25	09.9	10.1	10.2	10.2	10.1	10.1	09.9	09.8	09.2	08.7	08.0	07.1
26	06.9	06.8	06.2	06.0	06.0	05.9	05.3	05.1	04.9	04.2	04.1	03.5
27	09.0	08.8	08.8	08.9	08.7	08.7	08.4	08.2	07.7	07.2	06.8	06.2
28	08.9	09.4	09.8	10.0	10.1	10.6	11.1	11.2	11.1	10.9	10.4	10.1
29	13.4	13.6	13.7	13.8	14.1	14.3	14.3	14.3	13.6	13.6	13.3	12.7
30	15.4	15.5	15.7	16.1	16.5	17.0	17.8	18.0	18.0	17.7	17.3	17.2
M.	12.09	12.09	12.09	12.09	12.14	12.22	12.29	12.27	12.02	11.79	11.57	11.29

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	11.3	10.8	10.4	10.1	09.9	09.9	10.1	10.6	11.0	11.1	11.3	11.5	12.1	14.1	09.9
2	08.0	07.7	07.4	07.5	07.5	07.6	07.8	08.2	08.6	08.7	08.7	08.8	09.4	11.8	07.4
3	06.1	05.8	05.4	05.5	05.4	05.9	06.7	06.8	06.8	06.8	08.4	08.6	07.2	08.7	05.4
4	11.5	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	11.1	11.9	12.2	12.7	13.0	13.3	11.4	13.8	09.3
5	13.7	13.4	13.1	13.0	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	13.0	13.7	14.9	12.8
6	06.4	05.9	05.3	05.2	05.1	04.7	05.4	07.6	08.3	08.4	08.7	09.0	08.7	12.6	04.7
7	11.3	11.4	11.7	11.9	12.1	12.2	12.7	13.1	13.7	14.1	14.1	14.2	11.2	14.2	08.9
8	13.8	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.6	14.0	14.3	14.3	14.3	14.3	14.0	14.6	13.2
9	11.1	10.4	10.1	09.8	09.3	09.2	09.3	09.7	10.0	10.1	10.1	10.1	11.3	14.1	09.2
10	07.7	07.5	07.7	07.9	08.2	08.6	09.0	09.2	09.5	09.3	09.2	08.9	09.0	10.0	07.5
11	02.3	01.5	01.0	00.5	00.2	00.1	00.0	99.9	99.8	99.8	99.7	99.2	98.4	08.6	99.2
12	97.9	98.1	98.4	98.4	98.3	98.5	98.7	98.8	99.2	99.3	99.7	00.3	98.5	00.3	97.2
13	04.8	05.2	05.2	05.9	07.0	07.9	08.6	09.3	10.2	10.6	11.0	11.2	05.4	11.2	00.4
14	11.9	11.4	11.1	11.0	10.8	10.9	11.3	11.7	12.4	13.0	13.4	13.8	12.3	13.8	10.8
15	13.0	12.3	12.2	12.0	11.8	11.7	11.7	11.8	12.1	12.5	13.0	13.2	13.6	15.7	11.7
16	10.9	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	11.1	11.3	11.7	11.8	11.9	11.9	12.2	14.1	10.5
17	08.3	07.4	06.9	06.3	06.8	07.0	07.2	07.7	08.0	08.1	08.2	08.5	09.3	12.0	06.3
18	06.2	05.6	05.3	05.3	05.2	05.1	05.2	05.2	05.2	05.2	05.2	05.1	06.7	08.5	05.1
19	04.0	03.5	03.0	02.7	02.7	02.6	02.5	02.1	02.1	02.0	01.9	01.8	03.6	05.1	01.8
20	03.1	02.8	03.2	03.3	03.5	04.1	05.0	06.0	06.9	07.5	07.9	08.2	03.3	08.2	01.0
21	08.8	08.5	08.2	08.0	07.9	08.0	08.3	08.9	09.6	10.0	10.2	10.2	09.4	10.9	07.9
22	07.5	07.3	07.1	07.0	07.0	07.1	07.2	07.7	07.9	08.0	08.0	08.0	08.7	10.8	08.0
23	06.0	05.9	05.7	05.4	05.9	06.3	06.2	06.3	06.6	06.7	06.9	07.0	06.8	07.9	05.4
24	05.0	04.1	04.0	03.9	03.9	04.1	04.3	05.2	06.0	06.1	06.0	06.0	05.7	07.0	03.9
25	03.9	03.5	03.2	03.0	03.0	03.1	03.2	03.8	04.3	04.6	04.9	05.0	04.5	06.0	03.0
26	04.4	03.7	03.6	04.2	04.3	05.3	06.2	06.8	07.3	07.5	07.7	08.1	05.4	08.1	03.6
27	09.3	09.5	10.0	10.0	09.9	09.9	10.0	10.0	10.0	09.9	09.8	09.7	09.5	10.0	08.2
28	06.0	05.7	05.7	05.7	05.8	06.2	06.5	06.9	07.1	07.2	07.2	07.3	02.1	09.3	05.7
29	08.7	08.7	08.9	08.9	08.8	08.4	08.9	09.1	09.1	09.0	08.9	08.9	08.4	09.1	07.3
30	07.7	07.6	07.1	06.7	06.6	06.6	06.8	06.9	07.1	07.3	07.4	07.8	07.6	09.0	06.6
31	06.5	06.9	06.8	06.7	06.6	06.5	06.5	06.6	06.8	06.8	06.8	06.9	07.2	07.9	06.5
M.	07.65	07.38	07.18	07.11	07.13	07.26	07.55	07.94	08.29	08.48	08.60	08.70	08.28	10.38	06.40

Juni.

1	05.6	05.5	05.1	07.0	07.9	08.5	09.2	10.1	10.9	11.2	11.5	11.7	07.6	11.7	05.5
2	11.7	11.3	10.9	10.7	10.4	10.1	10.1	10.0	11.1	10.1	10.2	10.3	11.1	12.1	10.0
3	14.9	14.6	14.3	14.1	14.0	13.9	13.9	14.1	14.6	15.1	15.4	15.5	13.6	15.5	10.4
4	13.0	12.3	12.0	11.6	11.2	11.1	11.3	12.1	13.1	13.4	13.8	13.7	13.7	15.5	11.1
5	10.9	10.6	10.1	10.0	09.8	09.9	10.1	10.6	11.2	11.3	11.5	11.9	12.1	14.2	09.8
6	11.9	11.2	10.9	11.0	11.5	11.5	12.0	12.5	13.0	13.1	13.2	13.3	12.4	13.5	10.9
7	14.0	13.7	13.2	12.9	12.8	13.2	13.6	14.5	14.8	14.8	14.7	14.7	13.8	14.8	12.8
8	12.6	12.1	11.8	11.7	11.8	11.8	11.9	12.1	13.0	13.1	13.7	14.1	13.4	14.8	11.7
9	12.0	11.2	10.9	11.1	11.0	11.0	10.9	11.2	11.8	11.9	12.0	12.1	12.9	15.1	10.9
10	09.9	09.3	09.2	09.3	09.6	09.9	10.1	10.0	10.0	10.0	09.9	09.9	10.6	12.1	09.2
11	09.0	09.2	09.5	09.6	09.7	09.9	10.0	10.3	10.9	11.1	11.2	11.2	09.9	11.2	09.0
12	13.8	13.1	12.8	12.7	12.6	13.7	13.7	13.8	14.4	14.5	14.5	14.5	12.9	14.5	11.2
13	12.2	11.6	11.4	11.0	10.9	11.0	11.2	11.6	12.1	12.4	12.4	12.4	13.1	15.2	10.9
14	10.7	10.1	09.9	10.0	10.1	10.5	10.5	10.4	10.7	10.8	10.6	10.3	11.4	12.8	09.9
15	08.8	08.8	08.4	08.2	07.9	07.9	08.0	08.0	08.0	08.0	07.9	07.8	08.4	10.1	07.6
16	07.2	07.7	07.9	08.0	08.1	08.4	09.0	09.4	10.0	10.1	10.3	10.7	07.7	10.7	05.6
17	13.5	13.7	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	13.1	15.6	11.0
18	16.0	15.9	15.8	15.3	15.0	15.1	15.3	15.7	16.1	16.4	16.6	16.8	16.1	17.0	15.0
19	13.0	12.1	12.0	12.0	12.5	12.5	12.7	13.0	13.3	13.7	13.8	13.8	14.4	16.7	12.0
20	12.7	12.7	13.2	13.1	13.2	13.5	13.9	14.1	14.7	14.9	15.0	15.1	13.6	15.1	12.7
21	11.7	11.0	10.7	10.2	10.0	09.7	09.8	10.2	10.5	11.0	11.2	11.3	12.5	15.2	09.7
22	08.6	08.6	09.1	09.7	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.3	11.4	08.6
23	07.9	08.2	08.6	08.9	10.0	10.9	11.7	12.4	13.0	13.3	13.6	13.9	10.1	13.9	07.9
24	11.2	10.5	10.0	09.4	08.6	08.6	08.6	08.7	09.1	09.3	09.6	09.7	11.8	14.9	08.6
25	06.8	06.3	06.0	05.8	06.0	06.1	06.2	06.6	06.9	07.0	07.0	07.0	06.0	10.2	05.8
26	03.1	02.5	02.9	03.1	03.3	03.7	05.7	07.3	08.4	08.9	09.0	09.0	05.5	09.0	02.5
27	05.8	05.4	05.4	05.5	05.4	05.4	05.8	05.8	06.5	07.0	07.5	08.2	07.1	09.0	05.1
28	09.8	09.4	09.8	09.9	10.1	10.4	10.8	11.7	12.3	12.8	13.3	13.4	10.1	13.4	08.9
29	12.3	11.5	11.4	11.3	11.3	11.4	13.1	13.8	14.4	14.9	15.3	15.3	13.4	15.3	11.3
30	17.0	16.7	16.5	16.3	16.2	16.2	16.8	17.3	18.4	18.6	19.1	19.1	17.1	19.1	15.4
M.	10.92	10.56	10.47	10.43	10.49	10.65	10.79	11.38	11.90	12.13	12.32	12.42	11.61	13.65	09.71

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	19.2	19.2	19.0	19.1	19.2	19.2	19.3	19.2	18.9	18.3	17.7	17.3
2	16.5	16.3	16.1	16.1	15.9	15.7	15.4	15.3	15.0	14.2	13.4	12.9
3	14.7	14.3	14.1	14.0	13.8	13.7	13.3	13.0	12.8	12.1	11.7	11.2
4	13.0	12.8	12.7	12.5	12.3	12.1	11.9	11.7	11.3	10.9	10.1	09.6
5	13.4	13.5	13.5	13.6	14.2	14.6	15.0	15.3	15.4	15.5	15.6	15.3
6	17.0	16.9	16.6	16.6	16.7	17.0	17.1	17.4	17.5	17.2	16.9	16.7
7	17.7	17.6	17.5	17.4	17.4	17.4	17.6	17.6	17.5	17.4	17.1	16.4
8	14.2	13.8	13.5	13.2	13.1	13.0	12.4	12.4	12.3	12.1	12.0	11.7
9	12.2	12.1	11.9	11.8	11.7	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.8	12.2
10	13.8	13.7	13.5	13.4	13.5	13.7	13.9	13.9	13.7	13.2	13.0	12.8
11	13.7	13.7	13.4	13.3	13.3	13.6	13.7	13.7	13.5	13.0	12.7	12.2
12	11.0	11.0	10.9	10.9	14.1	14.2	14.1	14.1	14.3	14.2	14.1	13.9
13	12.8	12.5	12.2	12.1	12.0	11.9	11.5	11.1	10.8	10.1	09.6	08.8
14	01.9	05.2	05.6	05.9	06.7	07.1	07.9	08.7	09.2	10.0	10.8	11.1
15	15.8	16.6	16.1	16.2	16.7	17.2	17.7	17.6	17.4	17.0	16.3	16.0
16	17.7	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.5	17.2	16.7	16.1	15.6	15.0
17	15.1	15.1	15.0	15.1	15.2	15.5	15.1	15.2	14.7	14.0	13.6	12.8
18	14.6	14.6	14.7	14.9	15.5	15.5	15.5	15.5	14.9	14.6	13.8	13.4
19	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.7	13.6	13.2	12.6	12.0	11.4
20	12.1	11.8	11.6	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.2	12.0	11.7
21	11.8	12.4	13.0	13.3	13.8	13.9	14.1	14.7	14.9	14.9	14.8	14.6
22	15.7	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	15.9	15.7	15.1	14.5	14.0	13.5
23	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	11.6	11.0	10.5	09.8	09.2
24	12.5	12.3	12.2	12.3	12.4	12.5	12.7	12.8	12.9	12.8	12.3	11.7
25	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9	14.3	14.1	14.3	14.0	13.7	13.2	12.7
26	15.9	15.9	15.1	15.2	15.5	15.7	15.7	15.8	15.5	15.4	15.0	14.8
27	14.9	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.2	13.4	12.6	11.9	11.1
28	12.8	12.5	12.2	12.0	11.7	11.8	11.9	12.1	11.8	11.3	10.8	09.9
29	10.2	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.0	09.5	08.9	08.4	07.6	06.7
30	10.7	10.4	10.5	10.4	10.5	10.5	10.5	10.3	10.2	10.0	09.9	09.9
31	15.6	15.8	15.9	14.2	14.3	14.7	15.1	15.7	15.8	15.8	15.8	15.3
M.	13.85	13.77	13.73	13.74	13.85	13.96	14.01	13.97	13.75	13.43	13.06	12.64

August.

1	16.0	15.9	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.6	15.1	14.8	14.2	13.7
2	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.7	15.1	15.0	14.5	14.2	13.8	13.3
3	14.2	14.3	14.4	14.4	14.7	14.8	15.0	15.0	14.7	14.3	13.8	13.2
4	14.0	13.9	13.9	13.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.0	13.7	13.8	14.0
5	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	17.7	18.0	18.2	18.1	18.0	17.6	17.1
6	16.7	16.7	16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.4	15.6	15.2	14.4	13.7
7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.8	14.0	13.9	13.7	13.2	12.6	11.7
8	09.8	09.7	09.9	10.0	10.1	10.6	10.5	10.2	09.5	09.3	08.5	07.5
9	05.6	05.7	03.3	07.4	07.7	08.3	09.7	10.4	11.4	11.4	11.7	12.6
10	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	17.1	17.7	18.0	18.1	18.1	18.1	17.8
11	12.4	19.1	19.1	19.5	19.6	20.0	20.3	19.9	19.8	19.7	19.6	19.1
12	18.8	18.7	18.8	18.8	18.8	18.7	18.6	18.4	17.8	17.4	16.7	15.9
13	15.2	15.3	15.2	15.3	15.5	15.6	15.8	15.8	15.7	15.5	14.9	14.5
14	15.3	15.3	15.3	15.4	15.3	15.5	15.7	15.5	15.2	14.6	14.4	13.5
15	14.1	14.0	13.9	13.8	13.8	14.0	14.0	13.9	13.6	13.2	12.6	12.2
16	13.5	13.5	13.5	13.6	13.8	14.2	14.1	14.3	14.2	13.8	13.6	13.1
17	14.0	14.2	14.3	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2	15.0	14.6	14.3	13.7
18	15.3	15.6	15.6	15.7	15.6	15.9	16.4	16.2	15.9	15.5	15.1	14.6
19	15.2	15.2	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.2	16.0	15.8	15.6	15.1
20	16.6	16.6	16.7	16.7	16.9	17.1	17.3	17.0	16.9	16.5	16.1	15.6
21	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	17.0	17.4	17.4	17.3	17.0	16.4	16.0
22	17.1	17.2	17.4	17.6	17.7	17.8	18.1	17.9	17.8	17.4	17.0	16.5
23	16.7	16.6	16.5	16.5	16.6	16.7	16.7	16.6	16.1	15.7	15.1	14.4
24	16.8	16.8	16.7	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.0	16.0	15.8	15.4
25	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.6	14.5
26	14.5	14.5	14.6	14.7	14.9	15.0	15.2	15.2	15.1	15.1	14.9	14.8
27	15.2	15.2	15.2	15.3	15.4	15.6	15.8	15.7	15.6	15.2	14.7	14.3
28	14.3	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2	14.3	14.2	13.8	13.4	12.7	12.1
29	13.1	12.9	12.8	13.1	13.3	13.4	13.7	14.2	14.7	14.8	14.9	14.8
30	15.7	15.6	15.6	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.3	14.8	14.6	13.8
31	15.4	15.5	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	15.2	14.6	13.9	13.6
M.	14.98	14.90	15.00	15.12	15.21	15.40	15.60	15.56	15.37	15.08	14.71	14.26

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	17.0	16.4	16.1	15.6	15.4	15.5	15.5	15.8	16.1	16.3	16.4	16.5	17.4	19.3	15.4
2	12.3	12.1	12.1	12.2	12.7	12.8	13.8	14.3	14.8	14.9	14.9	14.8	14.4	16.5	12.1
3	10.9	10.8	10.7	11.0	11.1	11.3	11.5	12.2	12.9	13.1	13.2	13.1	12.5	11.7	10.7
4	09.3	09.1	09.0	09.1	10.1	10.3	10.8	11.3	12.2	12.6	13.1	13.3	11.3	13.3	09.0
5	15.4	15.5	15.3	15.1	15.1	15.2	15.3	15.8	16.0	16.4	16.9	17.0	15.2	17.0	13.4
6	16.6	16.5	16.6	16.6	16.6	17.1	17.3	17.4	17.7	17.8	17.8	17.8	17.1	17.8	16.5
7	15.9	15.7	15.3	15.0	14.7	14.6	14.7	14.6	14.8	14.7	14.8	14.6	16.2	17.7	14.6
8	11.8	11.9	12.2	12.2	11.9	12.0	12.0	12.0	12.6	12.7	12.7	12.6	12.5	14.2	11.7
9	12.3	12.3	12.3	12.2	12.3	12.3	12.8	12.9	13.4	13.7	13.7	13.8	12.3	13.8	11.6
10	12.2	11.9	11.8	11.7	11.8	11.9	12.3	12.8	13.0	13.2	13.4	13.8	13.0	13.9	11.7
11	11.9	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.5	12.8	13.2	13.5	13.8	13.9	12.9	13.9	11.5
12	13.7	13.6	13.5	13.5	13.1	13.0	12.9	13.0	13.3	13.3	13.4	13.1	13.7	14.4	12.9
13	08.1	07.7	06.8	06.4	05.9	05.9	05.7	05.5	05.4	05.1	04.8	04.6	08.7	12.8	04.8
14	11.6	11.7	11.9	12.2	12.6	13.3	13.7	14.3	15.0	15.4	15.6	15.9	10.7	15.0	04.9
15	15.7	15.0	14.8	14.4	14.4	14.8	15.1	15.6	16.3	16.9	17.4	17.5	16.2	17.7	14.4
16	14.4	13.9	13.6	13.2	13.1	13.1	13.4	13.9	14.3	14.9	15.0	15.0	13.5	17.8	13.1
17	12.4	12.0	11.8	11.6	11.5	11.6	12.1	12.4	13.0	13.5	14.1	14.4	13.6	15.5	11.5
18	12.8	12.2	11.9	11.8	11.7	11.6	11.7	11.9	12.5	12.6	12.8	13.2	13.5	15.6	11.6
19	10.8	10.1	09.4	08.9	08.4	08.2	09.7	09.9	10.4	11.3	12.1	12.3	11.6	13.7	08.2
20	10.8	10.1	09.7	09.5	09.9	10.4	11.1	11.5	11.7	11.7	11.8	11.7	11.3	12.2	09.5
21	14.1	13.7	13.7	13.7	13.8	13.9	14.4	14.7	15.3	15.3	15.4	15.5	14.2	15.5	11.8
22	13.0	12.6	12.2	11.8	11.7	11.6	11.5	11.5	12.0	12.1	12.3	12.4	13.7	15.9	11.5
23	08.1	07.4	07.2	10.6	11.3	10.7	10.6	11.1	11.2	11.7	12.1	12.2	11.0	12.5	07.2
24	11.3	10.9	10.7	10.6	10.5	10.6	10.9	11.5	12.1	12.5	13.0	13.2	12.0	13.2	10.5
25	12.5	12.2	11.9	12.0	12.1	12.4	12.7	13.4	13.9	14.4	14.6	14.8	13.4	14.8	11.9
26	14.5	14.1	14.0	13.8	13.8	13.9	14.1	14.6	14.9	14.9	15.0	15.0	14.8	15.8	13.8
27	10.4	09.8	11.8	12.0	12.2	12.0	12.3	12.1	12.3	12.3	12.5	13.2	12.9	14.0	09.8
28	09.1	09.1	10.1	10.3	10.4	10.2	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.3	10.9	12.0	09.1
29	06.2	05.8	05.4	05.7	08.4	09.3	10.0	10.2	10.7	10.7	10.8	10.7	09.0	10.8	05.4
30	09.6	09.0	09.0	09.1	09.5	10.0	10.5	11.1	11.7	12.2	12.7	13.2	10.5	13.2	09.0
31	14.7	14.6	14.4	14.1	13.9	13.9	14.2	14.9	15.2	15.8	15.8	15.9	14.8	15.9	13.6
M.	12.26	11.91	11.84	11.86	12.00	12.12	12.42	12.74	13.16	13.42	13.62	13.73	13.12	14.95	11.05

August.

1	12.9	12.3	12.0	11.8	11.7	11.8	12.3	12.6	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	16.0	11.7
2	12.7	12.5	12.2	12.0	11.8	11.9	12.2	12.8	13.2	13.5	13.8	14.1	13.5	15.1	11.8
3	12.9	12.2	11.9	12.0	12.0	12.5	13.1	13.8	13.9	14.0	14.1	14.0	13.7	15.0	11.9
4	14.4	14.4	14.1	13.9	13.6	14.6	15.1	16.0	16.8	17.2	17.3	17.3	14.7	17.3	13.6
5	16.5	16.0	15.8	15.5	15.4	15.4	15.6	16.0	16.5	16.6	16.7	16.7	16.8	18.2	15.4
6	12.9	12.2	11.8	11.6	11.5	11.5	11.8	12.4	12.7	12.8	13.0	13.4	14.1	16.7	11.5
7	10.9	10.2	09.7	09.2	08.9	08.7	08.8	08.9	09.0	09.5	09.5	09.7	11.4	14.0	08.7
8	07.2	06.3	05.4	04.7	04.2	04.1	04.0	04.2	04.6	04.7	04.8	05.4	07.3	10.6	04.0
9	12.5	12.3	12.1	12.0	12.1	12.6	12.9	13.8	14.6	14.8	15.0	15.3	11.2	15.3	05.6
10	17.8	17.8	17.8	17.7	17.8	17.9	18.1	18.6	19.1	19.1	19.3	19.4	17.7	19.4	15.4
11	18.9	18.8	18.7	18.5	18.1	18.1	18.3	18.4	18.7	18.8	18.9	18.8	19.1	20.3	18.1
12	15.1	14.5	14.1	13.7	13.5	13.5	13.5	14.0	14.5	14.6	14.9	15.0	16.2	18.7	13.5
13	14.1	13.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.6	14.2	14.6	14.9	15.1	15.2	14.7	15.8	13.3
14	13.0	12.6	12.3	12.4	12.5	12.5	12.9	13.5	13.7	14.0	14.0	13.9	14.1	15.7	12.3
15	11.7	11.4	11.1	11.0	11.0	11.3	11.8	12.7	13.2	13.4	13.5	13.5	12.9	14.1	11.0
16	12.7	12.3	11.7	11.5	11.4	11.5	12.2	12.4	13.0	13.3	13.7	13.8	13.1	14.4	11.4
17	13.4	13.0	13.0	12.9	13.0	13.0	13.4	13.8	14.3	14.5	14.7	15.1	14.1	15.2	12.9
18	14.6	14.6	14.3	13.9	13.5	13.4	13.6	14.1	14.4	14.5	14.8	15.0	14.9	16.1	13.4
19	14.8	14.4	14.1	13.8	14.0	14.4	15.1	15.4	15.8	16.0	16.2	16.5	15.3	16.5	13.8
20	15.4	14.9	14.6	14.3	14.1	14.2	14.4	15.1	15.5	15.9	16.4	16.4	15.9	17.3	14.1
21	15.6	15.4	15.0	14.9	15.0	15.1	15.4	15.9	16.2	16.3	16.6	16.9	16.3	17.4	14.9
22	16.1	15.7	15.5	15.4	15.1	15.2	15.3	15.7	16.0	16.4	16.4	16.6	16.6	18.1	15.1
23	13.8	13.1	13.0	13.3	13.6	13.7	14.2	15.2	18.5	18.6	17.8	16.8	15.7	18.6	13.0
24	14.9	14.5	14.0	13.6	13.5	13.5	13.6	14.8	15.1	15.3	15.2	15.1	15.3	16.8	13.5
25	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0	13.8	14.0	14.2	14.3	14.1	14.5	14.5	14.5	14.9	13.8
26	14.6	14.3	14.1	13.8	13.7	13.7	13.8	14.1	14.5	14.7	15.0	15.1	14.6	15.2	13.7
27	14.0	13.7	13.5	13.4	13.4	13.5	13.8	14.2	14.6	14.6	14.5	14.5	14.6	15.8	13.4
28	11.4	10.7	10.0	09.6	10.0	10.8	11.4	12.1	12.6	12.9	13.3	13.3	12.7	14.3	09.6
29	14.5	14.3	14.2	14.0	14.2	14.4	14.7	15.2	15.4	15.5	15.4	15.0	14.3	15.6	12.8
30	13.5	13.2	12.8	12.7	12.7	12.9	13.4	14.0	14.3	14.6	14.9	15.1	14.5	15.7	12.7
31	13.0	12.3	11.8	11.5	11.4	11.3	11.5	11.7	12.5	13.4	14.4	15.3	13.8	15.6	11.3
M.	13.87	13.47	13.17	12.97	12.90	13.03	13.35	13.87	14.37	14.59	14.75	14.87	14.16	16.13	12.49

September. Luftdruck in Millimetern. 700 mm +

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	15.3	15.4	15.5	15.5	15.8	16.0	16.7	17.0	17.6	17.7	17.8	17.6
2	19.6	19.6	19.6	20.0	20.1	20.4	20.8	21.0	21.2	21.0	20.6	19.9
3	20.6	20.7	20.8	20.8	21.1	21.6	21.9	21.8	21.7	21.7	21.1	20.9
4	21.5	21.5	21.6	21.4	21.5	21.7	21.7	21.5	20.7	20.6	20.3	20.0
5	20.0	19.9	19.8	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.4	19.2	18.7	18.3
6	18.4	18.4	18.3	18.4	18.3	18.3	18.4	18.4	18.4	18.0	17.6	17.2
7	16.8	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.3	17.1	16.7	16.2	15.7
8	17.1	17.3	17.2	17.5	17.5	17.8	17.9	17.9	17.8	17.2	16.7	16.0
9	16.4	16.3	16.3	16.2	16.3	16.5	16.6	16.4	15.9	15.5	14.9	14.5
10	14.9	15.0	15.1	15.3	15.4	15.7	16.2	16.2	16.1	15.9	15.7	15.0
11	16.3	16.3	16.5	16.6	16.9	17.1	17.6	17.6	17.5	17.1	16.3	15.7
12	16.4	15.7	15.5	15.0	14.8	14.6	14.8	14.7	14.5	14.4	13.6	12.6
13	13.6	13.5	13.5	13.4	13.5	13.7	14.1	14.3	14.5	14.5	14.2	13.9
14	16.2	16.5	16.5	16.6	16.8	17.1	17.8	18.1	18.4	18.6	18.5	18.7
15	21.2	21.3	21.4	21.5	21.5	22.0	22.3	22.2	22.4	22.1	21.9	21.4
16	22.0	22.1	22.1	22.0	21.9	22.1	22.2	22.2	22.1	21.7	21.4	20.7
17	19.3	19.3	19.2	19.1	19.0	18.9	18.0	18.7	18.6	18.4	17.7	17.2
18	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.9	17.0	17.0	16.9	16.5	16.0	15.0
19	14.5	14.8	14.9	15.1	15.2	15.5	16.2	16.7	16.9	16.9	16.8	16.6
20	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.6	16.5	16.2	15.9	15.5
21	15.6	15.7	15.7	15.8	15.9	16.1	16.5	16.5	16.1	15.6	14.9	14.4
22	14.0	14.1	14.0	13.9	13.9	14.1	14.2	14.3	14.3	14.1	13.5	13.2
23	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.3	13.4	13.2	12.6	12.2	11.5
24	12.1	12.1	11.8	11.4	11.2	11.3	11.4	11.4	11.4	11.3	10.5	9.7
25	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.7	9.9	10.1	10.1	10.2	9.5	8.1
26	11.1	11.2	11.3	11.5	11.5	11.6	11.9	12.1	12.2	12.0	11.8	11.3
27	11.4	11.4	11.3	11.2	11.2	11.2	11.3	11.2	10.9	10.5	9.8	9.0
28	08.8	08.7	08.6	08.3	08.0	07.7	07.2	07.1	06.9	06.8	07.0	07.1
29	10.0	10.0	09.9	10.1	10.1	10.3	10.5	11.0	11.1	11.3	11.3	11.3
30	09.7	09.5	09.3	08.7	08.5	08.3	07.9	07.6	07.5	07.3	06.7	06.3
M.	15.62	15.63	15.60	15.59	15.61	15.76	15.97	16.01	15.93	15.72	15.30	14.84

October.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06.6	06.8	07.1	07.6	07.8	08.2	09.0	09.1	09.4	09.8	09.8	09.7
2	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	13.7	14.1	14.2	14.4	14.2	12.9	13.5
3	14.4	14.6	14.5	14.5	14.8	15.3	15.7	15.8	15.7	15.6	15.3	14.6
4	16.2	16.1	16.2	16.3	16.4	16.6	17.0	17.1	17.0	16.9	16.7	15.9
5	17.6	17.6	17.6	17.6	17.7	17.8	18.2	18.4	18.1	17.6	17.0	16.3
6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.0	16.0	16.0	15.7	15.2	14.5	13.6	12.7
7	11.9	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	11.0	11.0	10.9	10.7	10.2	10.0
8	09.8	09.7	09.6	09.6	09.6	09.6	09.6	09.8	09.8	09.7	09.6	08.9
9	09.2	09.4	09.3	09.4	09.6	09.8	10.1	10.5	10.8	10.9	11.4	11.4
10	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.8	15.3	15.5	15.5	15.2	14.8
11	14.6	14.3	13.9	13.6	13.5	13.2	12.9	12.9	12.6	12.4	11.8	11.0
12	06.9	06.5	06.5	06.4	06.3	05.7	05.6	05.9	06.1	06.7	07.4	07.4
13	07.7	07.7	07.6	07.6	07.7	07.9	08.1	08.1	08.6	08.7	08.6	08.6
14	09.4	09.2	08.9	09.0	09.0	09.3	09.4	09.7	09.6	09.4	08.8	08.0
15	02.8	02.3	01.2	00.7	00.2	99.9	99.4	99.0	98.7	98.6	98.1	97.8
16	96.8	96.7	96.1	95.9	95.6	95.5	96.5	96.5	96.8	96.6	96.5	96.4
17	98.5	98.4	98.0	97.8	97.8	97.3	97.2	96.7	95.7	94.7	93.6	93.1
18	98.3	98.7	99.0	99.4	99.7	99.8	00.1	00.5	00.6	00.0	00.4	98.8
19	98.7	99.0	99.1	99.4	99.6	00.6	00.5	00.8	01.0	00.9	00.8	00.7
20	01.8	01.9	02.3	02.8	03.5	03.9	04.7	05.5	06.0	06.6	06.9	07.1
21	11.6	11.8	11.7	12.1	12.7	12.8	13.0	13.2	13.3	13.1	12.7	12.2
22	14.0	14.2	14.3	14.8	15.0	15.2	15.9	16.2	16.3	16.6	16.5	16.5
23	19.7	19.8	19.7	19.8	19.9	20.0	20.5	20.8	20.7	20.3	19.9	19.3
24	18.7	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.5	18.5	18.3	17.6	16.9	15.8
25	13.7	13.6	13.6	13.6	16.0	16.2	16.6	16.6	16.5	16.3	15.5	15.1
26	17.8	17.8	17.8	17.7	17.7	17.9	18.1	18.7	19.1	19.0	18.9	18.4
27	17.8	17.7	17.6	17.7	17.7	17.8	17.9	18.1	18.1	17.9	17.3	16.6
28	16.8	16.5	16.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.5	16.4	15.9	15.4	14.9
29	14.3	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	15.0	14.8	14.3	13.6	12.8
30	10.3	09.6	09.2	09.1	09.1	09.0	09.0	09.2	09.1	09.0	08.9	08.6
31	09.3	09.3	09.2	09.1	09.2	09.2	09.3	09.4	09.4	09.3	08.8	08.5
M.	10.69	10.65	10.55	10.58	10.66	10.71	10.91	11.13	11.13	10.95	10.61	10.18

Luftdruck in Millimetern. 700 mm + September.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	17.5	17.1	16.9	16.7	16.6	16.9	17.5	18.2	18.7	18.9	19.1	19.4	17.1	19.4	15.3
2	19.6	19.0	18.7	18.3	18.2	18.2	18.6	19.3	19.9	20.2	20.3	20.5	19.8	21.2	18.2
3	20.4	20.0	19.8	19.6	19.7	19.9	20.4	20.7	21.0	21.2	21.4	21.5	20.8	21.9	19.6
4	19.6	19.2	18.9	18.8	18.8	18.8	19.1	19.4	19.8	19.9	19.9	19.9	20.3	21.7	18.8
5	17.7	17.4	17.2	17.0	16.9	17.0	17.2	17.5	18.0	18.2	18.3	18.3	18.6	20.0	16.9
6	16.7	16.2	15.7	15.3	15.1	15.2	15.4	16.0	16.2	16.5	16.7	16.9	17.1	18.4	15.1
7	15.5	15.2	14.8	14.6	14.6	14.7	15.4	15.9	16.2	16.4	16.7	17.0	16.2	17.3	14.6
8	15.6	15.3	14.9	14.8	14.7	14.8	15.3	15.6	16.0	16.2	16.3	16.4	16.4	17.9	14.7
9	14.1	13.5	13.3	13.1	12.9	12.9	13.0	13.7	13.9	14.0	14.5	14.8	14.8	16.6	12.9
10	14.8	14.3	14.0	13.8	13.8	13.9	14.4	15.0	15.4	15.5	15.9	16.1	15.1	16.2	13.8
11	15.2	14.2	14.0	13.6	13.5	13.7	14.2	15.0	16.5	17.7	18.2	17.3	16.0	18.2	13.5
12	11.8	11.3	10.8	10.5	11.1	11.7	12.6	13.4	13.5	13.5	13.6	13.5	13.5	16.4	10.5
13	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	14.1	14.5	15.2	15.7	15.9	16.0	16.0	14.3	16.0	13.4
14	18.7	18.4	18.2	18.2	18.3	18.6	19.3	19.8	20.3	20.5	20.7	21.1	18.4	21.1	16.2
15	20.8	20.5	20.3	20.3	20.2	20.2	20.5	21.2	21.4	21.8	22.0	22.0	21.4	22.4	20.2
16	20.2	19.7	19.2	18.6	18.4	18.3	18.5	18.7	19.0	19.2	19.2	19.3	20.5	22.2	18.3
17	16.4	16.0	15.6	15.3	15.2	15.2	15.3	15.9	16.1	16.3	16.6	16.7	17.3	19.3	15.2
18	14.4	13.8	13.3	13.0	12.8	12.9	13.1	13.3	13.7	14.0	14.2	14.3	15.1	17.0	12.8
19	15.9	15.7	15.6	15.7	16.0	16.5	16.6	16.8	17.1	17.0	16.9	16.7	16.1	17.1	14.5
20	14.9	14.3	14.3	14.2	14.3	14.4	14.9	15.1	15.3	15.5	15.5	15.5	15.6	16.6	14.2
21	13.4	12.8	12.3	12.1	12.0	12.2	12.8	13.1	13.3	13.5	13.8	13.9	14.3	16.5	12.0
22	12.5	12.0	11.4	11.3	11.4	11.8	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1	13.1	14.3	11.3
23	11.1	10.7	10.4	10.2	10.3	10.7	12.1	12.5	12.6	12.7	12.4	12.1	12.2	13.4	10.2
24	08.8	08.3	08.2	08.3	08.4	08.8	09.4	09.5	09.5	09.6	09.7	09.5	10.2	12.1	08.2
25	08.8	08.7	08.7	08.8	09.1	09.8	10.4	10.7	11.0	11.4	11.4	11.1	09.8	11.1	08.7
26	10.9	10.3	10.1	10.0	09.9	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5	11.5	11.1	12.2	09.9
27	08.4	08.0	07.8	06.5	07.5	07.6	07.8	07.9	08.3	08.5	08.9	08.9	09.5	11.3	07.5
28	07.2	07.3	07.4	07.4	07.7	07.8	08.0	08.8	09.3	09.6	09.8	09.8	08.0	09.8	06.9
29	11.2	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	10.4	10.9	10.6	11.3	09.9
30	05.6	05.3	05.1	04.8	04.9	05.1	05.4	05.8	06.0	06.1	06.3	06.4	06.8	09.7	04.8
M.	14.38	13.97	13.72	13.54	13.56	13.75	14.17	14.60	14.94	15.16	15.31	15.31	15.00	16.63	13.27

October.

1	09.7	09.7	09.7	10.0	10.6	11.2	11.6	12.2	12.6	13.0	13.3	13.5	09.9	13.5	06.6
2	13.2	12.7	12.4	12.2	12.2	12.5	12.9	13.2	13.8	13.8	13.9	14.2	13.5	14.4	12.2
3	14.2	14.2	14.0	13.9	14.0	14.3	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.9	14.9	15.9	13.9
4	15.4	15.0	15.0	15.1	15.4	15.8	16.3	16.6	17.0	17.3	17.4	17.5	16.3	17.5	15.0
5	15.6	15.2	14.8	14.7	14.9	15.4	15.8	16.3	16.4	16.6	16.6	16.6	16.7	18.4	14.7
6	12.0	11.3	10.8	10.6	10.4	10.5	10.8	11.1	11.5	11.7	11.8	11.8	13.3	16.5	10.4
7	09.7	09.6	09.4	09.3	09.4	09.6	09.7	09.7	09.7	09.8	09.8	09.7	10.3	11.9	09.3
8	08.5	08.0	07.7	07.6	07.6	07.9	08.2	08.4	08.9	09.0	09.0	09.1	09.0	09.8	07.6
9	11.3	11.1	11.1	11.4	11.6	11.8	12.4	12.5	12.7	13.0	13.5	13.8	11.2	13.8	09.2
10	14.5	14.3	14.1	14.0	14.0	14.2	14.5	14.6	15.0	14.8	14.8	14.6	14.5	15.5	14.0
11	10.3	09.7	09.2	08.9	08.7	08.3	08.3	08.0	07.6	07.3	07.2	07.1	10.7	14.6	07.1
12	07.3	07.3	07.3	07.4	07.3	07.6	07.5	07.8	08.1	08.1	08.0	07.8	07.1	08.1	05.9
13	08.3	08.0	07.9	07.7	07.9	08.5	08.7	08.9	09.2	09.2	09.4	09.3	08.3	09.4	07.6
14	07.0	06.4	05.8	05.3	05.0	04.9	04.7	04.6	04.4	04.3	03.9	03.2	07.1	09.7	03.2
15	97.4	97.0	96.4	95.8	95.8	96.0	96.1	96.4	96.9	97.3	97.1	97.0	98.3	92.8	95.8
16	96.0	95.8	95.9	96.2	96.5	97.0	97.6	97.9	98.4	98.5	98.6	98.6	96.8	98.6	95.5
17	92.2	92.3	91.6	91.1	91.3	92.2	93.5	95.3	95.7	95.9	96.9	97.5	95.2	98.5	94.1
18	98.4	97.5	97.4	97.4	97.4	97.7	97.5	97.5	97.6	97.9	98.0	98.3	98.6	90.6	97.1
19	00.6	00.3	00.3	00.3	00.3	00.5	00.5	00.6	01.0	01.2	01.2	01.4	00.4	01.4	98.7
20	07.5	07.7	08.0	08.5	08.7	09.4	10.0	10.5	11.1	11.3	11.1	11.4	07.0	11.4	01.8
21	12.1	11.7	11.5	11.4	12.2	12.7	13.3	13.6	14.0	14.0	13.9	13.9	12.7	14.0	11.4
22	16.4	16.5	16.7	16.8	17.4	17.8	18.3	18.8	19.1	19.1	19.3	19.5	16.7	19.5	14.0
23	18.7	18.4	18.2	17.9	17.9	18.3	18.4	18.6	18.7	18.7	18.6	18.7	19.2	20.8	17.9
24	15.0	14.3	14.2	14.3	14.5	14.8	15.2	15.5	15.7	15.9	15.8	15.7	16.6	18.7	14.2
25	14.5	14.1	14.2	14.5	14.7	15.5	16.0	16.4	17.0	17.3	17.4	17.5	15.9	17.5	14.1
26	18.0	17.6	17.5	17.3	17.3	17.7	18.0	18.1	18.1	18.2	18.1	17.9	18.0	19.1	17.3
27	16.1	15.7	15.5	15.5	15.6	16.1	16.2	16.4	16.7	16.8	16.9	16.7	16.9	18.1	15.5
28	14.1	13.4	13.1	12.9	13.0	13.5	13.6	13.5	13.8	14.0	14.1	14.2	14.9	16.8	12.9
29	12.0	11.2	11.2	11.3	11.5	11.9	12.1	12.3	12.2	11.8	11.3	10.7	13.0	15.0	10.7
30	08.0	07.4	07.6	08.1	08.1	08.5	08.6	08.7	09.1	09.1	09.2	09.2	08.8	10.3	07.4
31	07.9	07.8	07.6	07.7	07.8	08.2	08.3	08.4	09.0	09.3	09.4	69.3	08.8	09.4	07.6
M.	09.74	09.39	09.23	09.20	09.32	09.69	09.98	10.25	10.53	10.63	10.69	10.70	10.33	12.31	08.39

November. Luftdruck in Millimetern. 700 mm +

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	09.3	09.2	08.9	08.8	08.7	08.4	08.3	08.1	07.9	07.8	07.8	06.9
2	12.3	12.9	13.1	13.9	14.9	15.0	15.7	15.8	16.1	16.2	16.0	15.6
3	16.6	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.6	16.5	16.3	16.0	15.3	14.8
4	13.8	13.6	13.4	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.4	13.1	12.7	11.9
5	12.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.8	11.6	11.6	11.4	11.3	10.9	10.2
6	11.0	11.2	11.4	11.7	12.0	12.3	12.8	13.5	14.1	14.7	15.2	15.4
7	17.1	17.0	16.7	16.6	16.6	16.6	16.8	17.0	16.9	16.7	16.4	15.3
8	15.5	15.6	15.6	15.6	15.8	15.8	16.0	16.2	16.2	16.2	15.9	15.2
9	16.2	16.2	16.1	16.2	16.3	16.4	16.8	17.0	17.2	17.1	16.7	16.3
10	16.8	16.8	16.9	16.9	17.0	17.0	17.2	17.5	17.2	17.0	16.4	15.4
11	16.7	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	17.1	17.3	17.4	17.3	16.3	16.2
12	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.7	15.8	15.7	15.4	15.1	14.2
13	13.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	13.5	13.8	14.2	14.3	14.2	14.0
14	16.8	16.9	17.1	17.1	17.3	17.4	17.6	17.8	17.9	17.9	17.8	17.5
15	19.8	19.8	19.7	19.6	19.6	20.0	20.3	20.3	20.0	19.5	19.1	18.7
16	18.7	18.7	18.7	18.6	18.2	18.2	18.3	18.5	18.5	18.4	18.5	18.3
17	16.9	16.8	16.5	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.2
18	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.2	16.4	16.8	17.0	16.9	16.5	16.3
19	18.1	18.2	18.3	18.3	18.4	18.4	18.5	19.0	19.2	19.1	18.5	18.1
20	18.8	19.0	19.0	18.7	18.6	18.8	19.1	19.3	19.3	19.0	18.4	17.5
21	16.8	16.7	16.4	16.3	16.1	16.0	15.7	15.6	15.2	15.0	14.3	13.1
22	08.0	07.8	07.4	07.0	06.6	06.3	06.1	06.0	05.9	05.3	04.9	04.2
23	03.4	03.3	03.3	03.2	02.9	02.9	02.7	02.4	02.3	02.4	01.8	01.0
24	04.8	04.3	04.1	04.2	04.1	04.2	04.2	04.3	04.3	04.1	04.0	03.4
25	05.4	05.6	05.9	06.5	06.8	07.2	07.4	07.5	07.4	07.7	07.8	07.0
26	03.1	02.5	01.8	02.6	01.8	01.9	02.1	02.4	03.7	04.4	06.1	06.8
27	04.4	04.2	03.1	02.0	01.7	01.0	02.4	03.6	04.2	05.0	05.6	06.2
28	01.6	02.1	02.4	02.5	02.6	02.9	03.5	03.9	04.0	04.0	03.8	03.2
29	02.6	03.0	02.6	02.6	02.5	02.4	02.6	02.7	03.0	03.2	03.0	02.9
30	02.0	02.2	02.2	02.3	02.4	02.6	03.1	03.8	04.6	05.3	05.8	06.2
M.	10.79	10.81	10.70	10.70	10.69	10.71	10.93	11.12	11.23	11.22	11.05	10.60

December.

1	12.5	12.8	13.1	13.3	13.4	13.6	14.2	14.9	15.2	15.8	16.1	16.1
2	17.5	17.6	17.6	17.7	17.6	17.4	17.4	17.5	17.7	17.7	17.6	17.1
3	15.7	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.8	16.3	16.4	16.4	16.3
4	17.6	17.6	17.8	17.8	17.7	17.7	17.9	18.1	18.5	19.0	19.0	19.0
5	21.4	21.3	21.1	21.0	20.7	20.4	20.4	20.6	21.1	21.2	21.0	20.5
6	20.9	21.0	20.9	20.8	20.7	20.9	21.0	21.2	21.2	21.3	21.0	20.3
7	18.8	18.8	18.5	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.4	17.1	16.2	15.8
8	09.5	09.3	09.7	11.5	12.1	12.2	12.3	13.3	13.3	13.8	13.8	13.6
9	17.7	17.9	18.0	18.0	17.9	17.7	17.4	17.6	17.6	17.5	17.1	16.3
10	16.3	17.1	17.5	18.1	18.8	19.5	20.3	21.4	22.1	23.0	23.0	22.9
11	23.9	24.3	24.7	25.0	25.2	25.7	25.8	26.1	26.4	26.9	26.6	26.4
12	26.6	26.7	26.7	26.4	25.8	25.7	25.5	25.6	25.7	25.7	25.3	24.4
13	20.1	20.0	19.8	19.5	19.0	18.6	18.5	18.7	19.2	19.6	19.8	19.3
14	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	17.7	18.0	18.5	18.7	18.7	18.1	17.2
15	12.1	11.5	10.6	09.7	09.1	08.3	07.4	07.2	07.1	07.3	07.1	07.3
16	10.7	10.4	09.9	10.6	10.9	11.5	12.1	12.6	13.2	13.7	14.4	14.9
17	18.7	18.6	18.7	18.7	18.8	19.0	19.4	20.1	20.5	21.0	21.3	21.1
18	21.4	21.4	21.4	21.2	20.8	20.7	20.8	20.8	20.9	21.0	20.9	20.3
19	18.2	18.0	18.0	17.6	17.0	16.7	16.4	16.0	15.9	15.5	14.8	14.1
20	11.5	11.6	11.4	11.5	11.3	11.4	11.6	12.0	12.5	12.8	12.8	12.7
21	13.6	13.9	14.2	14.3	14.3	14.7	14.8	15.1	15.7	15.9	16.1	15.9
22	19.1	19.5	20.2	20.3	20.7	21.2	21.8	22.3	22.7	23.3	23.2	23.0
23	25.0	24.8	24.7	24.6	24.6	24.6	24.8	25.1	25.7	25.9	25.9	25.4
24	25.4	25.4	25.4	25.2	25.0	24.8	24.7	24.8	25.3	25.5	25.2	24.5
25	25.4	25.4	25.4	25.3	24.9	25.0	25.0	25.1	25.4	25.3	25.2	24.4
26	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	24.0	24.0	24.1	24.2	24.3	24.2	23.5
27	22.5	22.3	22.1	21.9	21.4	21.1	21.1	21.0	21.1	21.2	21.0	20.2
28	14.7	14.5	14.3	13.9	13.5	13.2	13.0	12.8	12.8	12.6	12.3	11.5
29	11.2	11.3	11.2	11.1	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.1	10.6
30	03.4	02.9	02.2	02.1	02.1	02.0	02.0	01.9	01.9	02.0	02.0	01.6
31	05.2	05.7	06.3	06.6	06.8	07.3	08.0	08.7	09.6	09.7	09.7	09.2
M.	17.38	17.41	17.41	17.41	17.30	17.32	17.42	17.66	17.95	18.14	18.01	17.58

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	06.5	06.0	06.1	06.7	07.5	08.0	08.6	09.2	09.7	10.6	11.1	11.7	08.4	11.7	06.0
2	15.2	15.0	14.9	14.8	15.1	15.6	16.2	16.4	16.7	16.7	16.7	16.6	15.3	16.7	12.3
3	13.9	13.3	12.9	12.8	12.9	13.0	13.2	13.4	13.7	13.7	13.7	13.7	14.8	16.6	12.8
4	11.1	10.6	10.5	10.6	10.9	11.2	11.7	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3	12.3	13.8	10.5
5	09.7	09.2	09.1	09.2	09.4	09.8	10.1	10.2	10.5	10.6	10.8	11.1	10.8	12.2	09.1
6	15.4	15.3	15.4	15.7	15.8	16.4	16.5	16.6	17.1	17.2	17.2	17.2	14.6	17.2	11.0
7	15.1	14.5	14.4	14.4	14.5	14.8	14.9	15.2	15.4	15.4	15.4	15.5	15.8	17.1	14.4
8	14.7	14.4	14.3	14.4	14.7	15.1	15.6	15.8	16.0	16.0	16.1	16.3	15.5	16.3	14.3
9	16.0	15.5	15.4	15.3	15.5	15.8	16.1	16.2	16.3	16.4	16.6	16.8	16.3	17.2	15.3
10	14.8	14.1	14.1	14.3	14.9	15.3	15.9	16.3	16.5	16.6	16.7	16.8	16.2	17.5	14.1
11	15.6	15.0	14.9	15.0	15.0	15.2	15.4	15.5	15.6	15.7	15.7	15.7	16.1	17.4	14.9
12	13.8	13.0	12.8	12.7	12.9	13.0	13.3	13.3	13.5	13.5	13.3	13.1	14.3	15.8	12.8
13	13.7	13.5	13.5	13.8	14.5	14.8	15.4	15.6	16.2	16.5	16.6	16.7	14.3	16.7	12.9
14	17.2	16.8	16.8	17.4	17.9	18.6	18.9	19.5	19.9	19.9	20.0	19.9	18.0	20.0	16.8
15	18.2	17.8	17.6	17.7	17.9	18.2	18.3	18.6	18.9	18.9	18.8	18.7	19.0	20.3	17.6
16	17.9	17.4	17.3	17.3	17.3	17.4	17.5	17.4	17.5	17.4	17.4	17.3	17.9	18.7	17.3
17	16.1	15.7	15.7	15.5	15.8	15.7	15.9	16.1	16.2	16.4	16.5	16.5	16.2	16.9	15.7
18	16.3	16.1	15.6	15.5	15.7	16.2	16.7	17.1	17.0	17.1	17.7	18.1	16.6	18.1	15.5
19	17.4	17.1	16.9	17.0	17.1	17.5	17.9	18.4	18.8	18.9	18.9	18.8	18.2	19.2	16.9
20	17.2	16.5	16.3	16.2	16.2	16.5	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.7	17.7	19.0	16.2
21	11.9	11.1	10.4	10.1	10.0	10.0	09.9	09.8	09.6	09.3	08.9	08.5	12.8	16.8	08.5
22	03.7	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5	03.4	03.4	03.4	03.4	03.5	03.6	04.9	08.0	03.1
23	00.3	99.5	99.1	98.5	98.2	97.6	97.1	96.6	96.2	96.1	96.0	95.3	00.1	03.4	95.3
24	92.7	92.6	92.6	92.6	92.7	93.0	93.3	93.6	94.2	94.5	94.9	95.3	93.8	95.3	92.6
25	96.9	96.8	96.4	96.1	95.1	95.3	95.4	94.9	94.2	94.1	94.0	93.7	96.0	97.8	93.7
26	96.8	96.7	96.7	96.8	96.9	97.4	97.3	97.4	97.3	97.2	96.2	95.5	95.1	97.3	91.8
27	96.2	96.1	96.5	97.2	97.7	98.4	98.8	99.7	00.2	00.7	01.0	01.5	96.1	01.5	91.0
28	02.9	02.7	02.6	02.6	02.7	02.7	02.7	03.1	03.2	03.3	02.9	02.8	02.9	04.0	01.6
29	02.4	03.0	02.7	02.7	02.7	03.2	03.0	03.1	03.0	02.8	02.5	02.2	02.8	03.2	02.2
30	06.8	07.5	08.2	08.5	09.0	09.4	10.1	10.3	10.8	11.1	11.6	12.1	06.6	12.1	02.0
M.	10.21	09.86	09.76	09.83	09.99	10.29	01.53	10.71	10.88	10.96	10.99	11.00	10.65	12.59	08.61

December.

1	16.0	15.8	15.9	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.4	17.4	17.5	17.5	15.5	17.5	12.5
2	16.6	15.9	15.7	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.1	16.4	16.3	16.0	16.8	17.7	15.7
3	16.3	16.0	16.2	16.3	16.4	16.7	17.1	17.3	17.6	17.7	17.7	17.6	16.4	17.7	15.4
4	18.4	18.1	18.1	18.4	18.9	19.6	20.1	20.6	21.1	21.2	21.3	21.4	19.0	21.4	17.6
5	20.0	19.5	19.3	19.3	19.6	20.0	20.2	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	20.5	21.4	19.3
6	19.8	19.0	19.0	18.9	18.9	19.1	19.2	19.3	19.4	19.4	19.3	19.0	20.1	21.3	18.9
7	14.4	13.5	13.0	12.7	12.6	12.6	12.6	12.2	11.5	10.9	10.7	10.1	14.9	18.8	10.1
8	13.3	13.2	13.3	13.7	14.3	15.1	15.8	16.1	16.6	17.0	17.3	17.5	13.7	17.5	09.3
9	15.5	14.8	14.5	14.2	13.9	14.1	14.1	14.0	14.3	14.8	15.3	15.9	16.1	18.0	13.9
10	22.8	22.8	23.1	23.2	23.4	23.6	23.8	23.6	23.5	23.5	23.6	23.8	21.7	23.8	16.3
11	26.3	26.0	25.6	26.3	26.4	26.8	27.2	27.0	27.0	26.8	26.6	26.5	26.1	27.2	23.9
12	23.7	23.0	22.6	22.5	22.4	22.0	21.7	21.2	21.0	20.5	20.2	20.2	23.8	26.7	20.2
13	19.1	18.8	18.4	18.2	18.3	18.3	18.7	18.9	19.0	18.8	18.2	18.2	19.0	20.1	18.2
14	16.5	16.2	16.2	16.0	15.8	15.8	15.0	14.8	14.5	14.0	13.3	12.7	16.6	18.7	12.7
15	07.6	07.8	07.5	07.6	08.9	09.3	09.8	10.1	10.5	11.2	11.1	11.2	09.1	12.1	07.1
16	15.1	15.8	16.6	17.5	18.1	18.7	18.9	19.0	19.1	18.9	19.0	18.8	15.0	19.1	09.9
17	20.8	20.8	20.8	20.7	21.1	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.3	21.5	20.4	21.5	18.6
18	19.6	19.2	19.1	19.2	19.1	19.1	19.1	19.2	19.0	19.0	18.9	18.4	20.0	21.4	18.4
19	13.0	12.4	12.4	12.5	12.1	12.3	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8	11.4	14.3	18.2	11.4
20	12.5	12.8	12.4	12.5	12.7	13.0	13.5	13.4	13.4	13.3	13.5	13.5	12.5	13.5	11.3
21	15.8	15.7	15.8	15.9	15.9	16.0	16.7	17.0	17.4	18.1	18.3	18.9	15.8	18.9	13.6
22	22.6	22.4	22.4	22.7	23.2	23.5	23.7	24.5	25.0	25.1	25.1	25.1	22.6	25.1	19.1
23	24.8	24.4	24.3	24.2	24.5	24.8	25.0	25.1	25.4	25.5	25.5	25.4	25.0	25.9	24.2
24	24.1	23.7	23.5	23.6	24.0	24.3	24.5	24.7	25.0	25.1	25.3	25.4	24.8	25.5	23.5
25	24.1	23.5	23.3	23.4	23.4	23.5	23.6	23.7	23.9	24.0	24.0	24.1	24.4	25.4	23.3
26	22.8	22.3	22.1	22.1	22.1	22.2	22.4	22.6	22.8	22.8	22.9	22.7	23.3	24.3	22.1
27	18.9	18.3	17.5	17.2	16.7	16.5	16.2	16.0	15.6	15.3	15.2	15.1	19.0	22.5	15.1
28	11.2	11.1	10.9	11.0	11.1	11.0	10.9	10.6	10.2	10.1	10.3	10.8	12.0	14.7	10.1
29	10.1	09.5	09.1	08.8	08.1	07.8	07.1	06.2	05.7	05.1	04.4	03.9	09.1	11.5	03.9
30	01.7	01.3	01.4	01.9	02.3	02.5	03.2	03.6	04.4	04.4	04.4	04.7	02.6	01.7	01.3
31	06.8	08.4	08.4	08.4	08.5	08.5	08.4	08.1	08.0	07.6	07.4	06.8	07.9	09.7	05.2
M.	17.16	16.84	16.72	16.79	16.93	17.11	17.25	17.27	17.36	17.35	17.31	17.26	17.35	19.42	14.90

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	7.6	7.9	7.9	7.6	7.9	8.2	8.0	8.3	8.8	9.0	10.6	11.1
2	9.8	9.1	9.2	7.8	8.0	7.6	4.4	4.0	3.5	4.4	5.5	6.1
3	2.5	2.5	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.1	2.0	2.5	3.0	4.6
4	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	0.3	2.3
5	-2.9	-3.1	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	-3.1	-2.8	-3.0	-2.0	-0.7	1.0
6	-3.1	-3.3	-3.5	-3.2	-2.6	-1.8	-1.3	-1.3	-1.2	-0.3	1.1	2.3
7	-1.8	-2.1	-1.4	-1.5	-1.6	-1.2	-1.0	-0.6	-0.2	0.4	1.4	3.0
8	1.9	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.7	2.0	3.1	3.8	4.4
9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	2.0	3.6	2.5	3.3	4.3	5.7	5.9
10	2.1	2.4	1.7	2.0	2.1	0.9	0.5	0.0	-0.3	-0.1	2.1	4.2
11	0.8	0.2	0.4	0.7	0.7	1.0	1.3	1.1	1.1	2.0	3.2	4.6
12	2.2	1.2	0.7	0.0	-0.7	-1.3	-1.3	-1.7	-1.9	-0.7	1.0	2.6
13	-3.2	-3.4	-3.9	-4.0	-4.3	-4.4	-4.7	-4.6	-4.5	-3.5	-1.6	0.3
14	-3.2	-3.8	-4.1	-4.3	-4.2	-4.3	-5.1	-4.8	-4.1	-3.0	-1.5	1.4
15	0.4	-0.9	-0.6	-2.0	-3.1	-3.8	-4.0	-4.3	-4.4	-3.2	-0.8	2.0
16	4.2	-4.9	-5.2	-5.2	-5.2	-5.3	-5.4	-5.4	-5.0	-3.2	-0.8	1.7
17	4.6	-5.2	-5.5	-5.9	-6.4	-6.4	-6.4	-6.6	-6.3	-4.4	-1.7	0.1
18	5.5	-5.7	-6.2	-6.5	-6.8	-7.0	-7.1	-6.9	-6.4	-5.1	-2.4	-0.2
19	-5.8	-6.3	-6.7	-6.8	-7.1	-7.1	-7.2	-7.5	-6.9	-5.2	-2.7	0.1
20	-6.0	-6.4	-6.5	-7.2	-7.4	-7.5	-7.7	-7.7	-7.0	-5.1	-2.5	-0.2
21	6.5	-6.9	-7.2	-7.7	-7.6	-7.6	-8.2	-8.0	-7.6	-5.5	-2.8	-0.5
22	-5.0	-5.4	-5.9	-5.2	-4.8	-5.3	-5.6	-5.7	-5.0	-3.3	-0.6	2.2
23	0.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	1.0	1.3	2.1	3.4	4.3
24	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.9	2.4
25	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	2.0	3.0
26	1.5	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	2.3	3.3
27	1.1	0.3	-0.2	-0.7	-1.3	-1.5	-1.8	-1.9	-2.0	-1.2	0.0	1.9
28	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	1.1	1.8	3.2
29	1.0	-1.5	-1.7	-2.3	-2.6	-2.9	-2.9	-3.1	-2.9	-1.6	0.0	1.7
30	-2.2	-2.8	-2.8	-3.2	-3.7	-3.8	-3.8	-3.9	-3.5	-1.6	0.8	3.4
31	1.8	4.9	5.2	4.9	4.4	3.3	3.1	3.0	3.7	5.8	15.0	16.2
M.	-0.7	-0.9	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.6	-0.4	1.5	3.2

Februar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.5	2.2	2.3	1.9	2.3	2.9	1.7	1.3	1.6	1.8	3.1	4.6
2	2.7	1.7	1.2	0.2	0.2	0.0	0.4	0.8	1.2	2.4	4.2	7.7
3	4.8	4.9	4.5	2.5	3.0	2.9	2.9	2.7	2.2	2.2	1.8	1.7
4	1.7	-1.7	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.5	-2.0	-1.2	-0.7	-0.8	-1.2
5	1.6	-1.7	-1.5	-1.8	-1.9	-2.2	-2.4	-2.8	-2.1	-0.9	0.7	0.3
6	-3.0	-3.1	-3.6	-4.4	-4.8	-5.0	-4.8	-4.8	-4.4	-4.5	-3.8	-2.1
7	-8.1	-7.9	-7.6	-6.8	-7.5	-7.7	-7.6	-6.6	-5.7	-5.4	-2.9	-1.5
8	-4.0	-4.8	-4.5	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4	-3.6	-3.0	-1.6	0.3	0.0
9	-3.6	-3.7	-4.1	-3.6	-4.0	-3.8	-3.8	-3.5	-2.6	-2.1	-1.4	-1.4
10	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.4	-1.5	-1.7	-1.9	-1.0	0.0	1.3	1.8
11	-0.7	-7.0	-8.3	-9.7	-10.6	-11.1	-11.9	-12.7	-11.7	-10.0	-8.2	-6.2
12	-4.7	-4.8	-5.0	-5.4	-5.3	-5.7	-5.2	-4.8	-4.8	-3.3	-1.4	0.0
13	-6.5	-7.4	-7.7	-8.0	-8.7	-8.7	-9.5	-8.7	-7.5	-5.6	-3.8	-1.5
14	-7.4	-7.6	-6.9	-6.7	-6.9	-7.3	-7.0	-6.0	-4.8	-2.7	-1.4	0.1
15	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.6	2.4
16	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.9	2.2	3.3	4.4
17	5.8	4.8	4.6	3.6	3.9	2.7	2.0	2.2	1.3	1.3	1.5	1.4
18	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	0.9	1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.5	-0.1	0.2
19	-0.8	-0.9	-1.1	-1.1	-0.9	-1.1	-1.1	-0.8	-0.3	0.4	1.0	1.7
20	-3.9	-3.9	-4.6	-4.6	-6.2	-6.0	-6.0	-5.8	-4.9	-3.5	-2.9	1.6
21	-7.0	-7.9	-8.3	-8.8	-9.6	-8.7	-9.0	-7.6	-5.1	-1.4	0.0	1.2
22	-1.2	-2.1	-2.3	-2.4	-2.1	-2.7	-3.0	-2.7	-1.6	0.4	2.8	7.5
23	6.9	6.0	5.2	4.3	3.7	3.1	3.2	3.0	3.5	4.2	4.3	3.7
24	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	1.0	1.5	1.5	2.5	2.9
25	-0.9	-1.7	-1.7	-2.2	-2.8	-3.3	-3.7	-3.6	-2.4	-1.2	0.0	1.3
26	-1.8	-2.7	-3.1	-3.4	-3.9	-3.9	-4.0	-4.5	-4.1	-1.7	0.2	1.7
27	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	2.4	3.4
28	-0.8	-1.0	-0.9	-0.7	-1.0	-0.8	-0.6	-0.3	0.7	1.3	2.3	2.9
M.	-1.5	-1.8	-2.0	-2.3	-2.5	-2.6	-2.7	-2.5	-1.9	-0.9	0.2	1.3

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	11.6	10.5	10.3	9.8	9.9	9.6	9.3	7.8	8.9	8.8	8.6	8.9	9.0	11.6	7.6
2	6.8	7.1	7.0	6.2	5.8	4.5	4.1	4.2	4.3	3.1	3.0	2.6	5.8	9.8	2.6
3	5.5	5.5	5.6	4.1	2.4	2.0	0.5	-0.4	-0.6	-1.4	-2.0	-2.1	2.1	5.6	-2.1
4	3.3	4.5	4.9	3.2	1.3	0.2	-0.4	-1.0	-1.4	-2.2	-2.6	-2.9	-0.4	4.9	-2.9
5	1.3	2.0	1.9	1.4	0.1	0.0	-0.5	-1.0	-1.4	-2.1	-2.3	-2.7	-1.4	2.0	-3.3
6	3.2	4.7	4.0	3.5	2.0	1.0	0.1	0.0	-0.6	-1.2	-1.3	-1.3	-0.2	4.7	-3.5
7	4.7	4.9	5.6	4.7	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.4	2.2	1.8	1.4	5.6	-2.1
8	4.8	5.8	5.6	4.6	4.0	3.7	3.4	3.3	3.2	2.9	1.8	1.3	2.9	5.8	1.2
9	8.0	6.6	6.5	6.4	6.9	9.2	5.7	4.4	4.1	3.5	2.9	3.6	4.2	8.0	1.0
10	6.4	7.1	7.5	5.6	3.3	1.8	1.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	2.3	7.5	-0.3
11	5.8	5.7	5.7	5.0	4.0	3.7	2.5	1.7	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	5.8	0.2
12	4.1	5.0	5.4	4.5	2.4	0.5	0.0	-0.8	-1.4	-2.0	-2.6	-2.8	0.5	5.4	-2.8
13	2.1	3.5	3.7	2.3	0.5	-0.6	-1.4	-1.8	-2.2	-2.9	-3.1	-3.2	-1.9	3.7	-1.7
14	5.0	5.7	4.9	4.7	2.5	1.3	0.5	0.0	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.7	5.7	-5.1
15	4.4	6.8	6.4	4.3	1.3	-0.2	-1.0	-1.5	-1.9	-2.7	-3.4	-3.7	-0.7	6.8	-4.4
16	4.2	5.2	5.4	2.6	0.5	-1.2	-1.3	-1.9	-2.6	-3.2	-3.8	-4.2	-2.2	5.4	-5.4
17	2.5	3.5	4.2	2.0	0.5	-1.0	-1.7	-2.5	-3.2	-3.7	-4.7	-4.9	-2.8	4.2	-6.6
18	2.5	3.9	4.1	1.4	-0.4	-1.5	-2.6	-3.2	-3.5	-4.5	-5.1	-5.4	-3.3	4.1	-7.1
19	2.1	3.1	3.3	1.5	-0.1	-1.8	-2.2	-3.2	-3.6	-4.6	-5.1	-5.6	-3.6	3.3	-7.5
20	2.6	3.0	3.4	3.1	0.4	-1.7	-2.5	-3.1	-4.0	-4.9	-5.4	-5.9	-3.6	3.4	-7.7
21	1.6	2.8	3.5	3.3	0.8	-0.8	-2.0	-2.8	-3.4	-4.2	-4.2	-4.3	-3.6	3.5	-8.2
22	5.1	5.6	5.9	4.7	2.4	1.0	0.5	0.5	0.9	0.8	0.7	0.9	-0.9	5.9	-5.7
23	4.5	4.9	5.4	4.5	3.2	2.2	1.9	1.7	1.6	1.7	1.5	1.6	2.1	5.4	0.1
24	2.8	3.0	3.4	3.0	2.6	2.5	2.0	1.7	1.3	1.0	0.6	0.5	1.8	3.4	0.5
25	3.5	3.9	4.3	3.9	2.6	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.5	1.8	4.3	0.5
26	4.5	5.0	5.0	5.2	4.5	3.7	3.4	3.1	2.8	2.7	2.7	2.1	2.4	5.2	1.1
27	3.3	4.0	4.1	3.4	1.7	0.7	-0.2	-0.3	-0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	4.1	-2.0
28	2.9	3.1	3.8	3.5	1.9	0.6	1.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.3	-0.5	1.0	3.8	-0.5
29	4.0	5.1	5.9	5.0	2.6	0.9	0.3	-0.4	-0.6	-1.1	-1.9	-2.2	-0.1	5.9	-2.3
30	5.6	6.9	8.0	7.6	5.1	3.2	2.4	2.0	1.0	0.9	1.0	1.2	0.7	8.0	-3.9
31	15.0	10.5	8.0	7.1	7.5	7.4	6.0	6.3	4.4	4.4	4.7	2.8	6.5	16.3	1.8
M.	4.6	5.0	5.2	4.3	2.7	1.8	1.1	0.6	0.2	-0.2	-0.4	-0.6	0.7	6.3	-2.3

Februar.

1	4.6	4.8	4.9	5.2	4.4	4.1	3.5	3.2	3.6	3.3	2.9	2.8	3.2	5.2	1.3
2	9.9	12.1	13.2	13.7	12.0	9.9	11.8	1.8	8.5	10.0	8.6	7.1	6.2	13.2	0.0
3	1.1	0.8	0.3	0.5	0.5	-0.3	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	1.3	4.9	-1.3
4	-0.3	-0.1	-0.3	-1.0	-1.4	-1.5	-1.6	-1.9	-1.8	-1.9	-1.8	-1.5	-1.5	-0.1	-2.5
5	0.7	0.2	-0.6	-1.2	-1.6	-2.0	-2.1	-2.6	-2.7	-3.0	-2.9	-2.9	-1.6	0.7	-3.0
6	-1.7	-1.3	-1.1	-1.7	-3.1	-4.3	-5.7	-6.1	-7.3	-8.0	-7.9	-7.3	4.3	-1.1	-8.0
7	-1.0	-1.1	-1.1	-2.2	-2.6	-3.0	-2.9	-3.0	-3.2	-3.5	-3.8	-4.1	-4.5	-1.0	-8.1
8	1.4	1.3	1.0	0.0	-0.9	-1.1	-2.2	-2.4	-3.2	-4.0	-3.5	-3.5	-2.2	1.4	-4.8
9	-1.1	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.1	-1.1	-1.1	-2.2	-1.0	-4.1
10	1.4	1.0	0.5	-0.5	-1.4	-2.4	-2.7	-3.6	-4.6	-5.6	-7.0	-6.8	-1.7	0.5	-6.8
11	-3.6	-1.9	-1.3	-1.7	-2.0	-3.4	-4.1	-4.1	-3.9	-4.5	-4.5	-4.5	-6.4	-1.3	-12.7
12	1.2	1.4	1.8	1.2	0.7	-0.2	-0.4	-0.6	-1.5	-3.2	-4.8	-5.3	-2.5	1.8	-5.7
13	-0.1	1.2	0.6	-1.2	-1.7	-2.3	-2.8	-4.0	-4.6	-5.3	-6.2	-7.0	-4.5	1.2	-9.5
14	1.3	2.6	3.2	2.9	1.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	-2.1	3.2	-7.3
15	5.1	4.0	4.2	3.5	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.5	4.2	0.2
16	4.7	4.9	5.3	4.7	3.9	2.8	1.7	1.3	1.0	0.5	0.9	1.1	2.2	5.3	0.5
17	1.6	2.0	1.5	0.6	0.5	0.4	0.3	-0.1	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	1.6	5.8	-0.7
18	0.4	0.7	0.2	0.4	0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.6	-0.3	0.7	-1.0
19	1.9	1.9	1.9	1.2	0.3	0.0	-0.9	-0.9	-1.1	-2.1	-3.1	-3.0	-0.4	1.9	-3.1
20	-0.3	0.6	1.5	1.2	1.2	-0.8	-2.4	-3.6	-4.3	-4.7	-5.9	-6.7	-3.3	1.5	-6.7
21	2.4	3.6	6.3	6.5	6.4	3.9	1.6	0.2	-0.4	-0.3	-1.1	-2.2	-1.9	6.5	-9.6
22	6.8	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	8.2	7.6	7.2	7.0	7.2	7.2	3.3	8.2	-3.0
23	3.1	1.6	0.9	0.8	-0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	2.6	4.3	0.4
24	3.7	3.9	4.8	4.5	3.5	1.7	0.3	-0.3	-0.6	-0.6	-0.3	-0.6	1.4	4.8	-0.6
25	2.6	2.9	3.0	3.0	2.5	2.4	1.4	0.7	0.0	-1.0	-1.4	-1.6	-0.3	3.0	-3.7
26	3.3	3.5	4.1	4.8	3.6	1.6	0.5	0.1	-0.4	-0.5	-0.1	0.0	-0.4	4.8	-4.5
27	4.4	5.0	4.9	5.1	4.1	2.7	1.6	0.6	0.0	-0.2	-0.3	-0.7	1.5	5.1	-0.7
28	4.1	4.3	5.4	4.6	3.3	2.3	1.8	1.3	1.2	1.1	0.9	0.4	1.3	5.4	-1.0
M.	2.0	2.4	2.5	2.2	1.5	0.7	0.2	0.3	-0.7	-0.1	-1.3	-1.5	0.5	3.2	-3.8

März.

Temperatur (C°)

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	0.2	0.2	-0.1	-0.7	-0.5	-0.5	-0.8	-0.6	0.8	1.9	2.0	3.8
2	-0.6	-1.2	-1.4	0.7	-1.3	-1.3	-0.5	1.2	2.8	6.2	6.5	8.0
3	-3.5	-4.5	-4.3	-5.1	-5.0	-4.4	-3.8	-3.0	-2.3	-1.6	0.0	2.1
4	3.3	-4.8	-5.6	6.1	-6.8	-6.8	-7.6	-7.1	-5.9	-4.2	-2.1	-0.1
5	4.7	3.1	4.8	4.7	3.7	4.1	2.0	3.8	3.0	8.3	8.4	10.1
6	2.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.1	1.3	1.2	1.6	2.2	2.7	2.9
7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.9	2.7
8	-1.0	-1.3	-1.7	-1.9	-2.7	-2.7	-2.3	-1.9	0.2	2.5	5.7	12.7
9	5.1	4.1	3.7	3.0	2.4	1.9	1.8	3.7	4.3	5.6	7.4	9.5
10	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	1.1	1.9	2.9	5.0
11	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	2.1	2.4	3.2
12	-0.1	0.1	0.2	-0.4	-1.3	-1.5	-1.5	-0.7	-0.6	2.3	5.7	7.5
13	-0.4	1.2	-1.6	1.8	-2.1	-2.2	-2.3	-1.4	0.2	2.6	5.0	6.6
14	-0.7	-0.9	-1.2	-1.7	-1.9	-2.1	-2.1	1.8	0.0	2.2	4.5	6.8
15	1.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	1.3	2.5	3.7	5.2	8.1
16	3.0	2.6	2.2	1.7	1.4	1.6	1.9	2.7	4.0	6.0	8.0	9.7
17	4.8	4.1	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0	3.1	3.4	4.0	4.2	5.5
18	4.5	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9	4.2	4.6	4.9	4.9
19	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	4.0	4.5	5.4	7.2	10.9
20	3.3	2.7	2.0	1.6	1.2	0.8	1.0	1.7	4.0	6.6	9.0	11.3
21	4.8	4.5	4.0	3.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.5	3.0	3.3	3.8
22	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	2.3	3.3	4.3	5.4	7.2
23	3.0	2.6	2.0	0.7	0.1	-0.2	0.0	0.5	1.9	3.8	5.7	7.5
24	2.3	2.3	2.4	1.3	1.3	0.9	1.0	1.3	1.4	2.0	2.7	3.3
25	0.6	0.4	0.3	0.0	-0.6	-0.5	0.0	0.2	0.6	1.5	2.1	2.8
26	2.1	2.3	2.1	2.2	1.6	2.0	1.9	4.4	5.8	6.9	7.6	8.1
27	2.9	2.3	2.4	2.0	-0.2	-0.6	-0.3	1.5	3.5	6.5	6.9	7.8
28	1.1	0.3	-0.1	-0.6	0.1	0.0	0.3	1.4	3.1	4.5	6.0	8.4
29	1.2	1.0	1.0	0.3	1.0	0.4	2.7	2.4	7.9	9.4	10.3	11.7
30	6.2	5.8	5.3	5.3	5.1	5.2	4.7	4.8	5.3	5.3	4.8	5.5
31	4.2	4.2	4.1	4.3	4.0	3.2	3.0	3.6	5.8	7.3	9.2	11.6
M.	1.8	1.4	1.3	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	2.3	3.8	5.0	6.7

April.

1	10.4	10.0	10.0	7.6	5.1	4.2	4.5	5.3	7.2	8.3	11.1	14.5
2	6.7	6.5	6.5	5.9	5.4	5.3	5.7	7.7	9.2	11.3	14.6	14.9
3	3.0	3.0	2.7	2.5	2.6	2.2	2.2	3.4	4.4	5.6	7.1	7.7
4	2.4	2.2	1.7	1.4	1.3	1.5	1.8	2.2	3.2	5.5	6.4	7.2
5	4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.9	3.5	3.8	4.7	5.7	7.1	7.1
6	1.0	0.6	-0.3	-0.7	-1.1	-1.2	-1.0	0.0	1.7	4.0	6.0	8.0
7	1.7	1.1	0.5	0.0	-0.5	-0.7	0.0	1.6	4.8	7.3	9.8	11.7
8	3.2	2.2	1.7	1.2	1.0	0.2	1.2	3.2	6.3	9.1	11.6	13.5
9	4.0	3.6	2.8	2.0	1.7	1.5	2.6	5.4	8.6	11.3	13.7	15.9
10	8.9	8.2	8.1	8.0	8.1	7.8	8.3	8.7	9.0	9.0	10.0	12.1
11	6.0	5.9	6.1	6.1	5.9	5.9	6.3	8.2	10.6	12.5	14.0	15.3
12	5.8	4.5	3.5	3.0	2.7	3.4	3.9	5.0	6.2	8.6	9.8	12.2
13	5.6	4.7	3.9	3.7	2.7	3.6	4.5	5.9	8.8	9.1	9.4	9.1
14	2.8	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.9	3.5	4.7	5.8	7.4	9.6
15	1.4	0.7	0.2	-0.1	-0.5	-0.6	1.0	3.2	8.1	10.0	13.0	15.0
16	12.6	12.3	12.1	11.8	11.5	11.6	12.2	12.8	13.6	14.4	14.5	16.3
17	11.5	11.2	10.8	8.1	7.1	7.7	7.9	8.0	9.5	11.1	11.9	14.7
18	12.0	11.7	12.0	12.2	9.3	11.3	11.4	11.3	12.8	14.9	16.3	16.2
19	9.1	8.0	8.0	7.2	6.9	6.9	8.4	9.8	12.7	14.3	14.9	16.3
20	5.7	4.9	4.6	4.1	2.9	4.1	5.4	7.2	10.0	12.5	14.4	16.2
21	8.3	8.0	7.8	7.7	7.8	7.9	8.2	9.0	10.4	12.0	13.0	14.3
22	10.1	10.0	9.4	9.2	8.8	8.4	8.4	8.4	9.4	10.6	11.6	12.2
23	8.7	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.7	9.2	10.9	12.1	12.7
24	9.0	8.8	8.4	8.3	8.3	8.3	8.6	9.2	10.4	12.3	14.2	15.2
25	10.4	10.3	10.2	10.0	9.6	9.5	10.3	12.0	13.2	14.1	15.0	16.8
26	8.6	7.8	7.1	6.4	6.1	6.1	7.1	9.2	12.1	15.8	18.9	20.3
27	9.6	9.3	8.5	8.6	8.9	8.4	9.1	12.5	14.8	17.4	19.6	20.7
28	10.4	10.0	9.1	8.7	8.1	8.8	9.8	12.4	15.1	17.9	19.7	21.3
29	11.2	10.1	9.6	8.7	8.6	9.3	10.3	12.0	13.6	15.6	18.3	19.6
30	9.3	9.4	9.1	8.6	8.7	8.9	9.8	10.7	12.2	14.5	16.3	16.8
M.	7.1	6.7	6.3	5.8	5.4	5.5	6.1	7.3	9.2	11.0	12.7	14.2

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	4.3	4.8	5.6	5.0	4.2	2.7	2.0	1.7	1.2	0.3	0.0	-0.3	1.5	5.6	-0.8
2	5.3	3.1	1.4	1.4	1.4	1.2	0.5	-0.3	-1.0	-1.3	-2.1	-2.6	1.0	8.0	-2.6
3	4.0	5.7	5.4	5.2	4.8	1.8	0.5	-0.1	-0.8	-1.7	-1.9	-2.7	-0.6	5.7	-5.1
4	1.1	2.4	3.1	4.3	3.7	2.1	1.0	0.7	0.3	1.8	2.1	4.7	-1.4	4.7	-2.2
5	10.5	10.6	10.4	10.0	9.7	8.5	8.4	8.3	8.4	7.9	7.7	5.7	6.9	10.6	2.0
6	3.4	2.6	2.3	1.8	1.7	1.6	1.5	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	1.7	3.4	0.5
7	2.7	2.9	2.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5	0.0	-0.8	1.1	2.9	-0.8
8	13.8	13.2	13.1	13.0	12.3	10.9	10.6	10.3	9.3	10.7	9.4	5.4	5.7	13.8	-2.7
9	9.7	10.9	8.2	6.5	5.1	3.9	3.6	2.9	2.4	2.1	1.8	1.5	4.6	10.9	1.5
10	7.2	7.3	5.9	5.5	4.4	3.1	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.6	7.3	0.5
11	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2	2.6	2.0	1.8	1.8	1.2	1.0	0.3	2.1	3.7	0.3
12	9.0	9.2	9.7	9.5	9.1	7.9	4.8	3.1	2.1	1.5	0.3	-0.1	3.2	9.7	-1.5
13	8.1	9.3	10.4	10.2	9.7	7.8	4.9	3.3	2.2	1.3	0.7	0.0	2.9	10.4	-2.3
14	8.0	9.7	10.3	10.0	9.5	8.1	5.6	4.0	2.8	2.2	1.7	1.3	3.1	10.3	-2.1
15	10.4	11.2	11.7	11.0	9.7	7.8	6.9	6.0	5.3	4.1	3.3	3.2	4.8	11.7	0.3
16	11.0	10.9	10.9	10.9	10.1	8.4	7.4	6.8	6.1	6.0	5.9	5.5	6.0	11.0	1.4
17	7.1	8.9	9.0	8.9	7.9	7.2	6.3	6.0	5.3	5.1	4.7	4.6	5.3	9.0	3.0
18	5.0	5.0	5.3	5.5	5.5	5.4	5.0	4.6	3.8	3.8	3.7	3.5	4.5	5.5	3.5
19	13.3	15.2	16.1	16.8	15.6	12.0	9.9	8.5	7.6	5.9	4.7	4.0	7.7	16.8	3.1
20	14.3	14.3	13.9	12.9	12.0	10.9	9.3	7.9	6.9	6.2	5.8	5.2	6.9	14.3	0.8
21	4.1	4.0	3.6	3.0	2.6	2.3	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.9	4.8	1.9
22	7.2	8.9	9.0	9.5	9.5	7.0	5.4	3.9	2.9	3.0	3.2	3.0	4.5	9.5	1.6
23	9.0	9.9	10.7	11.0	9.9	7.8	6.5	5.2	4.1	3.2	2.8	2.4	4.6	11.0	-0.2
24	3.8	4.0	4.1	4.3	4.3	3.2	2.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	2.2	4.3	0.7
25	3.1	3.5	3.8	2.6	2.3	2.0	1.8	2.1	2.0	1.8	1.7	1.9	1.5	3.8	-0.6
26	8.4	8.4	8.5	8.1	7.2	5.5	4.4	3.6	3.1	3.4	3.3	3.0	4.7	8.5	1.6
27	8.8	8.7	8.7	8.3	7.1	6.1	5.5	5.3	4.4	4.3	2.9	1.6	4.4	8.8	-0.6
28	9.8	10.9	10.9	10.5	9.9	8.5	7.7	6.0	4.2	3.7	2.6	2.0	4.6	10.9	-0.6
29	14.1	14.1	14.4	14.1	12.5	11.6	11.0	11.0	11.3	10.6	7.9	7.4	7.9	14.4	0.3
30	6.5	6.7	7.9	7.6	7.2	6.4	6.2	5.3	4.9	4.5	4.3	4.2	5.6	7.9	4.2
31	13.0	13.0	13.0	12.8	12.2	11.3	10.9	11.2	10.7	10.3	10.4	10.3	8.5	13.0	3.0
M.	7.7	8.1	8.2	7.9	7.3	6.0	5.1	4.4	3.8	3.5	3.0	2.6	3.9	8.8	0.1

April.

1	15.4	14.5	13.8	11.9	10.7	9.7	9.3	8.3	7.8	7.5	7.3	7.0	9.2	15.1	4.2
2	14.5	13.1	12.3	11.0	9.1	7.0	5.5	5.3	4.2	3.7	3.3	3.1	8.0	14.9	3.1
3	8.7	7.7	7.2	7.3	5.8	5.1	4.3	4.3	3.7	3.3	3.0	2.6	4.6	8.7	2.2
4	9.1	8.1	8.7	8.7	8.5	7.1	6.1	5.6	5.2	5.1	4.9	4.6	4.9	9.1	1.3
5	7.5	7.0	7.8	7.2	6.6	5.5	4.6	4.3	4.0	3.6	2.2	1.9	4.8	7.8	1.9
6	9.4	10.4	11.8	12.4	12.6	11.3	8.9	7.0	5.6	4.6	3.4	2.4	4.9	12.6	-1.2
7	13.3	14.4	15.2	15.4	15.4	14.2	10.7	9.2	7.6	6.2	4.9	4.4	7.0	15.4	-0.7
8	15.7	17.0	17.3	17.5	17.0	15.1	11.8	10.1	8.7	7.7	5.8	4.9	8.5	17.5	0.2
9	17.8	18.7	19.5	19.9	19.6	18.3	15.3	12.9	11.1	10.2	9.8	8.8	10.6	19.9	1.5
10	14.0	14.7	13.0	13.0	13.5	12.9	10.8	9.4	8.2	7.4	6.3	6.1	9.8	14.7	6.1
11	16.2	17.2	18.3	18.7	18.3	16.1	13.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.1	11.0	18.7	5.9
12	13.8	15.2	14.5	14.3	13.6	12.0	10.6	9.0	7.8	7.9	7.2	6.3	8.4	15.2	2.7
13	7.6	7.5	6.8	5.8	5.3	4.8	4.8	3.9	4.0	4.0	3.4	3.1	5.5	9.4	2.7
14	11.9	11.8	12.4	12.3	11.5	9.6	7.9	6.1	4.7	3.7	2.8	1.9	6.1	12.4	1.9
15	16.7	16.8	17.5	16.6	16.4	15.4	14.2	13.6	13.2	13.1	12.9	12.7	9.6	17.5	-0.6
16	15.9	16.6	16.5	16.0	15.1	14.1	12.8	12.2	12.1	11.8	11.9	11.8	13.4	16.6	11.5
17	15.8	15.2	16.5	15.1	14.7	14.5	13.5	13.1	13.0	12.6	12.5	12.3	12.0	16.5	7.1
18	16.6	17.2	16.8	16.3	16.0	14.3	13.5	13.2	12.3	10.7	10.1	9.6	13.3	17.2	9.3
19	17.4	18.3	16.8	15.8	15.4	13.1	11.6	10.7	10.3	8.5	7.5	6.5	11.1	18.3	6.5
20	16.6	17.4	17.4	16.6	15.1	14.3	13.1	12.2	11.1	9.8	8.7	8.6	10.5	17.4	2.9
21	15.8	16.9	17.0	16.8	15.5	14.0	13.3	12.8	12.3	11.8	11.0	10.7	11.8	17.0	7.7
22	12.0	13.0	13.0	13.1	12.2	11.1	10.7	10.3	10.2	9.8	9.7	10.2	10.5	13.1	8.4
23	12.9	12.9	13.2	11.9	11.3	10.7	10.2	9.4	9.3	9.2	9.1	9.1	10.0	13.2	8.0
24	16.5	16.7	16.6	16.9	15.8	14.0	12.3	11.9	11.6	10.8	10.6	10.7	11.9	16.9	8.3
25	18.0	19.4	20.3	19.5	18.8	16.7	14.3	13.1	11.7	10.5	9.8	9.0	13.4	20.3	9.0
26	20.6	21.3	21.7	21.3	20.4	19.0	17.7	16.4	14.2	12.4	11.4	10.1	13.8	21.7	6.1
27	21.6	22.0	21.5	21.5	20.2	19.8	18.6	16.5	14.5	12.8	12.6	11.0	15.0	22.0	8.4
28	22.3	22.5	23.1	22.2	21.5	19.4	18.4	16.3	14.4	13.3	12.6	11.5	15.4	23.1	8.1
29	18.7	19.2	18.2	17.0	15.9	14.7	14.1	13.1	12.0	11.3	9.6	9.5	13.3	19.6	8.6
30	18.2	18.6	19.3	19.3	19.2	17.7	15.6	13.1	12.7	12.1	12.1	11.7	13.5	19.3	8.6
M.	15.0	15.4	15.5	15.0	14.1	13.0	11.6	10.5	9.6	8.8	8.1	7.6	10.1	16.0	5.0

Mai.

Temperatur (C°)

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	10.8	10.1	9.8	8.8	8.0	7.8	9.2	11.9	14.6	16.5	19.1	20.8
2	12.9	11.4	10.7	9.7	9.1	9.8	10.5	14.0	17.2	21.0	22.4	23.0
3	13.5	12.5	12.1	11.0	10.6	10.0	11.5	14.9	19.4	20.1	21.2	21.2
4	11.1	10.1	10.2	10.0	9.5	9.0	9.0	9.2	10.5	10.4	10.5	11.4
5	8.5	8.3	8.0	7.2	7.8	7.1	7.9	9.9	11.2	13.3	14.8	15.2
6	10.0	9.8	9.1	9.2	9.1	9.4	10.2	10.2	11.8	13.6	15.6	15.6
7	7.7	7.5	7.2	7.0	6.7	6.9	6.7	6.8	7.6	8.3	9.1	10.4
8	6.4	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.8	7.2	9.1	10.6	11.1	12.9
9	7.9	7.7	7.5	7.0	6.9	7.0	8.2	10.4	11.8	13.8	14.8	15.7
10	10.3	9.8	9.3	9.2	8.8	9.0	9.8	11.3	12.5	13.6	14.1	15.2
11	7.9	7.9	7.5	7.3	7.2	7.5	8.5	9.7	12.2	13.5	16.3	19.9
12	16.8	16.6	16.5	16.1	15.9	13.5	12.7	12.2	10.7	11.7	13.2	12.4
13	1.4	1.6	1.5	1.5	2.0	2.5	3.2	4.6	5.5	7.0	9.0	10.9
14	5.0	4.5	4.1	4.0	3.2	3.3	4.9	6.1	8.5	10.9	12.4	14.0
15	7.3	6.7	5.9	5.7	5.2	6.1	7.8	8.7	11.3	14.3	16.5	18.5
16	10.2	9.4	9.5	8.4	8.1	8.5	9.8	10.3	14.7	16.8	19.6	20.9
17	11.5	11.5	11.3	10.9	10.8	11.1	12.5	13.4	15.4	16.7	18.4	20.5
18	12.0	11.3	10.4	10.2	10.5	10.8	12.2	13.7	15.4	17.2	19.8	21.4
19	16.0	15.6	15.0	14.3	15.0	15.7	16.9	17.2	18.1	18.1	18.6	19.1
20	16.3	14.2	15.2	15.2	13.1	13.6	14.5	16.6	18.0	19.8	17.2	16.9
21	12.2	12.3	10.0	8.5	7.8	8.3	9.5	12.1	14.1	16.6	18.4	20.3
22	10.3	10.0	10.1	9.7	8.9	9.0	10.7	12.8	15.0	17.2	19.5	21.1
23	16.5	16.2	15.6	13.5	13.1	13.8	16.0	18.4	19.6	20.2	20.8	21.7
24	11.9	11.5	10.3	9.8	9.2	9.8	12.2	14.1	16.1	18.5	20.5	20.6
25	10.3	10.2	9.7	9.3	9.3	10.0	11.2	13.1	14.3	16.1	17.4	18.1
26	11.5	10.8	10.2	10.7	9.8	10.2	10.2	12.6	15.6	15.2	14.2	16.7
27	10.8	10.7	10.7	10.5	10.5	10.6	11.4	12.3	13.2	15.7	17.7	17.8
28	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	10.1	11.1	13.0	13.9	14.0	14.3	15.6
29	11.2	10.7	10.6	10.6	10.7	10.7	11.9	11.7	11.7	11.3	12.1	12.4
30	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.7	9.3	9.7	10.0	10.5	11.3	11.8
31	9.1	8.8	8.7	8.5	8.2	8.9	9.4	11.1	12.7	12.9	14.4	15.4
M.	10.5	10.1	9.7	9.3	9.0	9.2	10.2	11.6	13.3	14.7	15.9	17.0

Juni.

1	8.0	7.2	6.5	6.9	7.6	8.5	8.8	10.2	11.4	13.9	15.4	16.9
2	8.6	8.4	8.3	8.3	8.1	8.2	9.5	10.2	10.8	11.7	13.0	12.4
3	10.7	10.5	10.3	9.6	8.9	8.7	8.6	8.9	8.8	8.3	8.0	9.1
4	5.1	4.6	4.1	3.3	3.2	3.9	5.3	8.2	10.9	13.0	14.8	16.6
5	7.9	7.0	6.8	6.1	5.9	6.6	9.3	12.5	15.2	17.7	20.0	21.3
6	12.9	12.1	12.3	12.3	12.2	12.4	13.0	13.5	14.7	16.7	18.2	20.7
7	12.9	11.8	11.1	10.8	9.9	11.5	13.5	14.1	14.5	15.4	16.3	16.5
8	11.5	10.8	10.1	10.1	9.7	10.5	11.5	14.1	16.0	18.8	21.0	23.2
9	14.7	15.0	14.9	14.6	14.6	14.7	15.5	18.1	18.8	20.2	22.9	24.3
10	15.5	15.3	14.8	14.4	14.7	15.1	15.8	18.1	18.9	20.5	21.6	21.9
11	14.4	14.1	13.8	13.8	13.8	14.1	14.5	15.0	16.6	18.3	19.8	22.3
12	11.8	11.4	14.5	14.6	14.7	15.0	16.2	17.6	19.5	16.6	15.0	15.6
13	11.0	10.6	10.2	10.0	9.9	10.2	11.9	14.3	16.3	18.4	20.5	21.6
14	14.0	13.9	13.8	13.3	12.9	13.7	14.2	16.1	18.6	18.8	21.4	21.6
15	13.8	13.7	13.3	13.1	13.1	13.2	13.8	14.3	14.8	15.2	14.7	12.6
16	10.0	9.7	9.0	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.5	9.7	10.5	12.1
17	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	8.9	10.2	11.9	13.2	14.8	15.5	14.4
18	8.8	7.9	7.3	6.6	6.4	6.5	9.3	10.5	13.8	16.5	17.4	19.4
19	9.7	9.4	8.7	8.1	8.0	9.0	10.7	12.4	14.7	17.0	19.7	20.8
20	14.5	13.8	13.5	13.3	13.0	13.4	14.5	15.3	17.3	19.1	20.9	22.0
21	13.7	13.6	13.3	12.7	12.2	12.4	14.2	16.5	19.0	21.2	23.2	25.3
22	17.0	16.1	15.7	15.1	14.6	15.1	17.4	20.3	22.0	23.6	24.9	25.9
23	16.6	15.9	15.2	15.3	15.0	15.4	15.6	17.3	19.5	20.7	21.5	21.2
24	12.6	12.1	11.6	10.5	10.3	11.7	12.8	11.7	15.5	16.7	17.6	19.0
25	13.0	12.5	11.9	11.5	11.4	12.6	13.6	15.9	18.2	20.6	22.2	23.4
26	15.9	15.4	14.8	14.5	14.7	15.0	16.4	17.8	18.6	18.4	18.1	19.0
27	9.1	8.9	9.0	9.0	9.0	9.2	9.8	10.8	11.7	14.8	15.6	16.8
28	10.1	9.7	9.4	9.0	9.2	9.5	11.4	11.9	13.4	15.5	17.0	17.3
29	10.2	9.9	9.3	9.0	8.1	8.7	10.0	12.0	13.8	15.0	16.9	18.0
30	10.2	10.4	10.2	10.4	10.2	10.7	11.0	11.8	13.5	15.3	17.4	18.4
M.	11.9	11.4	11.1	10.8	10.6	11.1	12.2	13.8	15.3	16.7	18.0	19.0

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	22.1	23.0	23.5	23.7	23.4	22.1	20.6	18.2	15.7	16.3	15.0	14.1	16.0	23.7	7.8
2	23.6	23.9	24.0	23.7	23.3	22.1	20.7	18.2	19.7	19.0	18.5	18.0	16.4	24.0	9.1
3	21.4	21.3	21.4	20.5	20.6	18.6	17.1	15.4	15.8	15.6	13.6	12.6	16.3	21.4	10.0
4	10.8	11.7	11.9	12.4	12.6	12.0	11.3	9.7	9.8	9.6	9.2	8.9	10.5	12.6	8.9
5	16.7	15.9	17.2	17.1	16.5	14.9	14.1	12.8	11.8	11.5	10.9	10.3	12.0	17.2	7.1
6	17.8	17.5	15.8	15.6	16.1	15.1	11.3	9.4	9.1	8.6	8.3	8.0	11.9	16.1	8.0
7	11.4	10.4	10.7	9.7	10.2	9.2	8.6	8.0	7.5	7.1	6.8	6.7	8.3	11.4	6.7
8	13.8	14.2	13.5	11.9	12.4	11.6	10.7	10.0	9.8	8.8	8.3	8.2	9.5	14.2	6.1
9	15.7	17.0	17.1	16.4	16.8	15.3	14.0	12.4	12.0	11.4	11.0	10.6	12.0	17.1	6.0
10	14.4	13.6	13.0	13.0	11.5	10.8	9.8	9.3	8.9	8.7	8.2	8.1	10.9	15.2	8.1
11	21.0	21.8	21.6	21.4	20.0	19.0	18.4	17.9	17.2	16.9	16.9	16.8	14.8	21.8	7.2
12	11.8	10.7	10.4	10.1	9.2	8.3	7.3	6.4	6.3	5.5	4.3	1.8	10.8	13.2	1.8
13	12.7	12.5	13.2	11.6	10.7	9.2	8.2	7.3	7.2	6.3	6.3	5.0	6.7	13.2	1.4
14	15.1	15.6	16.6	17.0	17.3	16.6	14.0	12.7	12.3	9.3	9.3	8.3	10.2	17.3	3.2
15	19.9	21.8	22.2	21.7	20.7	19.3	18.2	17.3	16.2	14.0	12.6	11.3	13.7	22.2	5.2
16	22.5	22.9	21.9	21.3	18.8	18.3	15.5	14.2	13.3	12.7	12.1	11.7	14.6	22.9	8.1
17	20.9	21.8	23.0	20.6	19.1	18.1	16.6	15.3	14.6	14.0	13.2	12.6	15.6	23.0	10.8
18	22.0	22.5	22.9	22.1	21.2	20.2	18.9	18.0	17.9	16.4	16.5	16.8	16.7	22.9	10.2
19	20.2	21.7	20.5	20.0	19.7	18.8	17.8	17.0	16.5	16.2	16.1	16.3	17.5	21.7	14.3
20	18.8	20.0	20.3	20.7	20.4	19.4	17.5	16.3	15.9	14.4	12.3	12.9	16.7	20.7	12.3
21	21.2	22.1	22.1	22.2	22.3	19.1	16.4	14.7	14.0	13.0	12.2	11.8	15.1	22.3	7.8
22	22.6	23.3	23.7	22.5	21.6	19.8	19.2	17.4	17.0	16.7	16.5	16.5	16.3	23.7	8.9
23	22.4	22.6	23.0	22.0	18.7	19.1	18.1	17.0	16.4	16.1	15.2	13.6	17.9	23.0	13.1
24	21.5	21.1	19.2	19.2	18.1	17.3	16.5	11.9	12.5	11.5	11.4	10.9	14.8	21.5	9.2
25	19.0	18.8	18.4	18.4	18.2	16.9	16.5	14.9	14.5	14.2	13.3	11.9	14.3	19.0	9.3
26	18.3	19.7	20.0	18.5	13.3	12.6	12.5	11.8	11.7	11.7	11.6	11.3	13.4	20.0	9.8
27	18.2	16.5	14.9	16.2	14.6	14.6	13.6	12.7	12.2	11.9	10.8	10.1	13.3	18.2	10.1
28	16.8	17.1	17.7	16.1	14.2	13.1	13.0	12.3	11.7	11.4	11.2	11.2	12.8	17.7	9.8
29	12.3	12.4	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	10.6	9.6	9.5	9.4	9.1	11.1	12.4	9.1
30	12.3	14.1	14.6	15.4	14.4	13.9	12.6	11.6	11.2	10.7	10.2	9.5	11.0	15.4	8.6
31	16.3	15.5	15.8	15.8	16.3	14.8	13.1	11.8	10.8	9.6	8.7	8.4	11.9	16.3	8.2
M.	17.9	18.2	18.1	17.7	16.9	15.9	14.6	13.3	12.9	12.2	11.6	11.1	13.4	18.7	8.3

Juni.

1	18.3	18.0	15.9	13.9	11.7	11.3	10.2	9.6	9.4	9.4	9.4	9.0	11.1	18.3	6.5
2	12.3	13.5	14.3	14.1	14.2	14.0	13.5	12.2	11.5	11.2	11.1	10.7	11.3	14.3	8.1
3	10.1	12.2	12.5	12.3	12.3	12.3	11.3	9.6	8.2	7.0	6.3	5.7	9.6	12.5	5.7
4	17.0	18.7	19.8	20.1	20.1	19.3	16.6	14.3	12.2	10.4	9.7	9.0	11.7	20.1	3.2
5	23.0	24.0	25.1	25.4	24.3	22.1	19.7	18.3	15.8	14.7	14.0	13.7	15.7	25.4	5.9
6	21.1	21.8	22.5	22.2	19.4	19.5	18.1	16.6	15.1	14.0	13.8	13.1	16.2	22.5	12.2
7	17.7	19.7	20.6	21.6	20.8	18.1	17.3	15.0	15.4	13.4	12.3	11.8	15.1	21.6	9.9
8	25.0	26.0	26.3	25.4	24.3	23.2	21.9	19.9	18.6	18.2	17.7	18.0	18.0	26.3	9.7
9	25.6	25.9	24.5	23.6	22.2	20.3	19.6	18.5	17.3	16.5	16.0	15.8	18.9	25.9	14.6
10	19.9	21.3	22.5	20.6	18.8	16.0	15.2	15.1	15.1	14.8	14.0	14.2	17.2	22.5	14.0
11	22.4	17.5	18.5	17.3	18.1	17.4	16.8	16.4	16.0	15.6	15.3	15.0	16.5	22.4	13.8
12	17.4	19.3	19.8	20.4	19.2	15.4	15.0	13.7	12.5	11.6	11.6	11.4	15.7	20.4	11.4
13	23.3	24.2	24.8	24.6	23.8	22.8	21.0	19.5	18.4	16.8	15.9	15.0	17.3	24.8	9.9
14	22.1	21.6	21.3	18.6	16.2	15.5	15.1	14.9	14.6	14.1	14.0	14.0	16.4	22.1	12.9
15	12.7	13.6	13.7	14.2	13.1	12.2	11.6	11.2	10.9	10.5	10.3	10.3	12.9	15.2	10.3
16	11.8	10.6	11.1	10.4	9.9	9.4	9.0	8.7	8.5	8.3	8.1	8.4	9.5	12.1	8.1
17	15.3	16.7	17.0	15.9	14.5	15.0	14.3	13.2	12.4	11.0	9.9	9.3	12.3	17.0	8.1
18	19.5	20.5	20.4	20.6	21.2	20.4	18.6	16.4	13.9	12.5	11.7	10.4	14.0	21.2	6.4
19	22.0	22.5	22.8	23.5	22.2	20.6	19.2	17.7	17.1	15.9	15.1	14.7	15.9	23.5	8.0
20	21.7	20.7	19.1	19.6	18.7	17.3	16.7	16.7	15.9	15.4	14.9	14.3	16.7	22.0	13.0
21	27.0	28.1	28.9	28.7	26.5	25.9	24.8	22.1	19.6	18.8	17.8	17.6	20.1	28.9	12.2
22	28.0	27.4	25.0	22.2	20.9	20.9	19.7	18.8	18.2	17.9	17.4	17.2	20.1	28.0	14.6
23	21.9	21.0	20.9	20.7	17.2	14.0	13.7	13.1	13.0	12.8	12.7	12.7	16.8	21.9	12.7
24	19.7	20.6	21.7	22.1	22.4	22.4	21.3	19.9	18.0	16.6	15.3	14.4	16.6	22.4	10.3
25	25.3	25.4	24.0	24.7	22.0	21.2	19.9	19.1	18.3	17.3	16.6	16.6	18.2	25.4	11.4
26	22.8	23.4	21.0	19.8	18.3	16.9	11.5	10.9	10.9	10.9	10.3	9.6	16.0	23.4	9.6
27	16.9	17.3	16.4	15.2	14.3	15.8	14.6	13.8	13.5	12.7	12.5	10.8	12.8	17.3	8.9
28	17.1	17.7	17.2	16.3	15.9	14.7	14.0	12.2	12.1	11.9	11.0	10.9	13.1	17.7	9.0
29	21.2	21.0	21.4	19.0	18.0	16.1	11.5	11.8	11.8	11.6	10.6	10.3	13.6	21.4	8.4
30	19.0	20.5	20.3	20.1	19.9	18.8	17.3	15.8	16.2	14.2	13.1	12.0	14.9	20.5	10.2
31															
M.	19.9	20.4	20.3	19.8	18.7	17.6	16.3	15.2	14.3	13.5	12.9	12.5	15.1	21.2	10.0

Juli.

Temperatur (C°.)

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	10.9	10.0	9.7	8.8	8.6	9.3	10.4	13.0	15.1	17.6	19.5	21.6
2	14.7	14.1	14.1	13.4	13.5	14.6	15.8	17.5	18.5	20.0	22.4	23.5
3	14.6	13.7	13.1	12.7	12.9	13.5	14.3	16.0	16.7	19.1	20.9	21.4
4	14.8	14.5	14.3	14.4	14.5	14.7	15.3	17.3	18.7	19.1	20.1	21.3
5	12.3	12.0	11.5	11.7	11.3	11.0	11.1	11.7	12.0	12.3	13.5	14.5
6	10.3	10.0	9.7	9.1	9.1	9.8	10.2	11.7	12.9	14.1	14.3	14.1
7	10.4	10.2	9.5	9.1	8.9	9.7	10.0	11.7	13.2	14.9	16.0	17.3
8	12.9	12.5	12.2	11.9	11.9	12.0	12.5	13.0	13.9	14.0	14.9	14.3
9	11.1	10.9	10.4	10.4	10.2	10.3	11.0	12.0	12.7	13.3	13.3	13.9
10	10.8	10.3	10.1	9.9	9.3	9.9	10.3	11.2	13.0	15.3	17.6	18.6
11	11.5	10.6	10.0	9.7	9.3	10.0	11.0	12.0	14.0	15.9	18.0	21.5
12	14.0	13.7	13.1	12.4	12.9	12.9	13.3	14.4	15.0	16.0	16.8	18.4
13	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1	15.3	17.2	18.4	19.0	20.5
14	14.1	13.5	13.2	12.1	11.8	11.9	12.0	11.9	12.2	12.4	13.8	14.7
15	10.2	9.5	8.7	7.7	7.2	7.6	9.3	11.6	13.4	14.8	17.2	18.4
16	11.0	10.3	9.8	9.3	8.9	9.1	10.7	12.6	15.2	17.6	19.7	21.2
17	13.3	12.2	11.9	11.2	10.9	11.3	12.7	15.1	17.5	19.9	22.2	24.5
18	16.7	15.9	14.9	14.5	13.9	14.4	15.6	17.3	19.6	21.7	23.3	24.9
19	16.0	15.3	14.7	14.2	13.8	14.0	15.0	17.3	19.8	22.2	24.2	26.0
20	16.3	16.1	15.9	15.7	15.4	15.6	16.1	17.6	17.2	18.9	19.8	21.0
21	15.4	14.7	13.9	13.8	13.9	14.2	14.6	16.3	17.8	18.8	19.9	20.4
22	12.8	11.9	12.0	11.4	11.4	11.4	12.5	14.0	15.9	18.0	20.1	22.2
23	15.0	14.4	13.9	13.2	12.9	13.1	15.2	17.1	19.5	22.1	24.2	26.3
24	14.7	14.8	14.3	14.5	14.5	14.7	15.0	16.0	17.2	19.4	20.7	21.6
25	14.4	14.0	14.1	13.7	13.5	14.8	15.1	17.1	19.2	21.0	22.4	23.7
26	14.9	14.5	13.8	13.2	13.5	14.0	15.4	16.6	19.1	21.5	23.0	24.2
27	14.8	14.2	13.4	13.1	12.9	13.0	14.2	16.7	18.9	21.2	23.7	25.1
28	15.0	14.7	14.2	13.9	13.5	14.0	14.8	15.7	16.9	18.9	20.8	22.8
29	14.0	14.0	13.8	13.9	14.0	14.2	15.1	15.9	17.0	18.1	21.3	22.0
30	11.2	10.9	11.0	10.9	10.8	10.9	11.4	12.7	13.5	15.7	16.5	17.0
31	11.3	11.0	10.9	10.8	10.9	11.0	12.1	12.9	13.4	15.1	16.3	17.4
M.	13.3	12.9	12.5	12.1	11.9	12.3	13.1	14.6	16.0	17.7	19.2	20.5

August.

1	12.9	12.1	12.1	12.0	11.4	11.6	12.2	13.6	15.5	17.3	19.0	20.3
2	13.0	12.5	12.0	11.2	10.9	10.8	11.8	14.4	16.7	19.0	21.0	22.9
3	14.7	13.7	13.3	12.8	12.3	12.3	13.7	14.9	17.3	19.6	21.8	23.7
4	14.4	13.7	13.3	12.8	12.3	12.6	13.8	14.7	16.8	19.3	21.0	20.2
5	13.5	13.3	13.0	12.4	12.3	12.8	14.2	14.9	17.3	18.4	20.0	21.4
6	13.8	13.3	12.5	12.1	11.7	12.0	12.8	15.1	17.3	19.5	21.5	23.7
7	16.3	15.4	15.1	14.4	14.0	13.9	15.4	17.2	19.8	22.3	25.1	26.6
8	21.8	20.2	18.3	17.3	16.5	16.7	16.8	19.3	21.7	24.2	24.4	25.3
9	20.2	18.1	16.5	13.4	12.6	11.8	11.7	10.6	9.7	9.1	9.0	8.3
10	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	10.0	11.8	12.3	14.7	13.5	15.5
11	10.1	9.6	9.4	9.0	8.5	8.6	9.5	10.6	12.7	14.9	17.2	18.4
12	13.3	13.2	12.4	12.0	11.3	10.7	11.2	12.4	14.4	16.4	18.4	20.1
13	13.5	13.1	12.4	12.0	11.7	11.8	13.0	14.9	17.3	19.9	22.1	23.7
14	15.7	15.2	14.5	13.9	13.7	13.5	14.4	16.5	18.9	21.2	22.9	24.3
15	13.9	13.7	13.2	12.7	12.5	12.6	13.8	15.6	18.2	20.1	22.2	24.1
16	16.4	15.4	14.7	14.0	13.5	13.5	14.6	16.9	19.7	21.5	23.4	25.0
17	17.2	16.7	16.0	15.2	15.0	14.5	15.7	17.2	16.6	21.9	23.4	25.4
18	17.9	16.8	16.3	15.4	15.0	14.5	14.9	16.3	19.2	21.0	23.9	25.2
19	16.0	15.4	14.8	14.3	14.1	13.9	15.0	16.5	18.7	21.2	23.1	24.9
20	16.1	15.5	15.2	14.6	14.1	14.1	15.0	16.9	19.0	21.5	23.5	25.0
21	17.2	16.5	16.1	15.5	14.9	15.4	15.9	18.0	20.4	22.8	25.0	26.9
22	16.9	16.3	15.6	15.2	14.6	14.4	15.0	17.0	19.4	21.9	23.9	25.4
23	17.1	16.3	15.5	15.1	14.2	14.0	14.4	15.8	18.4	21.3	23.7	25.7
24	15.4	15.5	15.4	15.2	15.3	15.5	15.7	16.4	16.6	18.0	18.7	18.9
25	15.6	15.5	15.5	15.5	15.4	15.0	15.3	15.5	15.9	16.5	17.6	17.6
26	15.7	15.6	15.5	15.4	15.4	15.4	16.0	16.5	18.0	19.4	21.6	22.8
27	14.2	13.5	13.3	12.7	12.4	12.0	12.6	13.7	15.7	18.4	20.4	22.6
28	16.5	16.1	15.4	14.7	14.6	14.5	14.7	15.4	17.9	20.1	21.0	21.5
29	13.7	13.7	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	14.1	14.9	15.5	16.7	17.3
30	9.9	9.5	9.1	8.7	8.6	8.6	9.0	11.4	12.6	14.7	16.9	17.5
31	11.6	11.3	10.7	10.0	9.7	9.3	11.3	11.8	14.0	16.3	18.6	20.2
M.	15.0	14.4	13.9	13.3	13.0	12.9	13.7	15.0	17.0	19.0	20.7	21.9

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	22.4	22.5	22.5	23.2	22.1	20.3	19.2	18.2	17.0	16.0	15.3	14.7	16.2	22.5	8.6
2	23.5	24.6	22.9	21.4	19.5	19.0	16.7	16.1	16.0	15.5	15.1	14.9	17.8	24.6	13.4
3	22.8	21.7	21.5	20.0	18.9	18.0	17.9	16.6	15.7	15.3	15.2	15.0	17.0	22.8	12.7
4	21.5	19.7	20.5	20.5	16.4	16.2	15.2	14.9	14.6	14.1	13.3	13.0	16.6	21.5	13.0
5	14.0	15.5	16.1	15.7	14.4	14.0	13.5	12.4	11.7	11.3	10.5	10.3	12.7	16.1	10.4
6	15.5	15.5	14.3	14.0	14.2	12.3	12.0	1.9	11.7	11.3	11.1	10.7	12.1	15.5	9.1
7	18.3	19.0	19.0	18.8	18.9	17.9	16.2	15.2	14.6	13.8	13.1	12.9	14.1	19.0	8.9
8	14.1	14.2	14.1	13.7	14.0	13.4	12.3	12.0	11.8	11.7	11.4	11.2	12.9	14.9	11.2
9	13.9	14.8	15.7	15.4	14.9	14.2	13.4	12.7	12.1	11.9	11.3	10.9	12.5	15.7	10.2
10	20.1	20.9	21.2	20.4	18.7	18.6	17.3	16.3	15.2	14.6	14.1	12.9	14.9	21.2	9.3
11	22.0	22.3	21.1	20.6	19.4	18.5	17.8	16.7	15.9	15.1	14.6	14.0	15.5	22.3	9.3
12	18.8	18.8	19.0	18.5	18.5	17.1	16.7	15.8	15.1	14.7	14.2	14.1	15.6	19.0	12.4
13	20.8	20.2	21.2	21.1	19.6	19.1	18.1	17.0	16.3	15.6	15.2	14.8	17.0	21.2	14.0
14	15.9	16.5	16.2	15.2	15.5	13.8	12.9	11.9	11.1	11.0	10.8	10.6	13.1	16.5	10.6
15	19.6	20.9	22.0	22.5	20.5	19.5	18.0	16.0	14.9	13.6	12.3	11.4	14.5	22.5	7.2
16	22.9	24.4	25.1	25.1	24.2	22.9	22.0	18.9	16.7	15.2	14.1	13.9	16.7	25.1	8.9
17	26.7	27.0	28.2	27.9	27.4	26.1	25.0	22.4	20.0	19.0	18.3	17.9	19.5	28.2	10.9
18	27.2	28.2	27.9	27.6	26.5	25.6	23.8	21.4	19.4	17.9	17.3	16.7	20.5	28.2	13.9
19	29.5	31.6	32.0	31.6	27.5	24.7	20.1	21.7	20.8	19.0	17.7	16.8	21.1	32.0	13.8
20	22.4	23.4	23.3	20.7	19.7	19.1	17.6	16.9	16.5	16.2	16.0	15.8	18.0	23.4	15.4
21	21.0	21.7	21.8	21.7	21.1	20.1	18.5	16.8	15.6	14.9	14.0	13.2	17.3	21.8	13.2
22	23.9	26.0	26.2	26.1	25.7	24.8	23.6	20.5	18.2	17.4	16.4	15.7	18.3	26.2	11.4
23	28.4	28.0	26.0	17.4	16.6	16.8	16.9	16.4	16.3	15.6	15.0	14.6	18.1	28.4	12.9
24	22.9	24.0	25.4	25.4	23.8	22.8	20.8	19.3	18.8	16.6	15.7	15.0	18.7	25.4	14.5
25	25.2	25.9	26.3	25.0	23.4	22.7	21.0	19.5	17.6	16.6	15.8	15.2	19.0	26.3	13.5
26	25.6	26.2	26.0	25.6	24.0	23.0	21.4	19.7	18.6	16.9	16.1	15.6	19.3	26.2	13.2
27	27.0	26.2	20.8	20.6	20.7	20.8	19.8	18.0	16.4	16.0	15.5	15.8	18.3	26.2	12.9
28	24.4	22.4	15.2	16.5	16.2	16.8	16.6	16.1	15.6	15.1	14.9	14.7	16.7	24.4	13.5
29	22.8	22.8	22.7	18.1	12.5	12.2	12.1	11.7	11.4	11.1	11.1	11.0	15.5	22.8	11.0
30	17.2	19.0	20.2	17.7	16.0	15.5	14.5	13.7	13.2	12.6	12.1	11.8	14.0	20.2	10.8
31	17.9	18.7	20.1	19.7	18.9	17.8	16.0	14.6	13.8	13.4	13.4	13.0	14.6	20.1	10.8
M.	21.6	22.0	21.8	20.9	19.7	18.8	17.6	16.5	15.6	14.8	14.2	13.8	16.4	22.6	11.6

August.

1	22.1	23.2	23.7	23.8	23.2	21.6	19.9	18.3	16.5	15.8	14.6	13.7	16.9	23.8	11.4
2	25.0	25.6	25.8	25.5	24.8	23.3	21.6	19.7	18.0	16.5	15.5	15.3	18.0	25.8	10.8
3	25.0	26.6	27.6	25.4	25.0	22.6	19.7	19.0	17.3	16.2	16.1	15.3	18.6	27.6	12.3
4	19.3	20.0	22.0	22.1	22.0	19.6	18.4	16.1	15.6	15.0	14.5	13.8	16.8	22.1	12.3
5	22.5	23.8	24.2	24.0	23.3	22.0	20.6	18.4	16.7	15.7	15.2	15.0	17.7	24.2	12.3
6	25.0	26.6	27.6	29.0	27.5	26.3	24.2	22.0	20.0	18.6	17.7	17.0	19.5	29.0	11.7
7	28.0	29.0	29.5	29.7	29.2	27.9	27.5	26.3	26.6	25.6	24.6	14.4	22.7	29.7	13.9
8	26.9	28.0	28.0	28.4	27.2	26.0	25.3	24.5	24.6	24.2	24.0	23.0	23.0	28.4	16.5
9	8.3	11.4	13.5	13.7	12.5	10.9	10.0	9.8	9.6	9.5	9.4	9.3	11.6	20.2	8.3
10	15.7	16.7	16.4	16.6	15.6	13.4	13.0	11.9	11.2	11.1	10.7	10.4	12.4	16.7	9.5
11	18.4	19.5	19.9	19.9	19.1	18.0	16.7	15.1	13.5	13.6	13.2	13.1	14.1	19.9	8.5
12	21.7	23.0	23.5	23.7	23.2	22.2	19.7	17.9	16.8	15.5	15.0	14.0	16.8	23.7	10.7
13	25.1	26.4	27.5	26.8	26.0	24.9	23.3	21.3	19.2	18.2	17.6	16.9	19.1	27.5	11.7
14	25.9	27.3	27.7	25.2	22.5	20.1	19.3	17.7	16.3	15.5	15.0	14.7	18.8	27.7	13.5
15	25.9	27.2	27.7	27.5	26.7	24.5	23.4	22.7	21.1	19.8	18.4	17.3	19.8	27.7	12.5
16	26.4	28.0	28.9	28.9	28.8	27.0	24.9	23.1	21.4	20.0	18.9	17.6	21.0	28.9	13.5
17	27.3	28.2	28.0	25.3	25.0	25.1	22.5	21.3	19.9	19.0	19.0	18.3	20.7	28.2	14.5
18	26.0	21.2	22.3	24.3	24.7	24.0	21.6	19.8	19.4	18.6	17.3	16.4	19.7	26.0	14.5
19	26.5	28.0	29.2	29.9	26.3	26.0	22.2	20.4	19.4	18.3	17.6	16.9	20.3	29.9	13.9
20	26.9	28.2	29.4	28.9	28.0	26.1	23.9	22.1	21.0	19.7	18.9	18.0	20.9	29.4	14.1
21	27.8	28.0	29.0	28.0	26.3	25.5	23.3	21.3	20.3	19.6	18.3	17.4	21.2	29.0	14.9
22	27.1	28.0	29.0	28.7	27.4	26.2	24.0	22.1	20.9	19.8	19.6	18.1	21.1	29.0	14.4
23	27.6	29.3	30.6	22.7	25.1	23.8	23.2	22.8	18.2	15.7	15.6	15.7	20.1	30.6	14.0
24	18.8	20.4	21.8	21.5	21.0	19.6	18.7	17.3	16.7	16.5	16.3	15.8	17.5	21.8	15.2
25	17.9	17.8	17.9	18.0	18.2	18.0	17.3	16.6	16.3	16.1	15.9	15.8	16.3	18.2	15.0
26	22.8	22.9	22.9	22.8	22.3	21.4	19.7	17.9	16.8	16.0	15.3	14.8	18.5	22.9	14.8
27	23.2	23.8	25.2	25.2	24.6	21.9	20.5	19.2	18.4	17.4	17.2	16.7	18.1	25.2	12.0
28	23.2	23.8	24.8	23.1	17.1	17.2	16.1	16.3	16.0	15.9	14.9	14.1	17.7	24.8	14.1
29	18.9	18.6	18.2	17.5	17.8	16.2	14.1	13.0	12.6	12.0	11.2	10.3	14.8	18.9	10.3
30	18.0	18.7	19.8	20.4	20.5	19.3	17.1	15.9	15.2	13.8	12.7	12.0	14.2	20.5	8.6
31	22.0	23.6	24.3	24.4	24.0	22.3	19.3	17.6	19.4	16.6	16.3	15.1	16.7	24.4	9.3
M.	23.1	24.0	24.7	24.2	23.4	22.0	20.4	18.9	17.9	17.0	16.3	15.7	18.2	25.2	12.5

September.

Temperatur (C°.)

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	14.4	14.4	13.9	13.6	13.5	12.5	12.9	13.4	14.2	15.9	17.2	17.4
2	11.4	11.6	11.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.3	11.5	13.5	15.5	16.1
3	9.9	9.6	9.1	8.7	8.4	7.9	9.1	9.5	11.6	14.0	15.8	17.8
4	14.0	13.8	13.6	13.2	11.9	11.3	11.7	13.4	15.2	17.2	19.2	20.1
5	14.8	14.1	13.4	13.0	13.8	14.1	14.7	16.2	17.8	19.5	20.9	22.1
6	14.1	13.4	12.8	12.9	12.9	13.4	14.3	15.6	16.5	18.3	20.3	21.9
7	13.5	13.0	12.5	12.1	11.6	11.2	11.8	13.7	15.6	17.8	20.1	21.8
8	12.3	11.7	11.3	10.6	10.4	10.2	10.6	12.4	15.5	18.0	20.3	22.1
9	13.3	12.5	11.8	11.3	10.8	10.5	11.4	13.4	15.8	18.6	20.8	22.8
10	13.8	13.3	12.5	12.0	11.8	11.8	12.5	13.7	16.4	18.9	21.3	23.7
11	13.3	12.4	11.6	11.3	10.8	10.6	10.6	12.4	15.0	18.0	20.2	22.5
12	15.7	15.4	13.5	13.2	13.0	12.6	13.3	14.3	16.6	17.8	18.8	20.1
13	13.5	13.0	12.3	12.1	11.6	11.4	12.0	13.7	15.1	16.3	18.3	19.2
14	14.5	14.2	14.1	14.0	14.0	13.8	14.1	14.3	15.0	15.5	16.8	18.3
15	10.7	9.9	9.5	9.1	8.8	8.8	9.4	11.0	12.1	14.2	16.2	17.6
16	10.8	10.2	9.7	9.2	8.7	8.4	8.5	9.9	11.5	14.0	16.2	17.7
17	11.4	10.8	10.1	9.5	9.3	8.6	9.2	10.5	12.6	15.2	17.7	19.3
18	11.3	10.6	10.3	9.7	9.1	8.7	10.1	10.4	13.3	16.4	19.2	21.0
19	13.7	13.3	12.8	12.2	11.6	11.5	12.2	12.9	13.3	14.8	16.8	18.4
20	13.6	13.2	13.0	13.0	12.9	12.7	13.0	14.1	15.6	16.7	18.2	18.4
21	9.7	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	7.5	8.3	11.1	12.8	15.1	16.7
22	9.6	8.9	8.6	8.1	7.8	7.7	8.5	9.4	12.2	14.6	16.5	18.4
23	9.9	9.0	8.2	8.0	7.4	7.1	7.3	8.3	10.6	13.0	15.6	17.4
24	9.2	9.9	9.6	9.2	9.1	9.0	9.0	9.7	11.2	12.2	13.2	13.9
25	8.9	8.0	7.5	7.4	7.3	6.7	7.5	8.8	10.1	11.6	12.7	13.9
26	5.0	4.5	4.0	3.6	3.2	2.3	2.1	3.5	5.9	8.4	10.9	12.5
27	5.7	5.3	5.2	4.6	4.6	4.2	4.1	5.8	7.0	11.1	14.3	17.5
28	10.2	10.1	10.2	9.7	9.0	9.7	10.1	10.4	10.7	11.7	12.8	12.8
29	10.6	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	11.3	11.9	13.1
30	9.5	9.5	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.8	10.0	11.4	12.9	14.2
M.	11.6	11.2	10.7	10.3	10.0	9.8	10.3	11.3	13.0	14.9	16.8	18.3

October.

1	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	12.2	12.9	14.2	16.2	16.5
2	11.3	11.4	11.6	11.6	11.7	11.4	11.9	13.1	14.2	14.7	15.5	17.3
3	12.0	12.2	12.2	12.3	12.1	12.0	12.2	12.2	14.3	15.1	16.5	17.8
4	9.9	9.7	8.9	8.5	8.1	8.1	8.1	8.8	11.5	13.7	16.2	17.7
5	9.5	8.8	8.0	7.3	7.0	6.8	7.2	9.0	10.6	12.3	14.8	16.3
6	10.3	10.6	10.3	10.1	9.1	9.0	8.2	8.8	9.8	12.2	14.9	17.8
7	11.3	11.4	11.6	11.5	11.4	11.3	11.3	11.3	11.9	13.0	13.9	14.0
8	11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	10.8	11.2	12.0	13.0	13.2	15.0
9	8.4	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.6	8.6	10.0	11.8	12.3	13.2
10	9.0	8.9	8.7	8.7	8.6	8.3	8.5	8.6	9.3	10.2	11.2	12.9
11	5.7	5.3	5.0	4.8	5.0	5.0	5.7	6.3	7.5	8.6	10.3	11.2
12	10.1	9.3	8.9	8.2	9.0	9.2	9.2	8.9	7.8	7.6	7.1	6.5
13	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	1.6	1.8	2.4	3.2	4.8	5.8	6.8
14	5.6	5.7	5.5	5.4	5.3	5.2	5.3	5.6	6.7	7.6	8.2	8.9
15	5.1	4.9	4.7	4.8	5.6	5.1	6.0	6.1	6.7	7.6	8.9	9.9
16	6.5	6.7	6.8	6.0	6.1	6.0	6.0	7.3	9.4	10.9	12.6	13.5
17	6.9	6.5	6.0	5.3	5.4	5.1	4.6	4.6	5.4	6.5	9.9	16.1
18	6.4	6.2	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4	7.2	8.7	10.8	11.7
19	7.5	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1	6.0	6.5	6.7	7.4	8.7	9.9
20	9.4	9.5	9.5	9.4	9.8	9.8	9.7	9.5	10.0	10.3	10.8	11.7
21	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.4	6.9	8.0	10.0	11.2	12.2
22	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.4	8.9	9.3	10.9	12.2	13.7
23	10.7	10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.7	9.6	10.4	11.7	12.7	13.8
24	5.6	5.4	4.9	4.8	3.9	4.3	4.3	4.5	5.4	8.1	10.7	12.7
25	5.0	4.7	4.3	3.7	3.6	4.3	4.6	4.7	4.8	6.3	8.6	11.8
26	8.5	8.2	8.3	7.8	7.5	7.0	7.2	7.4	8.1	8.5	10.0	11.9
27	6.2	5.7	4.9	4.3	3.8	4.3	4.2	4.4	5.0	6.3	7.8	10.5
28	4.8	4.5	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.0	4.4	7.2	9.9	12.0
29	6.3	5.8	5.6	5.0	4.2	3.5	3.3	3.7	5.4	8.1	10.3	12.2
30	6.1	6.3	6.2	7.1	6.2	6.5	6.0	7.4	9.1	14.9	15.8	17.0
31	8.4	8.3	7.9	7.3	7.0	7.5	7.3	7.5	9.4	11.2	13.0	15.1
M.	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.6	8.6	10.1	11.6	13.1

Temperatur (C°.)

September.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	18.3	18.7	18.6	18.1	17.2	16.0	14.6	13.5	13.0	12.9	12.6	12.9	14.9	18.7	12.0
2	17.0	18.4	19.3	19.4	18.7	17.1	15.0	13.4	12.3	11.7	11.0	10.3	13.5	19.4	10.1
3	20.0	21.3	21.8	20.5	18.9	17.4	16.6	16.1	15.6	15.0	14.6	14.3	14.3	21.8	7.9
4	21.0	21.7	22.7	21.7	20.1	19.0	18.0	17.6	17.3	16.8	16.0	15.2	16.7	22.7	11.3
5	22.9	23.8	24.1	23.7	22.9	21.0	18.9	17.4	16.4	15.5	14.8	14.5	17.9	24.1	13.0
6	23.2	24.1	25.1	24.9	23.9	21.9	19.4	17.8	16.9	16.5	15.6	14.5	17.9	25.1	12.8
7	23.2	25.0	25.2	25.0	24.1	22.4	19.0	17.2	16.3	16.0	13.9	13.3	17.3	25.2	11.2
8	23.6	25.0	25.5	25.4	24.5	23.0	19.6	17.5	16.7	16.2	15.1	13.9	17.1	25.5	10.2
9	24.2	25.0	26.1	25.9	25.2	24.0	20.1	18.5	17.3	16.9	15.5	14.6	17.8	26.1	10.5
10	24.7	25.0	26.8	27.2	25.0	22.2	19.6	18.1	17.5	16.3	15.0	14.0	18.0	27.2	11.8
11	24.2	25.4	25.6	25.7	25.1	22.9	19.6	18.8	16.4	14.4	13.9	14.3	17.3	25.7	10.6
12	22.5	23.6	24.8	24.6	16.1	15.6	15.8	16.1	16.4	15.3	14.8	13.9	16.8	24.8	12.6
13	21.3	19.5	20.0	20.1	19.7	18.3	17.0	16.1	15.4	14.6	14.6	14.5	15.8	21.3	11.4
14	19.2	19.7	20.1	19.8	18.7	17.2	15.4	14.6	13.5	12.7	12.0	11.2	15.5	20.1	13.8
15	19.3	20.3	20.8	20.7	19.7	17.7	15.6	14.2	13.5	13.0	12.5	11.8	14.0	20.8	8.8
16	19.4	20.8	22.2	21.9	21.2	19.7	16.6	15.5	14.7	13.8	12.8	11.9	14.4	22.2	8.4
17	21.1	22.9	23.5	23.5	22.3	20.4	17.4	16.0	15.0	13.7	12.6	12.3	15.2	23.5	8.6
18	22.8	24.0	24.2	24.2	23.3	19.4	17.5	17.4	16.5	15.9	15.8	14.8	16.1	24.2	8.7
19	19.1	18.4	17.8	16.7	15.6	15.0	14.1	13.9	13.8	13.7	13.7	13.7	14.5	19.1	11.5
20	19.4	19.5	19.6	19.2	17.7	16.3	14.1	13.1	12.0	11.6	10.6	10.2	14.9	19.6	10.2
21	18.1	19.9	20.7	20.3	19.6	16.7	14.4	13.0	12.3	11.6	11.0	10.0	12.9	20.7	7.7
22	20.0	21.3	21.9	21.6	19.5	16.5	15.2	14.3	13.4	12.2	11.3	10.4	13.1	21.9	7.7
23	18.5	19.3	18.9	18.3	16.7	14.3	12.5	11.6	11.0	10.3	9.7	9.0	12.2	19.3	7.1
24	15.4	16.1	15.5	14.5	13.2	11.9	11.0	10.4	10.4	10.0	9.9	9.2	11.4	16.1	9.0
25	14.9	15.5	15.6	14.8	13.5	11.7	9.5	8.8	8.0	7.2	6.6	5.9	10.1	15.6	5.9
26	14.2	15.6	16.1	15.8	14.5	12.8	10.4	8.7	8.1	7.6	6.8	6.4	8.5	16.1	2.1
27	19.5	20.5	20.8	20.3	17.8	15.4	13.1	12.6	11.4	10.9	10.8	10.7	11.4	20.8	4.1
28	12.9	13.0	13.2	12.9	12.6	12.2	11.1	10.8	10.7	10.6	10.6	10.6	11.2	13.2	9.0
29	12.9	12.5	13.0	12.4	10.8	10.3	10.1	10.0	9.7	9.7	9.6	9.6	10.9	13.1	10.5
30	15.9	15.2	15.3	15.5	14.5	13.6	12.5	12.0	11.6	11.0	10.8	10.7	11.8	15.9	9.2
M.	19.6	20.4	20.8	20.5	19.1	17.4	15.5	14.5	13.8	13.1	12.5	11.9	14.5	21.0	9.6

October.

1	17.6	17.5	16.1	15.8	15.1	13.9	13.2	12.9	12.0	10.7	10.6	10.5	13.2	17.6	10.5
2	18.0	18.6	18.9	18.0	16.6	15.1	14.7	14.4	13.7	13.0	11.1	11.6	14.1	18.9	11.3
3	20.3	20.8	21.7	20.9	18.6	16.0	14.9	14.0	13.3	12.8	11.0	10.6	14.8	21.7	10.6
4	19.5	21.6	21.2	20.1	17.9	15.8	14.1	12.5	12.0	11.3	10.4	10.0	13.2	21.6	8.1
5	18.2	19.7	20.1	19.3	17.5	15.3	13.8	12.5	12.0	10.9	10.2	10.9	12.4	20.1	6.8
6	19.1	19.8	20.4	20.1	18.0	15.2	14.2	13.2	12.3	10.9	10.2	10.8	13.1	20.4	8.2
7	14.0	14.1	14.1	13.9	13.3	12.6	12.3	12.1	12.0	11.8	11.6	11.6	12.4	14.1	11.3
8	16.2	16.8	17.1	16.5	15.0	12.4	11.4	11.1	10.6	10.6	10.4	9.2	12.5	17.1	9.2
9	14.3	14.0	13.8	12.6	11.5	10.7	10.0	9.4	9.4	9.2	9.2	9.1	10.3	14.3	8.1
10	13.6	13.6	13.5	13.2	11.8	9.7	8.5	7.9	7.4	6.4	6.1	5.9	9.6	13.6	5.9
11	13.0	13.5	14.0	13.2	12.2	10.7	10.2	9.6	9.4	9.9	9.7	9.9	9.0	11.0	4.8
12	6.0	5.3	4.7	4.3	3.5	3.1	2.4	2.3	2.1	1.7	1.7	1.9	5.9	10.1	1.7
13	8.4	9.2	9.3	9.5	8.6	7.6	6.3	5.3	5.7	5.8	5.7	5.7	5.1	9.5	1.6
14	9.6	10.8	11.2	12.1	11.9	8.5	7.7	6.6	5.8	5.9	6.0	5.7	7.4	12.1	5.2
15	9.6	11.8	11.4	11.9	10.4	9.9	10.1	8.9	8.7	8.1	6.9	7.4	7.9	11.9	4.8
16	14.6	15.6	15.8	14.8	13.7	11.1	9.9	9.3	9.2	7.9	7.5	6.9	9.7	15.8	6.0
17	16.5	15.0	13.6	13.0	12.8	12.3	12.2	10.1	9.4	8.3	7.4	7.0	9.2	16.5	4.6
18	15.6	15.5	15.0	12.6	13.1	13.7	12.4	11.5	13.8	10.3	8.9	9.2	9.8	15.6	5.4
19	10.7	11.0	10.6	9.8	9.4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	8.4	11.0	6.0
20	11.8	12.1	12.0	10.9	10.1	9.9	9.4	8.8	8.6	7.7	7.1	6.2	9.8	12.1	6.2
21	12.5	13.0	12.1	12.1	10.8	10.1	9.4	8.9	8.6	8.5	8.5	8.4	9.1	13.0	6.6
22	14.6	15.2	15.2	14.5	12.4	11.3	10.5	11.0	11.1	11.2	11.1	11.0	10.9	15.2	8.3
23	14.7	15.2	15.7	14.9	12.6	11.0	10.0	8.7	8.6	7.4	6.9	6.3	11.0	15.7	6.3
24	14.0	14.8	15.7	13.8	11.8	10.2	9.0	8.0	7.2	6.9	5.8	5.2	8.2	15.7	3.9
25	12.9	13.5	13.5	12.9	11.3	10.1	9.3	8.9	9.2	9.2	8.9	8.6	8.1	13.5	3.6
26	12.4	13.0	12.9	12.4	10.2	8.9	8.2	7.7	7.0	6.4	6.1	6.0	8.8	13.0	6.0
27	12.3	13.8	14.4	13.8	11.1	9.4	8.8	8.1	7.9	6.5	5.7	5.5	7.7	14.4	3.8
28	14.1	15.0	15.3	14.6	12.3	10.5	9.2	8.4	7.9	7.0	6.5	6.4	7.9	15.3	3.0
29	14.2	15.1	15.2	14.3	11.4	9.5	8.6	7.7	7.5	6.6	6.3	6.3	8.2	15.2	3.3
30	17.3	17.3	16.8	16.3	15.7	15.2	13.4	12.3	10.2	10.3	9.2	8.9	11.3	17.3	6.0
31	18.2	18.1	18.0	17.2	16.2	15.1	13.6	13.3	10.2	9.1	8.7	8.9	11.5	18.2	7.0
M.	14.3	14.9	14.8	14.2	12.8	11.4	10.5	9.8	9.4	8.8	8.2	8.1	10.0	15.3	6.3

November.

Temperatur (C°.)

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	8.2	8.6	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	9.2	9.8	11.3	12.1
2	8.2	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.1	7.7	8.1	9.0	10.3	10.2
3	3.5	3.4	2.8	2.6	2.3	2.1	1.6	1.5	3.0	5.5	9.7	12.0
4	3.4	3.1	2.8	2.5	2.6	2.2	2.1	2.1	3.8	6.2	9.9	12.4
5	4.9	4.6	4.1	3.7	3.5	3.2	2.8	3.2	4.9	7.0	9.2	10.3
6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.5	7.9	8.6	9.5	9.7
7	7.2	7.1	6.8	6.8	9.0	6.8	6.7	6.8	6.9	8.1	10.5	10.6
8	4.0	3.9	3.4	2.9	2.9	2.4	2.1	2.5	2.9	4.8	7.0	9.3
9	3.6	3.3	2.8	2.9	2.6	2.5	2.0	1.6	2.5	4.5	7.2	9.5
10	1.9	1.7	1.3	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	2.1	4.5	7.2	10.8
11	1.9	1.5	1.1	0.7	0.8	1.4	1.4	1.7	2.3	3.7	6.4	7.2
12	1.6	0.9	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4	1.2	2.9	5.6	8.0
13	4.0	3.4	3.0	3.5	3.9	2.9	2.6	2.6	3.7	6.2	8.4	10.6
14	1.8	1.4	1.2	1.0	0.5	0.2	0.5	0.2	1.5	3.3	5.6	8.0
15	1.5	1.4	0.7	0.6	0.6	0.0	-0.3	-0.9	-0.3	0.0	2.2	4.8
16	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	2.1	3.1	4.5
17	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.4	5.6	6.2	6.3
18	5.2	4.7	4.0	3.0	2.7	2.9	2.0	1.4	2.3	3.0	4.2	6.1
19	-0.4	1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-2.0	-2.7	-2.7	-2.2	-1.4	0.7	3.5
20	1.8	1.0	1.3	2.0	2.5	1.4	0.6	0.9	1.7	4.8	6.3	8.2
21	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-1.0	-0.1	1.6	3.5	5.4
22	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.2	1.5	3.0	5.4
23	1.9	1.6	1.5	1.1	1.5	1.6	1.7	1.8	2.2	2.5	3.1	4.1
24	2.3	2.6	2.8	2.1	1.5	1.1	0.8	0.4	0.3	0.9	4.9	5.6
25	10.6	10.7	10.9	11.1	10.5	10.6	10.7	11.2	12.2	13.1	12.9	13.9
26	8.3	7.8	7.6	7.4	7.7	8.7	6.7	6.0	6.8	7.3	6.1	5.7
27	9.1	8.2	7.8	6.7	6.0	6.3	7.1	5.7	8.0	9.3	10.3	9.7
28	1.5	0.7	0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	0.7	-0.5	0.8	2.5	5.0
29	10.0	10.1	10.3	10.3	10.0	10.0	9.8	9.9	10.2	10.9	11.1	11.9
30	4.6	4.6	4.4	3.6	2.6	2.3	2.0	1.7	1.1	0.9	0.9	1.3
M.	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	3.6	4.9	6.6	8.1

December.

1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.4	2.3	2.5
2	-3.3	-3.4	-3.5	-3.6	-3.9	-4.4	-4.3	-4.1	-4.3	-3.2	-2.1	-1.2
3	-3.7	-3.9	-4.1	-4.1	-3.6	-3.3	-2.7	-2.1	-2.0	-1.1	0.1	1.2
4	-1.8	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0	-3.1	-2.7	-1.0	0.1	2.1
5	-2.1	-2.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.6	-2.2	-2.3	-1.9	-0.8	0.7	2.9
6	-1.2	-1.3	-1.7	-2.3	-2.1	-2.6	-2.7	-2.4	-2.1	-0.7	1.1	2.2
7	-2.1	-2.3	-2.6	-2.7	-3.0	-3.2	-3.2	-3.0	-2.4	-1.1	0.9	1.9
8	2.5	3.1	3.2	2.9	3.4	3.0	1.4	0.6	0.7	1.6	3.5	4.8
9	-2.7	-2.8	-3.2	-3.5	-3.8	-4.1	-4.2	-4.3	-4.3	-3.3	-2.4	-0.9
10	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.0	0.1	0.3	1.2	2.6	4.0
11	-1.0	-1.4	-1.5	-1.5	-1.7	-1.9	-1.8	-2.3	-2.2	-0.9	0.6	2.2
12	-2.5	-2.5	-2.6	-2.5	-2.6	-2.8	-3.2	-3.4	-2.6	-1.3	-0.5	1.1
13	-1.0	-1.4	-2.1	-2.2	-2.3	-2.2	-2.0	-1.2	-0.4	0.1	0.5	1.5
14	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.1	1.7	2.9	3.4
15	-1.2	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.9	1.3	1.7	1.9	2.4	3.2
16	2.9	2.6	3.0	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	0.9
17	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.0	1.4
18	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.7	1.9
19	-1.6	-1.6	-2.4	-2.5	-3.0	-3.1	-3.3	-3.2	-3.0	-3.0	-2.0	-0.8
20	0.3	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.9	1.7	1.8	1.9
21	-1.0	-1.0	-1.7	-1.6	-1.6	-2.4	-3.8	-4.3	-3.9	-3.3	-2.7	-2.3
22	-3.9	-4.7	-5.9	-7.4	-7.6	-7.3	-8.3	-8.4	-8.8	-8.6	-8.1	-7.3
23	-10.7	-10.5	-9.7	-9.1	-8.9	-8.4	-8.2	-8.0	-7.8	-7.0	-6.0	-5.8
24	-11.7	-11.9	-12.6	-12.9	-13.1	-12.8	-13.1	-12.9	-12.8	-12.2	-10.4	-8.6
25	-12.5	-12.5	-12.9	-12.8	-12.8	-12.9	-13.2	-13.1	-12.8	-12.2	-10.0	-7.8
26	-11.6	-12.1	-12.0	-12.2	-12.2	-12.6	-12.6	-12.4	-12.2	-10.7	-8.4	-6.8
27	-11.4	-11.5	-11.8	-12.1	-12.6	-12.5	-12.6	-12.5	-12.0	-10.3	-8.3	-6.1
28	-5.4	-5.8	-5.7	-4.5	-5.3	-4.2	-3.1	-3.5	-3.0	-0.7	1.1	3.0
29	2.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.3	1.9
30	-3.3	-4.1	-4.3	-3.9	-3.8	-4.5	-5.0	-4.0	-4.0	-1.5	-1.2	-0.3
31	-0.3	-0.7	-1.5	-1.5	-1.3	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	0.0	1.7	1.7
M	-2.7	-2.9	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.1	-2.3	-1.1	0.1

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
1	15.2	15.0	14.2	13.1	11.3	10.7	10.2	10.1	10.3	9.8	9.2	8.6	10.3	16.6	8.1
2	11.1	10.7	10.5	10.1	8.9	7.4	6.5	5.8	5.3	4.7	4.4	3.7	7.8	11.1	3.7
3	13.3	14.2	14.3	13.6	12.7	11.3	8.3	6.7	6.0	5.3	4.4	4.0	6.8	14.3	1.5
4	13.7	15.2	15.3	14.1	11.9	10.3	9.2	8.1	7.0	6.4	5.7	5.3	7.3	15.3	2.1
5	11.5	12.2	12.9	11.8	10.0	8.9	8.6	8.3	8.2	8.2	7.9	7.6	7.4	12.9	2.8
6	10.4	10.5	9.9	9.5	8.7	8.3	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.3	8.2	10.5	7.3
7	11.1	11.4	12.0	11.4	9.5	7.8	7.0	5.9	5.7	5.1	4.7	4.6	7.8	12.0	4.6
8	11.3	12.2	12.5	11.4	9.2	7.6	6.4	5.7	5.0	4.5	3.9	3.6	5.9	12.5	2.4
9	11.2	12.2	11.9	10.0	7.9	6.5	5.3	4.8	4.0	3.6	2.9	2.4	5.3	12.2	1.6
10	12.4	13.3	12.9	11.1	8.8	6.8	5.5	4.7	4.0	3.1	2.6	2.1	5.1	13.3	0.8
11	9.2	10.2	10.3	9.7	8.0	6.4	5.8	4.4	3.6	3.2	2.2	1.9	4.4	10.3	0.7
12	9.4	11.4	11.2	10.0	7.7	6.6	5.6	4.7	4.0	3.6	3.8	4.0	4.3	11.4	0.0
13	12.4	12.6	12.1	9.7	8.1	6.7	5.6	4.6	4.0	3.3	2.8	2.2	5.8	12.6	2.2
14	9.9	11.0	11.3	9.4	7.2	5.9	4.3	3.4	2.5	1.6	1.4	1.5	3.9	11.3	0.2
15	6.2	8.2	8.9	7.1	5.2	3.7	2.9	2.0	2.4	2.4	2.4	2.0	2.7	8.9	-0.9
16	5.1	5.8	6.0	5.9	5.4	4.8	4.6	4.6	4.4	4.3	4.1	3.8	3.4	6.0	1.3
17	7.6	7.4	5.8	5.7	5.6	5.3	5.8	5.7	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	7.6	3.7
18	7.2	8.0	8.5	7.7	5.6	3.9	2.8	2.4	1.5	0.8	0.1	-0.5	3.7	8.5	-0.5
19	5.6	6.8	6.6	4.9	7.6	5.9	7.0	5.6	5.5	2.5	2.7	2.0	2.1	7.6	-2.7
20	9.8	10.2	10.4	9.2	7.8	6.8	4.8	3.1	2.2	1.3	0.7	0.6	4.1	10.4	-0.6
21	6.6	8.1	7.9	6.2	4.1	3.2	2.4	1.5	0.9	0.6	0.4	0.0	2.1	8.1	-1.0
22	7.8	8.0	6.6	5.5	4.9	4.2	4.0	3.0	2.7	2.1	2.1	1.9	2.5	8.0	-0.8
23	4.4	4.6	4.5	4.1	3.9	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	2.7	2.5	2.8	4.6	1.4
24	12.3	13.4	12.9	10.9	10.2	11.6	11.4	11.1	11.1	10.9	11.0	10.8	6.8	13.4	0.3
25	12.8	13.1	13.3	12.5	11.2	12.0	10.4	10.0	11.0	11.4	10.3	9.5	11.5	13.9	9.5
26	6.9	7.6	7.3	5.7	4.7	3.7	3.1	3.2	2.8	2.9	2.6	2.3	5.8	8.7	2.3
27	10.7	11.5	11.3	9.9	9.4	8.9	8.9	8.9	5.9	5.2	3.5	2.6	2.0	7.7	11.5
28	8.8	10.4	9.5	9.6	9.5	9.0	9.6	9.9	9.6	9.1	9.8	9.9	5.1	11.4	-0.7
29	10.4	9.2	8.9	9.4	8.6	6.4	5.8	5.6	5.0	4.9	4.8	4.7	8.7	11.9	4.7
30	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.9	4.6	0.9
M.	9.5	10.2	10.0	9.0	7.8	6.8	6.1	5.4	5.1	4.6	4.2	3.9	5.5	10.7	1.9

December.

1	2.8	2.9	3.0	1.6	0.6	-0.2	-0.6	-1.3	-1.5	-2.1	-2.4	-3.4	0.6	3.0	-3.4
2	0.3	1.0	1.3	0.5	-0.6	-1.3	-2.0	-2.3	-3.0	-3.3	-3.4	-3.7	-2.4	1.3	-4.4
3	2.1	2.6	2.5	1.2	0.7	0.4	0.2	-0.3	-0.8	-1.0	-1.6	-1.8	-1.0	2.6	-4.1
4	3.2	3.8	4.1	2.7	1.2	0.6	0.0	-0.3	-1.0	-0.8	-1.4	-1.7	-0.5	4.1	-3.1
5	3.7	4.3	4.2	2.7	1.6	1.0	0.6	0.3	0.1	-0.2	-0.8	-0.9	0.0	4.3	-2.6
6	3.8	4.3	3.7	2.1	1.1	0.9	-0.3	-0.3	-0.8	-1.0	-1.6	-1.8	-0.2	4.3	-2.7
7	3.7	4.5	4.7	3.2	3.3	2.6	1.4	1.2	2.4	2.0	2.4	3.0	0.5	4.7	-3.2
8	5.6	6.0	6.3	3.4	1.9	1.0	0.3	-0.5	-0.8	-1.3	-1.9	-2.0	2.0	6.3	-2.0
9	1.6	2.2	1.8	1.3	1.2	1.5	1.5	1.7	1.2	0.9	1.1	0.9	-0.9	2.2	-4.3
10	5.0	4.6	4.2	2.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5	0.8	0.0	-0.4	1.6	5.0	-0.4
11	2.9	3.8	3.9	3.1	1.5	0.5	-0.3	-0.6	-1.2	-1.6	-1.8	-2.3	-0.2	3.9	-2.3
12	2.1	2.8	2.8	1.8	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	2.8	-3.4
13	2.2	4.0	4.1	2.4	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	0.0	4.1	-2.3
14	4.3	4.5	4.4	3.4	1.9	2.0	1.4	0.7	0.1	-0.4	-0.7	-1.1	1.3	4.5	-1.1
15	7.7	7.3	7.2	7.4	5.3	4.3	4.1	4.7	5.2	4.6	3.5	2.8	3.3	8.8	-1.2
16	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.7	1.5	-0.1
17	2.4	3.8	3.1	2.5	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	3.8	-0.1
18	2.6	3.8	3.9	3.5	2.0	1.1	0.4	0.1	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	1.3	3.8	-1.0
19	1.1	1.9	2.1	1.7	1.3	1.3	1.5	1.4	1.2	0.7	0.4	0.2	-0.6	2.1	-3.3
20	2.1	2.0	2.5	1.8	1.0	0.9	0.3	-0.7	-1.3	-1.1	-1.0	-1.0	0.8	2.5	-1.3
21	-1.5	-1.7	-2.0	-2.1	-2.6	-2.9	-3.0	-3.0	-3.5	-3.6	-3.6	-3.8	-2.6	-1.5	-3.8
22	-6.0	-6.3	-6.2	-7.0	-8.1	-8.9	-10.0	-10.7	-11.3	-12.2	-11.5	-12.1	-8.2	-3.9	-12.2
23	-5.4	-5.5	-5.4	-6.5	-7.7	-8.2	-9.1	-10.0	-10.5	-10.6	-11.4	-11.7	-8.4	-5.4	-11.7
24	-7.1	-5.8	-5.4	-6.3	-7.9	-8.5	-9.3	-9.9	-10.6	-10.9	-11.5	-11.5	-10.4	-5.4	-13.1
25	-5.9	-4.2	-4.5	-6.1	-7.8	-8.6	-9.4	-9.7	-10.4	-10.7	-10.8	-11.4	-10.2	-4.2	-13.2
26	-5.0	-4.1	-3.7	-5.3	-6.7	-7.3	-8.3	-9.1	-9.4	-10.2	-10.6	-11.4	-9.5	-3.7	-12.6
27	-5.2	-3.9	-3.9	-5.9	-6.8	-7.4	-8.5	-8.5	-8.3	-6.4	7.1	6.2	-8.8	-3.9	-12.6
28	2.7	3.3	7.0	6.3	6.3	5.4	1.2	0.3	-0.2	0.1	0.7	2.1	-0.1	7.0	-5.8
29	2.0	2.0	1.9	0.2	-1.1	-2.4	-3.3	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-2.8	-0.3	2.1	-3.7
30	1.2	1.8	1.8	2.4	0.8	0.7	0.6	0.9	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-1.3	2.1	-5.0
31	1.9	1.8	1.6	1.0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	-0.1	-0.7	-1.3	0.0	1.9	-1.5
M.	1.0	1.6	1.7	0.7	-0.4	-0.9	-1.5	-1.8	-2.1	-2.3	-2.5	-2.7	-1.7	2.0	-4.6

Jänner.

Relative Feuchtigkeit.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	51	52	51	52	51	51	50	52	51	52	49	50
2	47	46	47	47	50	51	54	62	65	66	66	65
3	95	95	95	95	95	96	96	96	96	97	95	95
4	99	99	99	98	98	97	97	97	97	96	95	91
5	88	89	89	88	88	88	88	88	88	87	81	74
6	90	90	90	81	87	87	84	84	84	85	82	79
7	90	91	91	90	90	91	89	89	88	88	84	82
8	92	93	94	94	95	95	95	96	95	95	91	88
9	93	95	92	90	90	85	79	72	74	76	71	65
10	78	81	82	82	82	81	85	87	90	90	80	72
11	88	89	89	88	87	88	87	88	88	81	75	70
12	86	87	89	90	92	93	92	93	91	85	76	70
13	89	90	91	91	92	93	94	94	92	85	76	69
14	83	86	86	85	86	87	88	89	88	83	70	63
15	67	68	67	71	75	80	84	86	88	87	74	70
16	87	89	90	92	90	89	88	88	87	80	69	58
17	83	85	86	88	89	90	89	88	87	86	81	70
18	84	85	86	88	88	87	88	89	89	87	78	69
19	84	85	85	87	87	88	89	89	90	86	79	71
20	83	85	86	86	88	89	89	90	90	87	78	69
21	82	84	84	85	86	86	86	88	90	86	75	67
22	77	78	84	85	79	74	81	83	85	78	67	63
23	76	81	84	86	87	90	94	95	96	96	94	92
24	94	95	96	97	97	97	97	96	95	94	93	92
25	93	93	93	94	95	95	95	95	96	95	93	89
26	93	94	49	94	95	95	95	96	95	93	89	83
27	84	86	89	90	91	92	93	94	94	91	82	72
28	86	86	86	86	82	77	78	79	76	71	69	63
29	81	83	84	85	86	86	89	88	87	83	75	72
30	88	88	88	88	89	91	91	91	92	89	78	70
31	71	67	72	76	79	82	88	91	90	80	56	43
M.	83.3	84.4	85.1	85.7	86.0	86.2	86.8	87.5	87.6	85.1	78.1	72.5

Februar.

1	80	86	86	84	80	79	81	85	81	80	69	66
2	86	86	86	89	91	93	91	89	88	83	73	62
3	72	55	69	73	66	68	50	52	57	60	72	76
4	91	91	92	89	87	85	92	90	81	78	85	87
5	94	95	95	94	91	89	89	91	89	82	73	71
6	92	92	93	93	94	87	84	86	81	78	76	69
7	79	79	79	78	78	79	82	79	78	76	69	62
8	95	94	93	92	94	94	94	94	91	87	79	78
9	89	90	89	90	91	92	93	93	88	85	84	88
10	98	98	97	97	96	94	94	92	86	72	66	62
11	86	81	85	85	87	88	89	90	89	83	74	67
12	83	85	85	87	87	88	89	88	87	84	75	71
13	88	90	91	92	93	93	93	93	90	84	77	72
14	91	91	91	91	90	90	92	93	87	81	78	72
15	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	95
16	96	96	96	96	96	96	96	96	97	96	95	91
17	61	72	76	83	82	90	93	91	94	89	91	80
18	94	94	95	95	95	95	95	95	95	94	92	91
19	96	96	95	95	95	94	94	93	92	87	85	82
20	89	89	90	89	90	92	92	92	90	86	82	78
21	92	92	92	92	92	92	92	92	84	69	66	63
22	79	81	80	79	80	79	79	78	74	69	61	48
23	64	72	80	86	89	90	92	92	89	88	87	88
24	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	94	92
25	84	84	85	83	84	85	86	84	78	73	69	70
26	87	88	89	90	91	91	92	92	90	82	75	73
27	86	88	89	90	91	91	92	92	90	86	78	75
28	93	93	92	92	91	91	91	91	92	89	90	88
M.	86.9	87.5	88.6	89.1	89.0	89.2	89.3	89.2	86.7	82.6	79.0	75.6

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.	Stunden-Sonnen-schein
1	48	46	46	48	50	48	49	48	49	47	49	49	49	52	46	1.3
2	64	63	61	62	65	70	74	77	78	87	91	94	65	94	46	0.2
3	82	82	81	83	87	92	95	96	97	98	98	99	93	99	81	4.4
4	78	68	61	64	74	78	84	86	86	86	85	86	87	99	61	4.7
5	73	67	71	68	79	83	84	85	86	87	88	90	83	90	68	0.0
6	71	73	70	72	77	80	84	87	87	88	89	90	83	90	70	0.0
7	74	71	68	71	77	82	84	85	86	88	90	91	85	91	68	0.4
8	85	84	83	86	89	90	92	92	93	92	89	91	91	96	83	0.6
9	64	59	62	63	65	63	55	70	73	76	79	78	75	95	59	0.0
10	66	61	64	73	80	85	87	87	88	86	87	89	81	90	61	4.6
11	66	70	72	77	81	85	89	90	91	89	88	87	83	91	66	1.2
12	63	60	57	64	75	80	83	85	86	87	88	89	82	93	57	6.2
13	62	53	56	65	74	75	77	76	78	81	82	81	80	94	53	4.1
14	51	44	48	49	57	61	67	69	68	67	67	67	71	89	44	2.7
15	58	45	45	52	63	70	76	78	78	80	85	86	73	88	45	5.0
16	52	46	44	44	56	63	69	73	78	78	79	82	73	92	44	6.6
17	59	49	48	56	59	64	71	76	78	79	82	83	76	90	48	5.0
18	61	51	43	49	60	61	70	74	79	78	81	81	75	89	43	5.8
19	58	48	47	49	55	62	68	74	77	78	81	82	75	90	47	6.1
20	57	49	44	44	50	59	65	71	75	78	78	81	74	90	44	6.1
21	57	46	42	39	44	51	61	66	73	74	76	77	71	90	39	6.5
22	52	44	42	43	40	55	66	70	71	71	73	75	68	85	40	5.2
23	88	86	80	80	83	87	91	93	94	94	93	93	88	96	76	1.2
24	86	81	78	81	81	78	83	85	89	90	92	92	90	97	78	0.0
25	84	82	80	82	87	88	89	90	90	91	92	92	91	96	80	0.0
26	78	75	73	70	80	84	86	87	83	82	80	81	86	96	70	0.9
27	66	65	72	75	80	83	87	89	90	85	83	85	84	94	65	6.7
28	61	61	60	58	64	73	75	76	79	81	79	80	75	86	58	4.0
29	62	57	52	53	58	68	75	80	83	85	85	87	77	89	52	7.0
30	50	47	41	40	46	56	64	74	74	75	76	77	73	92	40	5.0
31	<u>33</u>	54	87	79	71	67	74	73	77	82	74	87	73	91	<u>33</u>	3.1
M.	64.8	60.9	60.6	62.6	68.0	72.3	76.6	79.4	81.1	81.9	82.6	84.0	78.4	90.8	56.9	3.4

Februar.

1	69	64	69	67	71	73	76	76	77	79	81	82	77	86	64	0.3
2	61	53	51	52	58	61	45	62	68	52	48	60	70	93	45	5.5
3	89	93	95	91	95	86	93	89	85	88	91	90	77	95	50	0.0
4	83	80	86	90	93	95	95	95	95	95	96	94	89	96	78	0.0
5	66	64	70	73	77	79	88	91	93	93	93	92	85	95	64	1.4
6	64	66	64	62	67	72	75	75	79	81	81	77	79	94	62	8.1
7	62	56	60	78	87	89	90	91	92	93	94	95	79	95	56	1.4
8	74	70	70	77	84	85	89	90	90	90	89	89	87	95	70	0.4
9	86	85	89	90	92	94	96	96	97	97	97	98	91	98	84	0.5
10	58	57	62	65	74	78	80	82	83	85	86	87	81	98	57	4.2
11	61	59	64	64	64	69	72	75	78	79	81	82	77	90	59	3.2
12	65	70	69	68	73	77	79	80	83	84	85	86	80	89	65	0.4
13	65	59	65	65	66	70	80	83	84	85	87	90	81	93	59	6.6
14	69	68	71	72	80	87	94	95	96	96	96	97	86	97	68	0.0
15	91	84	83	85	88	92	94	95	96	96	96	97	94	97	83	0.5
16	87	85	85	85	86	89	92	94	95	96	96	96	93	97	85	1.6
17	82	73	82	92	95	95	94	88	89	91	93	94	86	95	61	0.0
18	92	92	93	93	94	95	95	96	96	96	96	96	94	96	91	0.0
19	79	80	79	81	84	86	85	86	89	89	90	90	88	96	79	1.3
20	77	75	70	72	73	78	82	87	88	90	91	92	85	92	70	4.3
21	63	60	49	49	65	75	80	79	79	80	80	76	76	92	49	7.4
22	52	52	54	54	55	53	52	51	55	55	52	52	63	81	51	8.9
23	88	91	93	94	94	95	95	95	95	95	95	95	89	95	64	0.0
24	85	77	75	76	83	85	88	89	90	90	88	87	89	95	75	4.2
25	64	65	65	67	69	74	79	83	84	84	85	86	78	86	64	1.6
26	70	68	69	71	73	75	79	82	86	86	86	86	82	92	68	4.1
27	77	78	72	74	82	83	87	89	91	92	92	93	86	93	72	4.0
28	87	83	79	79	83	89	92	94	95	96	96	97	90	97	79	2.1
M.	73.8	71.7	72.6	74.5	78.2	81.0	83.6	85.3	86.7	86.8	87.2	87.8	83.3	93.5	66.9	2.6

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	97	98	97	97	93	91	80	77	74	79	82	78
2	80	82	80	75	77	78	65	69	64	55	56	53
3	92	93	94	93	94	93	93	90	86	82	77	73
4	58	67	77	79	83	83	85	83	76	65	58	51
5	50	58	52	52	57	57	57	62	63	57	52	50
6	66	75	79	78	78	81	83	86	92	90	88	87
7	94	94	94	95	95	95	96	95	92	90	86	82
8	92	93	93	93	93	94	93	91	81	71	49	42
9	79	84	84	86	87	89	84	81	75	69	62	59
10	95	95	96	96	97	97	97	97	96	94	81	75
11	89	90	89	90	90	89	90	89	88	83	80	77
12	92	94	94	93	95	96	96	95	93	69	41	34
13	83	86	89	87	88	89	89	83	76	64	53	51
14	91	91	92	93	96	95	92	85	81	73	62	57
15	84	89	89	89	89	88	89	86	80	73	64	52
16	84	85	87	89	90	89	89	86	79	63	51	45
17	86	93	96	97	97	97	96	96	95	94	94	86
18	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	93
19	95	95	96	96	96	96	96	96	96	95	94	80
20	94	94	94	95	95	96	96	95	85	71	61	55
21	93	93	94	93	94	94	94	94	92	91	89	88
22	94	94	90	90	90	90	89	83	80	72	67	61
23	80	83	84	88	91	92	93	90	80	67	58	56
24	83	82	87	94	95	95	96	95	95	94	92	87
25	95	95	93	92	91	91	89	89	88	89	86	83
26	94	94	94	94	95	94	94	80	56	45	39	36
27	69	76	78	77	79	83	82	77	71	48	39	38
28	71	77	80	83	81	80	81	82	76	62	56	49
29	79	80	80	83	77	82	69	71	49	45	42	42
30	75	78	84	82	83	93	96	96	95	95	95	95
31	92	90	90	90	89	90	88	86	71	69	60	47
M.	84.4	86.6	87.6	88.2	88.7	89.4	88.2	86.5	81.4	74.4	68.0	63.3

April.

1	45	47	47	54	73	79	77	75	66	61	56	50
2	89	92	92	96	95	94	93	84	75	67	49	39
3	94	89	88	89	90	90	93	90	83	71	62	58
4	84	84	87	91	92	92	91	91	70	61	49	52
5	82	84	86	87	86	88	85	78	75	70	69	62
6	83	86	87	88	90	89	89	75	64	54	50	46
7	86	89	89	92	94	91	84	70	57	48	33	33
8	83	85	89	89	90	89	81	67	52	46	35	36
9	87	88	90	92	92	91	81	68	57	48	45	37
10	75	77	74	77	81	82	80	89	91	86	83	73
11	93	93	92	92	95	94	93	93	93	80	68	58
12	80	81	81	81	80	80	78	75	71	63	53	47
13	69	74	76	75	75	74	68	57	38	38	44	48
14	95	94	94	93	93	91	89	87	79	73	61	53
15	88	90	90	91	93	93	83	68	44	37	31	25
16	44	45	46	47	51	51	48	46	44	43	43	43
17	56	59	60	66	77	75	79	75	71	70	61	57
18	54	55	52	50	53	62	60	62	55	43	41	41
19	76	82	84	86	86	83	81	76	68	59	56	49
20	50	92	93	94	96	91	84	80	72	64	54	50
21	94	95	94	93	91	88	80	73	66	63	56	41
22	84	84	85	87	93	94	93	93	88	79	73	74
23	92	93	93	91	90	90	89	90	88	80	68	67
24	88	86	89	89	88	87	84	82	76	67	61	58
25	84	83	84	85	87	89	87	79	72	68	64	57
26	87	94	97	95	95	95	94	85	77	61	39	34
27	76	80	84	80	78	81	78	70	62	53	41	37
28	91	89	81	86	87	83	79	72	64	51	41	40
29	89	82	93	95	90	88	84	79	74	66	58	52
30	93	95	95	93	93	91	83	79	75	61	52	46
M.	80.9	82.2	83.1	84.1	85.8	85.5	82.0	76.9	68.9	61.1	53.2	48.8

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.	Stunden- Sonnen- schein
1	73	71	61	68	74	78	76	81	84	85	85	81	82	98	61	7.2
2	78	84	94	95	95	95	96	97	98	94	91	84	81	98	53	0.0
3	61	49	40	41	35	45	50	53	57	60	56	57	69	94	35	8.3
4	46	47	45	44	45	49	56	59	64	57	59	52	62	85	44	8.5
5	49	50	50	49	48	51	53	55	53	57	59	61	54	63	48	6.3
6	82	84	87	88	90	88	91	89	91	95	96	95	86	96	66	0.0
7	78	76	75	77	80	84	87	88	88	88	90	91	88	96	75	0.0
8	38	42	42	42	44	47	47	50	52	49	56	74	65	94	38	8.3
9	57	62	68	72	78	83	87	89	91	93	94	95	79	95	57	0.0
10	72	74	75	77	83	87	89	90	90	90	89	89	88	97	72	0.0
11	78	79	78	78	79	82	83	84	86	88	90	92	85	92	77	0.0
12	28	28	28	29	32	35	60	70	77	77	81	81	67	96	28	7.2
13	47	45	40	37	40	46	63	72	80	83	86	88	69	89	37	8.5
14	48	45	41	43	46	51	65	71	75	79	81	83	72	96	41	8.1
15	46	40	41	39	52	60	63	69	75	76	79	82	71	89	39	5.1
16	39	39	44	40	38	47	56	60	66	71	72	77	66	90	39	4.5
17	80	73	73	72	75	78	83	86	90	93	94	95	88	97	72	0.6
18	93	94	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95	96	93	0.0
19	70	61	56	53	51	70	77	84	79	82	88	91	83	96	51	6.5
20	49	50	51	60	69	81	87	90	91	91	92	93	81	96	49	5.9
21	87	87	88	89	91	92	92	92	92	92	92	91	91	94	87	0.0
22	58	52	48	50	55	63	71	73	76	79	80	81	74	91	48	5.1
23	52	44	35	36	44	56	61	70	75	78	80	82	70	93	35	8.5
24	84	84	83	81	83	89	91	94	95	94	94	95	90	96	81	0.0
25	82	79	80	86	89	91	93	93	93	94	94	94	90	95	79	0.0
26	31	30	29	30	33	36	38	44	55	58	58	63	59	95	29	7.9
27	36	35	34	37	38	42	48	51	52	56	60	66	57	83	34	5.3
28	39	37	42	46	51	54	57	63	72	74	74	76	65	82	37	6.6
29	40	40	41	41	41	49	53	53	50	53	65	69	58	83	40	4.0
30	94	94	80	80	83	84	86	88	89	90	88	90	88	96	75	0.0
31	35	33	33	32	34	35	38	40	41	43	43	44	59	92	32	8.3
M.	59.7	58.3	57.3	58.3	61.1	65.9	70.7	74.0	76.5	77.9	79.4	80.9	75.2	92.0	53.3	4.2

April.

1	42	46	51	59	70	78	78	82	81	83	85	85	66	85	42	1.6
2	36	36	50	56	62	68	82	86	87	90	92	92	75	96	36	6.1
3	48	47	54	55	54	59	68	70	73	76	77	79	73	93	47	0.3
4	44	41	53	52	56	62	68	70	70	74	77	81	70	92	41	0.0
5	57	58	49	53	58	64	66	65	70	79	74	81	72	88	49	0.0
6	43	39	36	37	42	49	57	60	68	76	82	85	65	90	36	8.7
7	28	27	25	24	27	37	43	47	62	64	72	78	58	94	24	9.3
8	26	22	25	28	36	42	55	58	63	64	77	84	59	90	22	9.5
9	32	24	23	24	27	30	41	53	60	62	64	71	58	92	23	9.4
10	65	61	71	71	71	76	82	87	90	91	92	91	80	92	61	1.3
11	49	45	44	44	43	46	46	46	52	62	71	78	70	95	43	9.1
12	40	33	35	38	40	45	49	52	54	58	61	64	60	81	33	1.5
13	57	60	70	80	83	85	90	92	92	90	94	95	72	95	38	0.0
14	43	40	36	39	48	57	64	70	78	78	82	86	72	95	36	8.0
15	25	27	27	29	31	33	36	38	40	40	41	42	52	93	25	7.5
16	43	41	42	42	44	47	49	51	53	55	54	55	47	55	41	5.4
17	53	49	49	47	49	51	52	53	52	53	53	54	59	79	47	0.0
18	37	36	36	38	39	45	46	49	54	65	71	74	51	74	36	5.8
19	40	36	39	50	56	61	66	67	71	78	81	86	67	86	36	8.4
20	47	44	44	49	53	56	59	64	76	89	92	94	72	96	44	8.4
21	41	43	45	50	57	61	64	66	72	81	82	84	70	95	41	5.2
22	73	66	64	67	70	74	77	78	81	82	83	88	80	94	64	0.0
23	66	65	63	67	70	73	80	87	86	86	87	88	81	93	63	0.5
24	53	47	49	46	51	60	73	77	78	80	82	82	72	89	46	5.7
25	56	51	48	46	48	58	67	79	86	88	89	88	72	89	46	5.5
26	33	33	31	31	33	35	39	41	58	74	77	81	63	97	31	11.1
27	36	34	34	35	37	38	42	67	75	83	86	88	61	88	34	9.4
28	33	34	32	35	39	56	49	68	75	82	85	88	64	91	32	9.0
29	47	45	54	60	67	70	75	72	74	73	93	89	74	95	45	3.6
30	41	41	35	35	35	45	48	58	68	67	63	67	65	95	35	7.1
M.	44.3	42.4	43.8	46.2	49.9	55.4	60.4	65.1	70.0	74.1	77.3	79.9	66.7	89.6	39.9	5.3

Mai.

Relative Feuchtigkeit.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	74	81	81	84	85	89	83	80	67	59	50	43
2	62	69	74	76	81	79	79	65	64	58	41	35
3	65	68	68	75	78	74	73	60	48	45	41	41
4	80	73	76	78	90	90	92	85	77	72	82	69
5	89	90	93	94	88	87	78	67	58	54	44	40
6	82	84	83	83	85	80	78	78	65	61	52	48
7	90	90	92	87	75	80	78	78	77	73	61	57
8	87	87	88	88	88	86	80	73	62	56	54	48
9	88	88	91	91	91	89	81	68	55	50	44	45
10	81	86	83	90	89	86	74	68	64	59	59	57
11	93	92	92	92	91	88	81	74	66	61	37	32
12	45	45	47	49	51	77	79	76	72	65	61	63
13	97	97	97	97	97	97	97	96	96	95	92	78
14	81	82	83	84	86	86	85	83	78	67	58	44
15	82	83	85	85	84	82	74	72	60	54	44	44
16	80	83	82	87	89	82	79	70	59	52	48	45
17	92	91	91	88	87	82	78	68	63	56	51	51
18	86	88	89	85	85	82	83	76	67	61	43	36
19	54	54	62	65	63	58	55	54	53	52	51	48
20	53	63	58	57	60	71	72	68	61	62	59	60
21	61	60	68	76	81	80	77	73	70	66	58	40
22	88	88	84	83	84	92	91	82	69	61	54	41
23	51	51	52	54	66	64	66	61	48	47	45	12
24	76	80	79	82	85	83	74	68	60	45	44	43
25	94	92	93	91	86	80	78	69	64	56	48	47
26	79	81	83	82	96	92	83	73	64	73	81	59
27	94	94	94	94	94	89	86	82	75	66	52	57
28	88	89	89	89	89	86	76	70	65	68	68	64
29	90	88	92	92	93	93	90	85	83	84	75	70
30	91	90	90	91	92	92	91	86	83	79	74	73
31	86	90	91	92	92	88	84	74	66	61	55	51
M.	79.3	80.5	81.6	82.6	83.9	83.5	80.0	73.9	66.6	62.1	55.8	50.7

Juni.

1	97	98	97	93	87	86	85	78	70	61	57	55
2	94	94	95	94	92	90	81	77	69	63	67	65
3	88	95	100	98	96	92	89	89	87	86	98	78
4	91	96	97	98	96	91	82	71	63	53	49	42
5	86	88	93	89	91	90	77	68	59	49	43	40
6	83	88	78	79	87	88	86	86	75	67	60	53
7	93	95	94	95	94	85	80	75	75	71	69	62
8	93	93	94	92	90	88	82	78	70	62	56	49
9	94	94	94	94	94	93	90	75	69	57	51	47
10	90	91	92	90	87	84	73	68	64	59	57	52
11	90	91	91	92	90	89	84	82	72	64	55	49
12	91	90	90	91	90	87	75	74	64	64	78	75
13	90	91	93	93	93	93	85	67	57	52	41	36
14	87	84	85	88	83	79	68	64	61	57	58	51
15	92	92	91	92	90	86	83	80	76	83	89	90
16	94	91	91	90	88	89	89	89	81	80	70	62
17	94	94	93	93	91	84	73	67	61	54	54	52
18	94	95	95	95	93	88	74	62	50	48	38	33
19	91	91	94	94	88	82	73	68	57	50	41	43
20	86	89	90	92	92	87	84	80	73	67	58	36
21	94	91	90	94	97	92	85	71	58	51	47	39
22	89	90	89	92	88	85	79	63	54	55	47	43
23	90	94	92	92	91	87	85	75	65	64	58	60
24	92	90	89	91	90	82	73	68	67	53	51	47
25	90	90	91	93	91	85	81	75	67	60	57	47
26	89	89	88	90	89	87	80	70	64	67	67	68
27	95	95	93	91	91	91	86	79	77	66	58	52
28	81	98	90	90	89	88	81	76	69	59	49	51
29	80	87	90	90	90	89	81	72	68	63	52	51
30	95	89	89	89	90	86	86	76	67	62	53	47
M.	90.4	91.8	91.6	91.8	90.6	87.3	81.0	74.1	66.9	61.6	57.6	52.5

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.	Stunden- Sonnen- schein
1	39	35	31	29	30	29	32	36	47	59	51	56	56	89	29	11.9
2	31	29	28	30	32	34	37	40	42	45	48	55	51	79	28	12.1
3	40	40	38	43	41	49	68	64	60	61	95	94	59	95	38	1.6
4	78	63	57	66	66	73	85	81	87	86	86	88	78	92	57	0.5
5	35	34	36	41	45	50	59	64	67	67	77	79	64	94	34	5.9
6	48	57	62	67	69	75	88	90	92	92	91	91	75	92	48	0.5
7	57	58	62	62	59	68	72	72	79	83	87	88	74	92	57	0.3
8	45	43	49	59	61	64	70	75	82	82	85	86	71	88	43	1.1
9	38	37	39	39	45	50	61	68	70	74	77	77	65	91	37	6.1
10	60	59	61	59	68	73	80	87	89	90	91	90	75	91	57	2.6
11	31	31	33	35	39	40	42	45	46	46	45	45	57	93	31	3.3
12	69	74	78	82	89	94	93	96	95	96	97	97	75	97	45	1.9
13	69	58	44	45	47	51	65	74	76	78	78	80	79	97	44	6.2
14	37	34	28	26	28	31	38	42	47	65	69	73	60	86	26	12.2
15	33	29	26	26	29	31	36	38	44	54	67	76	56	85	25	9.1
16	35	38	46	47	52	57	63	89	93	93	94	91	69	94	35	10.6
17	48	44	41	32	50	56	56	61	63	69	78	81	67	92	32	6.8
18	33	32	33	34	35	38	40	43	43	59	52	51	57	89	32	10.3
19	47	41	42	43	44	45	48	50	53	55	57	54	52	65	41	2.4
20	56	50	49	41	36	38	42	45	44	47	59	57	54	72	36	8.4
21	39	38	39	38	33	50	66	74	78	83	82	78	63	83	33	12.0
22	34	31	29	30	33	36	39	45	49	50	51	51	58	92	29	10.2
23	41	40	40	43	48	52	53	55	53	58	62	70	53	70	40	8.7
24	40	45	52	49	59	60	67	92	95	94	93	94	69	95	40	6.7
25	44	47	46	51	55	66	78	85	75	71	76	84	70	94	41	3.3
26	49	41	40	80	87	90	93	95	94	94	94	94	79	96	40	3.5
27	53	60	69	62	70	71	73	79	84	85	89	90	78	94	53	3.1
28	54	54	61	58	66	73	85	85	86	88	90	91	76	91	51	0.0
29	75	71	77	79	78	79	81	84	87	88	90	90	84	93	70	0.0
30	69	60	56	49	57	63	70	79	82	84	80	81	78	92	49	0.0
31	50	60	59	57	58	66	78	82	88	94	91	94	75	94	50	1.3
M.	47.6	46.2	46.5	48.5	51.9	56.5	63.2	68.2	70.7	73.9	76.8	78.3	67.0	89.2	41.1	5.3

Juni.

1	56	53	50	54	60	63	70	78	86	87	89	90	75	98	50	5.4
2	59	62	59	60	64	65	71	79	82	84	85	86	76	95	59	0.9
3	68	59	56	53	51	57	65	77	85	86	86	91	80	100	51	1.9
4	38	35	31	30	28	24	48	50	58	71	73	74	63	98	24	12.6
5	33	24	26	22	27	31	47	59	70	80	81	78	60	91	22	11.9
6	51	50	46	50	59	59	83	89	93	88	89	91	74	93	46	5.9
7	57	52	46	43	62	76	94	91	91	92	91	93	78	95	43	2.0
8	39	42	41	45	50	55	68	78	80	70	96	70	96	99	39	8.2
9	44	39	54	54	67	69	77	83	90	89	90	86	75	94	39	6.3
10	59	55	50	66	71	90	93	92	92	90	91	77	93	93	50	0.8
11	43	68	74	81	78	76	85	84	89	91	90	89	80	92	43	2.5
12	65	59	54	47	52	73	72	79	85	87	89	89	76	91	47	4.3
13	34	34	34	39	44	49	59	69	79	81	85	86	66	93	34	11.6
14	53	52	71	81	92	93	93	94	94	94	93	94	78	94	51	1.7
15	82	78	73	71	77	84	86	89	90	92	93	93	85	93	71	0.0
16	72	71	74	79	86	88	92	92	91	91	93	93	85	94	62	0.0
17	46	46	52	58	57	65	75	80	86	89	88	90	73	94	46	0.0
18	35	35	35	36	38	47	57	76	82	83	84	90	65	95	33	10.1
19	41	29	27	28	32	49	52	62	70	76	81	83	63	94	27	4.5
20	42	50	60	63	67	76	79	77	82	85	89	92	75	92	36	4.3
21	36	29	31	36	43	48	55	72	78	81	85	83	66	97	29	11.8
22	34	47	50	62	68	70	76	80	83	86	85	88	71	90	34	8.3
23	62	64	63	61	63	86	88	94	93	92	94	93	79	94	58	2.9
24	45	46	45	44	41	52	60	71	82	85	87	88	68	92	41	9.4
25	40	39	44	41	49	60	62	72	76	83	83	85	69	93	39	8.9
26	50	44	37	60	72	81	98	97	96	96	96	95	78	98	37	4.1
27	55	58	55	64	81	65	80	85	87	88	74	76	77	95	52	3.5
28	64	50	53	70	69	76	77	96	95	95	87	86	77	98	49	3.4
29	45	40	43	49	62	77	97	96	95	95	95	95	75	95	40	9.9
30	45	36	39	38	43	51	66	69	58	81	85	89	68	95	36	6.9
M.	49.8	48.2	49.2	52.8	58.1	65.2	74.2	80.3	84.2	86.7	86.7	88.4	73.4	94.1	42.9	5.5

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	89	92	93	93	95	90	80	73	64	52	50	38
2	85	87	86	93	83	82	75	69	62	59	51	43
3	88	90	92	89	86	83	78	70	65	58	53	53
4	91	93	93	92	91	88	83	70	57	60	53	46
5	91	87	88	92	89	88	87	82	76	73	66	49
6	85	88	91	89	88	86	76	72	65	58	48	63
7	90	91	93	95	90	87	79	71	66	62	57	51
8	86	87	89	90	89	88	82	84	78	77	80	81
9	97	95	97	95	94	92	87	84	79	74	72	69
10	88	90	90	92	95	88	84	82	68	58	52	50
11	90	92	93	92	90	86	82	68	67	59	51	35
12	86	89	90	92	90	87	82	79	75	69	63	61
13	94	91	93	95	93	93	89	75	68	60	59	58
14	97	97	95	91	92	89	86	83	78	69	63	56
15	87	91	91	93	90	85	75	68	60	53	44	38
16	90	94	95	98	95	90	83	61	63	55	50	45
17	92	93	94	96	98	90	85	70	61	52	49	33
18	84	87	86	85	93	88	85	72	65	62	55	50
19	92	98	96	95	91	89	84	71	62	57	49	48
20	91	92	94	92	91	88	84	79	85	72	73	64
21	89	90	97	94	94	88	82	72	64	60	57	55
22	92	90	91	93	90	85	79	75	69	63	56	50
23	93	95	97	94	91	88	78	68	61	56	47	43
24	90	90	88	84	81	83	80	79	70	67	59	57
25	89	88	86	89	91	85	83	72	65	61	55	49
26	87	88	92	93	90	85	80	73	64	56	50	45
27	91	92	93	95	94	90	83	72	64	58	57	46
28	94	94	95	96	94	89	83	78	70	62	56	48
29	95	92	90	89	89	85	81	75	68	61	56	52
30	88	91	91	92	93	89	84	78	69	64	61	58
31	89	90	89	89	89	87	81	72	68	63	58	53
M.	90.0	91.2	91.9	92.1	91.1	87.5	81.9	74.4	67.6	61.7	56.5	51.5

August.

1	85	88	85	85	89	90	86	78	73	65	59	57
2	94	95	96	98	99	94	89	82	73	61	58	52
3	90	94	94	95	96	97	88	80	71	63	55	52
4	96	92	95	93	96	90	86	79	70	59	61	67
5	98	97	98	99	97	83	87	84	78	70	65	59
6	93	94	95	97	98	98	92	83	73	62	56	55
7	91	96	95	96	97	97	92	80	69	65	56	52
8	52	60	73	77	84	85	83	72	60	56	53	49
9	68	71	80	88	100	96	95	95	95	95	95	95
10	92	92	93	93	93	89	80	74	65	56	57	53
11	88	89	88	89	89	87	82	75	65	59	42	45
12	79	80	88	83	88	88	83	76	65	57	56	56
13	94	96	97	96	97	95	90	84	71	65	56	53
14	94	95	95	96	95	94	90	84	71	64	60	58
15	95	94	95	97	96	95	88	78	71	62	60	57
16	86	92	90	94	93	90	83	75	64	60	57	53
17	88	89	97	93	98	91	80	73	67	60	52	53
18	97	98	97	97	96	90	86	75	69	62	56	48
19	95	97	98	99	100	95	86	77	64	61	57	51
20	93	88	91	94	97	89	79	71	63	59	53	44
21	87	90	90	91	93	89	85	75	66	57	52	49
22	89	91	95	93	96	95	90	80	67	57	52	49
23	91	91	95	96	97	94	88	78	69	59	56	50
24	96	96	95	95	95	94	94	93	88	81	77	76
25	97	97	96	96	95	95	94	94	93	93	91	83
26	91	94	94	94	93	91	85	82	73	67	59	56
27	96	97	97	97	98	98	95	82	73	68	63	52
28	95	96	99	98	98	96	92	83	69	68	65	63
29	94	95	94	95	96	97	90	87	77	67	58	53
30	91	90	95	93	92	93	90	81	74	63	55	52
31	92	93	94	97	96	97	89	85	77	68	62	55
M.	90.0	91.2	93.0	93.7	95.1	93.0	87.6	80.5	71.7	64.8	59.8	56.4

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittl.	Max.	Min.	Stunden- Sonnen- schein
1	33	32	31	31	33	50	55	63	74	79	85	84	65	95	31	7.4
2	40	41	49	58	74	71	97	95	91	89	92	90	73	97	40	4.6
3	44	38	63	48	73	74	72	89	86	89	92	92	74	92	38	3.6
4	39	58	63	60	89	89	89	90	93	90	91	91	78	93	39	4.0
5	57	54	49	49	56	57	66	70	76	83	86	84	74	92	49	0.6
6	46	49	54	59	67	77	77	82	85	86	87	89	74	91	46	0.8
7	38	41	41	48	50	56	63	71	77	79	81	82	69	95	38	4.3
8	89	89	90	90	88	96	95	96	98	93	97	96	89	97	77	0.3
9	71	64	55	61	62	63	66	72	81	83	84	87	79	97	55	1.2
10	44	41	39	41	52	52	55	63	73	75	78	85	68	95	39	7.9
11	41	52	49	51	50	51	63	72	75	81	87	84	69	93	35	5.0
12	57	52	62	61	63	77	83	86	94	93	94	94	78	95	52	0.0
13	51	59	57	58	59	64	72	74	80	82	86	98	76	98	51	5.0
14	50	44	56	52	55	58	68	75	77	81	83	84	74	97	44	0.7
15	43	40	36	40	48	53	60	72	80	86	88	87	67	93	35	12.1
16	30	37	39	40	46	50	60	70	82	87	86	86	63	98	30	12.5
17	35	38	35	30	35	37	35	50	67	74	75	75	83	98	30	11.6
18	42	45	50	52	56	61	78	83	87	89	88	90	72	93	42	12.3
19	31	23	24	23	46	65	100	47	60	80	87	90	67	100	23	10.2
20	46	54	52	71	74	83	88	91	91	83	89	88	80	94	46	1.2
21	50	49	51	52	51	60	70	77	82	85	88	90	73	97	49	9.1
22	48	36	41	46	50	53	70	77	83	84	87	91	71	93	36	10.4
23	38	44	48	100	96	83	87	87	90	92	96	91	78	100	38	7.4
24	53	49	44	49	51	54	61	65	70	82	85	86	70	90	44	8.1
25	44	41	45	49	54	56	67	74	81	83	87	87	70	91	41	9.5
26	42	45	51	57	60	66	71	73	81	84	85	86	71	93	42	10.1
27	38	48	72	70	61	72	75	86	87	89	92	97	76	97	33	7.7
28	46	88	92	84	89	87	90	93	93	95	94	95	84	96	46	5.2
29	37	41	54	75	90	94	92	90	91	84	92	90	78	95	37	5.4
30	57	51	48	58	64	65	69	72	75	80	82	87	74	93	48	5.6
31	55	48	53	56	58	63	71	77	82	83	85	85	73	90	48	7.0
M.	46.3	47.8	51.4	55.6	61.4	6.7	73.1	76.8	82.0	85.1	87.4	88.4	73.3	94.8	42.2	6.2

August.

1	55	45	49	50	52	58	69	73	85	88	90	94	73	94	45	11.3
2	45	39	46	47	49	55	62	73	82	87	89	86	73	99	39	12.0
3	48	45	44	49	53	57	73	69	83	85	85	92	73	97	44	9.5
4	66	64	58	55	60	76	84	96	98	95	98	99	81	99	55	6.8
5	53	44	46	48	52	58	64	76	85	83	85	87	75	99	44	9.5
6	50	47	38	41	46	49	54	71	81	87	89	89	72	98	38	11.9
7	50	46	43	43	46	48	45	39	41	43	48	50	64	97	39	11.5
8	40	39	40	41	44	46	47	45	45	45	46	58	56	85	39	9.2
9	95	95	63	63	77	82	87	88	91	91	91	92	87	100	63	1.3
10	42	52	47	46	53	71	80	81	85	87	90	90	73	93	42	7.2
11	41	39	41	41	46	51	58	75	76	76	78	80	67	89	39	10.3
12	50	49	50	52	55	59	79	84	88	89	88	98	73	98	49	11.9
13	51	49	43	51	52	53	62	68	85	87	82	87	74	97	43	11.5
14	51	45	39	37	49	51	69	81	89	89	90	92	74	96	37	10.3
15	48	43	43	45	48	56	55	55	66	71	77	81	70	97	43	10.4
16	45	39	36	41	42	51	63	70	76	81	86	92	69	94	36	11.6
17	47	42	48	58	56	70	75	82	81	83	86	92	73	98	42	11.2
18	72	83	62	63	64	71	85	77	89	87	93	95	80	98	48	9.0
19	47	45	36	78	56	85	99	95	88	82	91	87	78	100	36	11.0
20	38	36	37	44	49	53	70	79	76	83	89	90	69	97	36	11.0
21	43	47	44	48	52	52	67	78	81	82	87	91	71	93	43	10.4
22	43	40	44	50	52	70	72	82	68	85	87	90	72	96	40	11.1
23	46	37	48	51	61	63	57	80	97	97	96	96	75	97	37	7.7
24	68	65	61	68	74	78	88	92	94	95	95	96	86	96	61	0.0
25	80	75	79	78	82	87	94	95	95	95	94	94	91	97	75	0.0
26	54	55	58	61	67	80	87	90	93	93	93	95	79	95	54	4.1
27	55	52	46	51	57	69	79	81	91	93	92	93	78	98	46	5.7
28	56	55	51	58	97	97	97	97	97	94	93	94	84	99	51	5.6
29	48	43	48	50	51	57	70	78	81	83	86	90	75	97	48	6.9
30	46	48	46	48	50	62	74	80	85	89	89	91	74	95	46	4.4
31	52	51	44	49	55	63	78	83	94	88	82	89	76	97	44	10.4
M.	52.4	50.1	47.7	51.8	56.4	63.8	72.4	77.8	82.8	84.3	86.0	88.7	74.6	96.3	45.1	8.5

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	95	96	94	94	93	87	80	85	76	68	63	61
2	87	86	88	90	87	87	84	80	71	68	62	59
3	97	97	98	99	99	100	91	91	79	70	62	60
4	83	87	88	88	94	96	88	81	70	61	52	49
5	94	90	93	100	96	91	88	85	79	72	66	62
6	95	99	97	93	92	91	83	80	76	68	62	58
7	93	88	96	99	97	96	92	84	72	63	60	57
8	95	97	90	93	95	93	85	76	70	60	56	49
9	92	93	95	96	97	95	87	75	67	60	47	46
10	93	94	96	95	94	91	86	76	67	53	52	47
11	86	85	92	93	94	89	83	74	65	57	53	51
12	61	80	82	85	87	87	83	79	70	63	62	59
13	93	94	95	96	96	95	92	86	83	73	68	65
14	90	93	92	94	95	95	91	89	88	78	72	61
15	93	94	95	95	94	92	85	81	74	71	62	58
16	94	96	95	96	94	95	93	87	81	69	62	59
17	93	94	95	97	97	96	93	89	78	70	63	59
18	93	95	94	95	96	97	93	87	77	68	59	55
19	91	93	94	95	96	95	88	82	78	75	72	65
20	87	86	87	88	88	88	82	77	67	62	57	53
21	98	96	98	98	97	97	93	84	76	68	60	57
22	90	95	94	95	98	95	87	79	62	56	47	45
23	95	97	99	97	99	97	95	84	72	64	54	59
24	88	83	77	79	78	77	72	68	62	61	59	57
25	82	91	91	90	91	96	87	76	70	66	58	54
26	97	100	98	97	97	95	95	91	82	75	66	61
27	94	96	97	98	100	99	97	93	78	66	59	52
28	88	87	88	89	88	87	89	92	91	88	88	89
29	96	96	95	95	94	94	92	90	86	82	78	75
30	90	91	89	89	90	91	89	88	79	67	63	59
M.	90.8	92.3	92.8	93.6	93.8	92.8	88.1	82.9	74.9	67.4	61.5	58.0

October.

1	90	90	90	89	90	90	88	83	78	71	65	58
2	89	89	89	89	88	92	86	82	75	65	61	60
3	88	87	88	87	86	85	82	80	75	72	67	66
4	93	94	96	97	95	97	94	86	76	66	61	59
5	91	92	93	93	95	97	95	86	73	63	61	58
6	89	84	89	90	92	92	89	88	79	71	62	57
7	84	85	87	85	83	84	89	85	79	75	72	76
8	87	88	88	88	87	87	86	83	77	75	68	59
9	90	92	91	92	91	93	91	90	79	79	77	73
10	96	95	94	93	95	96	95	90	85	79	76	66
11	94	97	96	98	95	94	91	86	81	72	71	66
12	86	89	93	91	87	83	82	88	94	100	93	91
13	96	91	95	95	95	95	94	93	88	84	79	73
14	86	87	84	84	89	86	84	73	65	67	66	65
15	79	82	83	78	80	73	81	80	78	79	78	72
16	88	87	88	91	90	91	90	87	79	70	65	61
17	95	96	97	97	98	97	98	99	96	91	79	67
18	94	94	94	93	93	92	94	94	87	81	76	71
19	90	88	91	92	93	94	94	89	86	80	75	71
20	94	93	97	97	96	96	95	92	85	81	77	64
21	90	90	89	90	89	90	92	88	81	73	65	60
22	95	95	95	95	95	95	95	94	94	94	93	93
23	84	80	86	88	85	83	82	80	76	71	70	68
24	95	96	96	96	97	96	96	94	93	89	77	67
25	94	94	94	94	95	95	95	94	91	85	77	71
26	89	90	87	89	90	91	90	86	85	84	73	67
27	95	95	95	96	97	97	97	97	95	88	82	77
28	96	96	96	97	97	97	96	96	94	85	76	65
29	88	89	90	92	95	96	97	97	95	84	71	64
30	89	86	84	80	80	88	79	72	69	56	45	43
31	81	86	88	88	86	86	85	82	76	70	65	59
N.	90.2	90.3	91.1	91.1	91.1	91.1	90.4	87.5	82.7	77.4	71.7	66.7

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.	Stunden-Sonnen-schein
1	59	58	56	58	61	66	71	75	81	81	85	88	76	96	56	8.1
2	58	53	54	54	59	66	82	87	92	87	90	96	76	96	53	6.9
3	54	43	47	49	53	56	66	77	75	79	82	84	75	100	43	8.0
4	53	54	54	50	59	66	76	79	84	85	88	93	74	96	49	8.1
5	54	52	51	58	63	72	85	91	92	95	96	92	80	100	51	9.1
6	57	48	39	47	55	70	83	88	73	76	82	91	75	99	39	8.9
7	53	48	46	47	50	57	75	81	78	85	88	95	75	99	46	10.5
8	48	40	38	46	49	60	73	79	73	77	85	91	72	97	38	10.5
9	41	39	43	44	49	62	77	81	87	87	92	92	73	97	39	10.2
10	41	43	41	39	51	68	73	79	83	76	84	89	71	96	39	9.4
11	39	38	43	41	42	51	65	81	90	91	89	71	69	94	38	9.1
12	49	40	44	43	97	96	83	87	88	92	91	95	75	95	40	7.3
13	64	58	60	56	58	71	77	84	89	91	90	89	80	96	56	1.4
14	56	52	49	58	62	70	78	82	90	91	91	90	79	95	49	6.3
15	57	55	52	53	55	70	82	87	85	82	84	90	77	95	52	8.6
16	57	54	43	47	53	61	81	77	78	79	83	92	76	96	43	9.4
17	49	51	48	47	52	60	82	78	83	91	91	92	77	97	47	9.4
18	48	42	47	49	50	67	83	77	86	80	76	83	75	97	42	9.6
19	67	65	70	71	74	77	82	83	83	83	84	84	81	96	65	0.9
20	48	50	53	54	62	73	77	87	85	88	90	89	74	90	48	8.4
21	53	41	38	51	58	74	81	83	84	81	91	92	77	97	33	9.2
22	43	38	42	50	73	77	84	79	85	83	89	92	74	98	38	8.7
23	58	58	60	62	70	76	82	80	87	88	87	88	79	99	54	8.5
24	48	48	54	57	63	68	72	73	73	77	79	87	69	88	48	3.5
25	47	48	51	53	59	66	79	82	85	87	88	91	75	91	47	8.6
26	56	50	48	51	56	63	78	86	87	88	94	93	79	100	48	8.6
27	48	45	50	48	57	63	83	86	91	87	89	90	78	100	45	5.9
28	90	91	92	97	97	94	94	95	97	97	96	96	92	97	87	0.0
29	76	76	79	82	84	89	90	92	90	90	91	91	88	96	75	0.0
30	52	59	61	58	69	72	80	84	88	89	91	90	78	91	52	4.3
M.	54.1	51.2	51.6	54.0	61.3	69.4	79.3	82.7	84.7	85.4	87.9	89.9	76.7	96.1	48.7	7.3

October.

1	59	58	63	65	69	73	78	92	91	92	93	94	79	94	58	2.6
2	56	56	58	60	67	76	82	84	88	91	95	89	78	95	56	8.2
3	59	44	43	42	42	75	85	90	89	93	88	89	75	93	42	8.6
4	55	39	48	50	67	78	86	88	87	87	88	89	78	97	39	8.9
5	55	53	56	64	78	85	88	92	93	92	87	90	80	97	53	9.1
6	55	50	53	62	79	85	88	91	93	94	93	89	80	94	50	8.1
7	74	74	75	78	83	83	84	85	86	86	87	82	87	91	74	0.0
8	57	56	53	59	66	83	87	88	87	89	93	93	78	93	53	5.4
9	79	72	79	79	85	86	90	100	97	96	97	97	87	100	72	2.1
10	61	57	63	65	73	80	84	87	94	95	95	95	84	96	57	4.6
11	64	61	57	69	80	85	89	87	83	72	79	79	81	97	57	0.0
12	87	89	89	90	92	93	94	94	95	95	95	95	91	100	82	0.1
13	72	67	72	69	83	88	94	93	91	90	87	86	86	96	67	2.5
14	66	60	64	47	69	70	75	78	77	78	80	81	74	89	47	6.7
15	74	68	63	68	73	78	73	78	79	82	87	81	77	87	63	2.0
16	58	54	57	63	68	81	83	90	90	94	95	95	80	95	54	7.2
17	52	57	64	70	72	77	78	99	97	96	95	95	86	99	52	0.2
18	50	42	48	65	76	57	69	63	59	77	86	81	76	94	42	3.2
19	69	72	77	87	91	94	94	95	95	95	94	94	87	9	69	0.0
20	69	69	65	81	83	81	83	85	87	91	94	95	85	97	64	0.9
21	57	55	61	63	81	84	98	91	97	96	95	95	82	98	55	0.3
22	74	71	70	76	87	91	92	93	91	90	89	90	89	95	70	4.9
23	66	63	65	70	79	85	90	92	93	94	94	95	81	95	63	6.9
24	58	53	62	64	75	80	87	89	90	90	91	93	84	97	52	7.3
25	61	53	58	63	79	85	88	89	88	88	89	89	84	95	53	3.9
26	62	64	66	70	82	87	90	92	94	95	95	95	84	95	62	2.9
27	67	60	67	74	84	88	90	93	95	95	95	96	88	97	60	5.8
28	57	58	60	66	77	83	87	89	90	91	92	91	85	97	57	8.5
29	58	54	55	60	75	84	88	89	92	94	92	91	83	97	54	8.2
30	41	41	42	43	45	47	50	53	68	76	77	79	64	89	41	5.3
31	43	44	45	47	50	55	62	67	68	83	85	86	70	88	43	7.8
M.	61.8	58.5	60.9	65.5	74.5	79.9	84.2	86.6	87.9	89.8	90.4	90.2	81.3	94.8	56.8	4.6

November.

Relative Feuchtigkeit.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	87	87	89	90	90	92	91	91	87	82	78	72
2	84	92	88	87	90	91	91	88	79	74	67	65
3	96	97	98	98	99	99	99	98	90	80	65	59
4	96	97	97	97	97	97	96	92	82	71	62	59
5	95	96	97	97	98	98	97	90	79	74	66	60
6	92	93	94	96	97	97	97	94	93	88	87	86
7	87	89	90	90	90	91	93	91	88	77	72	71
8	96	97	97	98	98	98	97	97	95	84	75	67
9	93	94	94	94	93	95	96	96	90	81	73	61
10	97	97	97	97	98	97	96	95	89	75	77	54
11	96	97	98	99	97	95	91	93	90	77	74	68
12	97	97	98	99	98	97	95	95	85	77	72	65
13	83	85	83	82	81	83	84	85	77	72	64	56
14	98	99	99	98	100	99	98	97	95	89	76	65
15	99	99	98	98	98	98	98	98	97	96	87	76
16	97	97	97	97	97	96	96	93	89	86	79	78
17	94	94	95	95	95	95	95	94	88	86	86	77
18	92	92	91	92	93	93	96	97	88	86	78	73
19	97	98	99	99	98	98	99	99	97	92	82	77
20	63	72	73	69	68	71	75	77	73	63	60	54
21	92	92	92	93	94	95	96	92	88	83	74	67
22	96	95	95	96	95	94	93	93	90	82	75	71
23	94	94	95	96	96	93	93	92	91	91	86	84
24	92	90	92	96	98	100	100	99	97	85	80	68
25	51	50	49	48	50	52	51	50	46	44	45	43
26	91	89	91	98	80	60	88	86	88	80	86	87
27	58	66	72	51	88	85	77	87	63	61	57	67
28	89	91	93	94	95	95	96	96	94	94	90	78
29	49	48	48	48	50	50	51	51	50	51	52	49
30	91	91	94	93	91	92	93	95	95	96	96	96
M.	88.1	89.2	89.7	90.5	90.4	89.9	90.7	90.0	85.1	79.2	73.7	68.1

December.

1	95	95	95	96	96	96	95	90	83	73	74	76
2	93	93	94	93	92	92	92	91	92	88	84	75
3	94	93	93	94	93	91	91	90	89	85	78	78
4	96	97	97	96	96	95	95	95	95	95	93	89
5	97	97	97	97	97	97	96	95	95	94	93	92
6	96	96	96	96	96	96	95	95	95	95	92	91
7	93	93	94	94	95	95	95	95	95	94	92	85
8	63	63	64	58	71	78	83	88	91	92	84	77
9	91	89	89	89	90	92	90	89	88	80	78	73
10	76	78	81	84	87	89	93	94	91	92	88	85
11	96	96	96	96	96	98	98	98	98	98	96	88
12	94	95	95	94	92	91	92	92	92	90	86	81
13	90	92	92	93	92	91	92	92	86	87	83	82
14	91	91	92	92	92	91	90	91	90	89	82	80
15	97	96	96	96	95	95	89	87	87	89	88	47
16	66	58	73	62	94	97	97	97	92	93	88	83
17	95	96	96	96	96	96	96	97	97	97	96	95
18	96	96	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97
19	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96
20	93	93	93	93	96	96	96	97	97	97	96	96
21	90	91	91	89	87	87	88	90	90	85	81	78
22	87	87	88	88	87	86	84	85	85	84	82	79
23	84	83	83	83	82	82	82	80	80	78	72	69
24	88	88	87	88	88	88	86	87	87	86	86	85
25	88	88	87	88	88	88	87	88	87	88	87	86
26	88	88	88	88	88	89	87	88	89	88	84	79
27	89	89	89	90	89	89	90	89	89	88	86	78
28	64	62	60	60	57	58	53	53	53	50	47	46
29	85	90	92	93	94	93	93	93	93	92	89	98
30	83	80	79	75	74	69	74	70	70	62	63	62
31	74	78	81	80	81	83	83	82	82	79	74	83
M.	88.0	88.0	88.7	88.2	89.5	89.7	89.5	89.4	88.8	87.1	84.4	80.9

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.	Stunden-Sonnen-schein
1	68	48	71	82	88	92	97	84	93	90	85	84	81	97	48	0-0
2	58	64	66	73	85	88	93	94	95	95	95	96	83	96	58	1-5
3	56	47	54	57	59	80	85	88	90	93	95	95	82	99	47	7-6
4	54	50	59	66	77	83	89	92	93	93	94	95	83	97	50	7-1
5	60	59	57	69	79	83	84	86	85	86	90	91	82	98	57	3-8
6	84	84	83	84	86	86	86	87	86	86	86	88	89	97	83	0-0
7	70	68	72	79	82	87	89	94	95	93	94	94	85	95	71	7-7
8	63	64	70	81	87	91	93	93	94	94	94	96	88	98	63	6-8
9	55	54	64	73	82	87	90	93	94	95	96	97	85	97	54	7-6
10	47	52	57	70	83	86	89	91	93	94	95	96	84	98	47	7-0
11	62	57	61	76	86	89	90	90	92	92	93	93	86	99	57	3-0
12	62	55	60	65	78	82	85	86	90	91	86	87	83	99	55	4-5
13	52	54	62	71	78	83	89	93	92	93	95	97	79	97	52	7-4
14	57	53	63	70	83	88	92	95	99	99	99	99	88	100	53	6-9
15	70	67	61	82	88	93	95	94	95	96	96	97	91	99	61	5-1
16	76	76	78	82	85	87	88	89	90	91	93	94	89	97	76	0-0
17	77	80	82	84	84	85	88	89	89	89	91	91	88	95	77	0-0
18	61	60	57	63	78	85	87	89	91	93	96	97	84	97	57	5-8
19	69	65	61	72	38	57	47	36	57	70	69	70	77	99	36	5-8
20	48	45	43	44	55	61	72	83	85	89	90	91	68	91	43	7-3
21	65	61	63	73	85	87	90	90	93	94	94	95	85	96	61	4-8
22	59	60	71	76	80	84	86	88	90	92	93	93	85	96	59	2-1
23	83	83	85	85	87	88	89	90	91	92	94	93	90	96	83	0-0
24	44	46	50	52	51	52	53	50	51	49	49	51	71	100	44	3-3
25	51	48	44	50	63	52	71	67	56	64	66	85	54	85	43	2-1
26	80	72	69	78	82	88	90	89	90	89	90	89	85	98	69	2-3
27	57	44	42	41	45	46	45	62	74	80	86	88	65	88	41	4-4
28	56	44	45	43	44	46	46	14	46	52	49	49	69	96	43	3-5
29	59	71	77	70	77	89	91	92	91	91	90	90	66	92	49	0-5
30	95	94	93	94	94	95	95	96	96	95	95	94	94	96	91	0-1
M.	63-3	60-8	64-1	70-2	75-6	80-0	82-8	83-8	85-9	87-3	87-9	89-2	81-5	96-3	57-6	3-9

December.

1	73	73	77	82	87	89	89	90	92	92	92	92	87	96	73	3-7
2	73	71	73	81	86	89	91	92	93	93	93	93	88	94	71	4-8
3	80	81	80	83	89	91	93	94	95	95	96	96	89	96	78	0-0
4	85	83	82	86	91	93	95	95	96	96	97	97	93	91	82	5-2
5	89	85	81	83	90	92	94	95	95	95	95	96	93	97	81	5-8
6	83	83	81	86	89	89	90	91	92	93	93	93	92	96	81	5-3
7	80	78	73	79	77	71	78	78	69	68	68	66	83	95	66	5-6
8	70	69	62	73	76	79	83	84	86	88	90	90	78	92	62	6-1
9	69	66	60	63	65	66	69	68	69	70	73	72	78	92	60	2-1
10	81	80	84	87	90	93	94	93	93	93	94	95	88	95	76	4-2
11	84	78	68	75	82	83	88	89	90	91	92	93	90	98	68	2-9
12	77	71	69	68	79	82	84	82	81	85	86	88	85	95	68	4-9
13	76	73	67	72	83	87	89	90	89	89	89	90	86	93	67	1-5
14	76	77	78	82	87	88	90	91	93	95	96	97	88	97	77	2-2
15	58	63	60	56	73	80	83	75	58	48	56	68	77	97	47	0-0
16	62	85	86	89	93	94	93	93	94	95	95	95	86	97	62	0-0
17	93	88	89	90	93	94	95	95	95	95	95	96	95	97	88	0-2
18	96	93	89	91	93	95	96	97	97	97	97	97	96	97	89	2-6
19	89	88	87	86	88	89	89	78	90	91	93	93	93	97	86	3-9
20	96	96	96	96	90	87	88	98	89	90	90	90	93	97	87	0-0
21	76	71	84	84	85	88	88	89	88	89	89	88	86	91	71	0-0
22	77	75	77	76	82	83	84	86	87	86	84	84	83	88	75	0-0
23	65	63	63	62	76	78	81	83	86	86	86	88	78	88	62	4-1
24	79	77	72	74	78	82	86	88	87	88	88	88	85	88	72	1-5
25	80	77	71	69	78	81	86	87	87	88	88	88	85	88	69	2-7
26	73	65	72	73	80	84	84	86	87	88	88	89	81	89	65	3-2
27	69	62	59	71	81	80	82	80	76	68	67	66	80	90	59	2-9
28	45	45	46	49	51	52	55	57	59	62	67	75	55	85	45	5-4
29	93	97	97	97	96	96	96	96	96	96	94	91	94	98	55	2-2
30	57	57	57	52	58	58	63	58	68	68	71	72	67	83	52	0-0
31	85	84	96	96	96	96	96	95	95	94	94	94	87	96	74	0-0
M.	77-2	75-9	75-4	77-8	82-6	84-2	86-2	86-3	86-2	86-2	87-0	87-7	85-2	92-9	70-9	2-7

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
A p r i l.												
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
3.	3	—	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—
21.	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	—	—	—	—	—	8	10	3	5	8	—	—
23.	8	10	3	—	—	—	—	—	3	5	—	—
Summe . .	14	10	6	3	3	11	10	6	11	16	—	—
Häufigkeit	3	1	2	1	1	2	1	2	3	3	—	—
M a i.												
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	—	—	—	—	—	5	1	15	4	1	3	9
7.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	9	4	—	—	—	—	1	4	1	3	3	1
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	9	4	1	—	1	—	1	1
27.	—	4	9	4	1	—	—	—	—	3	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	4	3	5	15	4	3	1	—	4	—
30.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Summe . .	12	8	13	7	15	24	7	22	9	11	11	11
Häufigkeit	2	2	2	2	3	3	4	3	5	5	4	3
J u n i.												
2.	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	—	—	20	43	34	4	21	13	11	12	26	13
7.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	118	30	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	—	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	9	2
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	65
16.	40	32	10	5	2	—	1	18	32	24	13	6
17.	1	2	2	2	1	1	—	—	—	1	—	—
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	2	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	1	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Summe . .	173	87	57	54	41	6	22	32	45	41	48	86
Häufigkeit	8	8	9	7	7	3	2	3	4	4	3	4

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe	Dauer in Stunden
A p r i l.														
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	—	11	3·8
2.	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	8	8	51	7·5
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3·0
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	24	2·4
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	3·8
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1·7
Summe . .	—	—	—	—	—	—	—	5	13	16	24	13	161	21·8
Häufigkeit	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	29	—

M a i.														
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	1·2
4.	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	4·5
7.	—	—	—	—	—	—	—	31	6	1	—	38	76	2·3
8.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3·5
12.	—	—	—	3	5	13	28	30	23	38	42	44	226	8·2
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1·7
16.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	8	1·8
24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	1	12	1·1
26.	—	—	—	—	5	29	—	30	3	—	10	1	95	7·1
27.	—	—	10	3	—	3	3	—	—	—	—	—	40	5·1
28.	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	0·3
29.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5·3
30.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0·7
Summe . .	4	5	10	7	10	45	35	92	35	50	63	91	597	42·8
Häufigkeit	1	1	1	3	2	3	3	4	4	4	5	5	74	—

J u n i.														
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1·7
3.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199	9·5
7.	—	—	—	—	—	—	—	17	11	4	2	—	34	2·1
9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	172	4·6
10.	—	—	—	—	—	4	65	56	13	2	1	—	141	4·4
11.	—	5	6	5	2	—	—	—	2	5	—	1	48	4·9
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2·2
14.	—	—	—	4	1	49	20	21	13	7	11	7	133	7·0
15.	74	16	4	1	—	—	—	5	9	10	12	18	218	10·5
16.	1	—	—	—	—	9	15	20	16	5	1	1	251	17·0
17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5·3
23.	—	—	—	—	—	5	12	10	6	1	1	1	36	3·1
24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3·3
26.	—	—	—	—	—	—	23	49	32	9	1	2	116	5·2
27.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	0·5
28.	—	—	—	5	1	—	—	35	12	5	1	1	70	9·5
29.	—	—	—	—	—	7	93	41	17	73	2	—	233	4·8
30.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2·8
Summe . .	77	21	10	15	4	74	228	254	131	123	41	38	1708	90·6
Häufigkeit	3	2	2	4	3	5	6	9	10	11	10	9	136	—

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--------

Juli.												
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	4	11	1	1	1	5	4	—	—	—	2	—
8.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
9.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	—	1	1	—	4	5	5	4	1	1	—	—
14.	20	68	51	8	14	10	8	10	7	1	1	—
19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	8	2	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1
21.	—	1	4	18	1	1	—	—	—	—	—	—
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Summe . .	80	84	57	28	20	21	18	17	8	5	8	6
Häufigkeit .	5	6	4	4	4	4	4	4	2	4	5	2

August.												
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	—	—	—	20	75	94	158	91	91.	67	16	49
10.	4	1	14	7	11	9	8	2	—	—	—	1
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
25.	2	—	—	—	—	—	4	11	8	2	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	6	4	1	—	7	1	1	—	—
31.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	7	1	14	33	90	104	170	112	101	70	16	50
Häufigkeit .	3	1	1	3	3	3	3	5	4	3	1	2

September.												
1.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	—	—	1	—	—	1	—	4	2	2	1	—
18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	11
29.	2	10	10	7	7	5	2	4	6	10	2	1
Summe . .	6	11	11	7	7	6	2	8	14	16	7	12
Häufigkeit .	2	2	2	1	1	2	1	2	3	3	3	2

October.												
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	20	35	22
13.	5	11	12	8	17	17	7	6	4	1	—	—
17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	4	1	26	13	14	14	8	7	1	1	1	—
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	35	38	11	13	26	17	25	21	13	12	4	1
Summe . .	45	51	49	34	57	48	40	34	25	34	40	23
Häufigkeit .	4	4	8	3	3	3	3	3	4	4	3	2

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe	Dauer in Stunden
J u l i.														
2.	—	—	—	—	—	—	19	48	7	4	1	1	80	2·5
3.	—	—	—	8	—	—	19	4	—	—	—	—	31	1·7
4.	—	—	—	—	15	55	2	1	18	25	6	4	126	6·0
5.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	6·0
8.	14	30	14	6	2	18	27	8	2	17	2	2	150	10·8
9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3·0
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	8	1·7
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5·8
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208	9·2
19.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	6	1·0
20.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	21	2·2
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2·0
23.	—	—	—	—	33	1	1	—	—	—	—	—	35	1·5
28.	—	—	239	37	1	—	—	—	2	—	—	—	317	3·2
29.	—	—	—	11	54	5	1	—	—	—	—	—	71	2·2
30.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0·3
Summe . .	14	30	253	51	62	128	55	83	34	51	12	9	1134	58·1
Häufigkeit .	1	1	2	3	5	4	6	7	6	4	5	5	97	—

A u g u s t.

4.	—	—	—	—	—	—	—	21	1	—	—	—	22	0·8
9.	28	4	—	—	—	—	1	2	5	5	5	5	716	12·8
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	5·8
23.	—	—	—	4	1	—	—	—	51	102	63	5	226	3·7
24.	—	—	—	—	—	—	—	18	49	4	15	4	93	4·2
25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4·0
28.	—	—	—	—	47	102	47	33	44	33	16	2	324	6·6
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2·7
31.	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	2	5	28	1·6
Summe . .	28	4	—	4	48	102	48	74	170	145	101	21	1513	42·2
Häufigkeit .	1	1	—	1	2	1	1	4	6	5	5	5	64	—

S e p t e m b e r.

1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1·2
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	5	37	2·2
12.	—	—	—	—	110	13	1	—	—	—	—	—	124	1·8
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2·3
18.	—	—	—	—	—	—	—	11	14	1	—	—	26	1·3
28.	10	14	18	18	22	20	20	22	16	16	10	5	216	13·8
29.	2	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	79	10·2
Summe . .	12	14	18	18	132	33	25	37	32	34	26	10	498	32·8
Häufigkeit .	2	1	1	1	2	2	3	3	3	4	2	2	50	—

O c t o b e r.

9.	—	—	—	—	—	—	—	1	18	19	72	13	123	4·3
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1·5
12.	31	21	8	13	14	12	8	12	11	8	2	12	236	13·5
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	7·0
17.	—	—	—	1	1	—	—	9	13	2	1	1	28	4·2
19.	—	—	—	—	2	1	2	5	7	5	6	7	35	4·2
20.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	6·0
21.	—	—	—	—	—	—	8	9	32	12	11	11	83	5·0
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	10·8
Summe . .	31	21	8	14	17	13	18	36	81	46	92	44	901	56·5
Häufigkeit .	1	1	1	2	3	2	3	5	5	5	5	5	77	—

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
November.												
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	8	10	23	4	2	—	—	—	—	—	—	—
6.	—	—	—	4	12	18	14	10	12	2	2	2
17.	—	—	—	6	8	8	2	2	2	—	—	—
25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	10	8	2	6	15	2	2	2	2	2	12	29
27.	—	—	—	—	35	25	4	2	2	2	2	—
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	6	6	41	62	62	64	33	57	60	18	4	4
Summe	24	24	66	82	134	117	55	73	78	24	20	35
Häufigkeit	3	3	3	5	6	5	5	5	5	4	4	3

Uebersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
Jänner	20.73	20.73	20.79	20.70	20.60	20.59	20.74	20.99	21.18	21.22	21.07	20.62
Februar	10.70	10.63	10.49	10.36	10.39	10.43	10.55	10.80	10.92	10.89	10.81	10.64
März	06.22	06.21	06.07	06.00	05.93	05.95	06.06	06.16	06.20	06.06	05.90	05.66
April	09.60	09.55	09.53	09.48	09.51	09.63	09.81	09.81	09.68	09.45	09.16	08.75
Mai	08.91	08.92	08.89	08.89	08.97	09.05	09.15	09.08	08.84	08.56	08.31	07.93
Juni	12.09	12.09	12.09	12.09	12.14	12.22	12.29	12.27	12.02	11.79	11.57	11.29
Juli	13.82	13.77	13.73	13.74	13.85	13.96	14.01	13.97	13.75	13.43	13.06	12.64
August	14.98	14.99	15.03	15.12	15.21	15.40	15.60	15.56	15.37	15.08	14.71	14.26
September	15.62	15.63	15.60	15.59	15.61	15.76	15.97	16.01	15.93	15.72	15.30	14.84
October	10.69	10.65	10.55	10.58	10.66	10.74	10.91	11.13	11.13	10.95	10.61	10.18
November	10.9	10.81	10.70	10.70	10.69	10.71	10.93	11.12	11.23	11.22	11.05	10.60
December	17.38	17.41	17.41	17.41	17.30	17.32	17.42	17.66	17.95	18.14	18.01	17.58
Jahr	12.63	12.62	12.57	12.56	12.57	12.65	12.79	12.88	12.85	12.71	12.46	12.08

Stündlicher Regenfall in Zehntelmillimetern.

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe	Dauer in Stunden
November.														
1.	—	—	—	—	—	—	—	25	6	4	10	21	66	2·3
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	3·3
3.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	9·3
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4·7
5.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	0·3
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	10·3
7.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	7·0
8.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	8·7
9.	4	18	29	14	20	10	14	8	10	6	6	10	560	24·0
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	6	18	29	18	22	16	45	54	30	24	24	47	1065	69·9
Häufigkeit.	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	79	—

Uebersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
20·06	19·59	19·54	19·67	19·91	20·23	20·52	20·75	20·98	21·11	21·14	21·16	20·61	22·40	18·68
10·21	09·79	09·67	09·64	09·71	09·86	10·06	10·23	10·44	10·52	10·56	10·59	10·37	13·03	07·72
05·36	05·08	05·07	04·90	04·94	05·12	05·40	05·62	05·75	05·91	06·00	05·99	05·73	07·71	03·84
08·45	08·20	07·98	07·92	07·97	08·19	08·55	09·04	09·40	09·55	09·79	09·92	09·13	11·65	07·10
07·65	07·33	07·18	07·11	07·13	07·26	07·55	07·94	08·29	08·43	08·60	08·70	08·28	10·38	06·40
10·92	10·56	10·47	10·43	10·49	10·65	10·79	11·38	11·90	12·13	12·32	12·42	11·61	13·65	09·71
12·26	11·91	11·84	11·86	12·00	12·12	12·42	12·74	13·16	13·42	13·62	13·73	13·12	14·95	11·05
13·87	13·47	13·17	12·97	12·90	13·03	13·35	13·87	14·37	14·59	14·75	14·87	14·44	16·13	12·49
14·38	13·97	13·72	13·54	13·56	13·75	14·17	14·60	14·94	15·16	15·31	15·31	15·00	16·63	13·27
09·74	09·39	09·23	09·20	09·32	09·69	09·98	10·25	10·53	10·63	10·69	10·70	10·33	12·31	08·39
10·21	09·86	03·76	09·83	09·99	10·29	10·53	10·71	10·88	10·96	10·99	11·00	10·65	12·59	08·61
17·16	16·84	16·72	16·79	16·93	17·11	17·25	17·27	17·36	17·35	17·31	17·26	17·35	19·42	14·90
11·69	11·33	11·20	11·16	11·14	11·44	11·71	12·03	12·33	12·48	12·59	12·64	12·22	14·24	10·18

Uebersicht über den täglichen Gang der Temperatur (C°.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
Jänner . .	—0·7	—0·9	—1·0	—1·3	—1·4	—1·5	—1·6	—1·7	—1·6	—0·4	1·5	3·2
Februar . .	—1·5	—1·8	—2·0	—2·3	—2·5	—2·6	—2·7	—2·5	—1·9	—0·9	0·2	1·3
März . . .	1·8	1·4	1·3	0·9	0·6	0·5	0·6	1·2	2·3	3·8	5·0	6·7
April . . .	7·1	6·7	6·3	5·8	5·4	5·5	6·1	7·3	9·2	11·0	12·7	14·1
Mai	10·5	10·1	9·7	9·3	9·0	9·2	10·2	11·6	13·3	14·7	15·9	17·0
Juni	11·9	11·4	11·1	10·8	10·6	11·1	12·2	13·8	15·3	16·7	18·0	19·0
Juli	13·3	12·9	12·5	12·1	11·9	12·3	13·1	14·6	16·0	17·7	19·2	20·5
August . . .	15·0	14·4	13·9	13·3	13·0	12·9	13·7	15·0	17·0	19·0	20·7	21·9
September .	11·6	11·2	10·7	10·3	10·0	9·8	10·3	11·3	13·0	14·9	16·8	18·3
October . . .	7·9	7·8	7·6	7·4	7·2	7·1	7·2	7·6	8·6	10·1	11·6	13·1
November . .	4·1	3·9	3·6	3·4	3·3	3·1	2·9	2·8	3·6	4·9	6·6	8·1
December . .	—2·7	—2·9	—3·1	—3·2	—3·3	—3·4	—3·4	—3·4	—3·1	—2·3	—1·1	0·1
Jahr	6·5	6·2	5·9	5·5	5·3	5·3	5·7	6·5	7·6	9·1	10·6	11·9

Uebersicht über den täglichen Gang der relativen Feuchtigkeit.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
Jänner . . .	83·3	84·4	85·1	85·7	86·0	86·2	86·8	87·5	87·6	85·1	78·1	72·5
Februar . . .	86·9	87·5	88·6	89·1	89·0	89·2	89·3	89·2	86·7	82·6	79·0	75·6
März	84·4	86·6	87·6	88·2	88·7	89·4	88·2	86·5	81·4	74·4	68·0	63·3
April	80·9	82·2	83·1	84·1	85·8	85·5	82·0	76·9	68·9	61·1	53·2	48·8
Mai	79·3	80·5	81·6	82·6	83·9	83·5	80·0	73·9	66·6	62·1	55·8	50·7
Juni	90·4	91·8	91·6	91·8	90·6	87·3	81·0	74·1	66·9	61·6	57·6	52·5
Juli	90·0	91·2	91·9	92·1	91·1	87·5	81·9	74·4	67·6	61·7	56·5	51·5
August	90·0	91·2	93·0	93·7	95·1	93·0	87·6	80·5	71·7	64·8	59·8	56·4
September . .	90·8	92·3	92·8	93·6	93·8	92·8	88·1	82·9	74·9	67·4	61·5	58·0
October	90·2	90·3	91·1	91·1	91·1	91·1	90·4	87·5	82·7	77·4	71·7	66·7
November . . .	88·1	89·2	89·7	90·5	90·4	89·9	90·7	90·0	85·1	79·2	73·7	68·4
December . . .	88·0	88·0	88·7	88·2	89·5	89·7	89·5	89·4	88·8	87·1	84·4	80·9
Jahr	86·9	87·9	88·7	89·2	89·6	88·7	86·3	82·7	77·4	72·0	66·6	62·1

Uebersicht über den täglichen Gang der Temperatur (C°.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
4.6	5.0	5.2	4.3	2.7	1.8	1.1	0.6	0.2	-0.2	-0.4	-0.6	0.7	6.3	-2.3
2.0	2.4	2.5	2.2	1.5	0.7	0.2	-0.3	-0.7	-0.1	-1.3	-1.5	-0.5	3.2	-3.8
7.7	8.1	8.2	7.9	7.3	6.0	5.1	4.4	3.8	3.5	3.0	2.6	3.9	8.8	0.1
15.0	15.4	15.5	15.0	14.4	13.0	11.6	10.5	9.6	8.8	8.1	7.6	10.1	16.0	5.0
17.9	18.2	18.1	17.7	16.9	15.9	14.6	13.3	12.9	12.2	11.6	11.1	13.4	18.7	8.3
19.9	20.4	20.3	19.8	18.7	17.6	16.3	15.2	14.3	13.5	12.9	12.5	15.1	21.2	10.0
21.6	22.0	21.8	20.9	19.7	18.8	17.6	16.3	15.6	14.8	14.2	13.8	16.4	22.6	11.6
23.1	24.0	24.7	24.2	23.4	22.0	20.4	18.9	17.9	17.0	16.3	15.7	18.2	25.2	12.5
19.6	20.4	20.8	20.5	19.1	17.4	15.5	14.5	13.8	13.1	12.5	11.9	14.5	21.0	9.6
14.3	14.9	14.8	14.2	12.8	11.4	10.0	9.8	9.5	8.8	8.2	8.1	10.0	15.3	6.3
9.5	10.2	10.0	9.0	7.8	6.8	6.1	5.4	5.1	4.6	4.2	3.9	5.5	10.7	1.9
1.0	1.6	1.7	0.7	-0.4	-0.9	-1.5	-1.8	-2.1	-2.3	-2.5	-2.7	-1.7	2.0	-4.6
13.0	13.6	13.6	13.0	12.0	10.9	9.8	8.9	8.3	7.8	7.2	6.9	8.8	14.3	4.6

Uebersicht über den täglichen Gang der relativen Feuchtigkeit.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel	Max.	Min.
64.8	60.9	60.6	62.6	68.0	72.3	76.6	79.4	81.1	81.9	82.6	84.0	78.4	90.8	56.9
73.8	71.7	72.6	74.5	78.2	81.0	83.6	85.3	86.7	86.8	87.2	87.8	83.3	93.5	66.9
59.7	58.3	57.3	58.3	61.1	63.9	70.7	74.0	76.5	77.9	79.4	80.9	75.2	92.0	53.3
44.5	42.4	43.8	46.2	49.9	55.4	60.4	65.1	70.0	74.1	77.3	79.9	66.7	89.6	39.3
47.6	46.2	46.5	48.5	51.9	56.5	63.2	68.2	70.7	73.9	76.8	78.3	67.0	83.2	41.1
49.8	48.2	49.2	52.8	58.4	65.2	74.2	80.3	84.2	86.7	86.7	88.4	73.4	94.4	42.9
46.3	47.8	51.4	55.6	61.4	65.7	73.1	76.8	82.0	85.1	87.4	88.4	73.3	94.8	42.2
52.4	50.1	47.7	51.8	56.4	63.8	72.4	77.2	82.8	84.3	86.0	88.7	74.6	96.3	45.1
54.1	51.2	51.6	54.0	61.3	69.4	79.3	82.7	84.7	85.4	87.9	89.9	76.7	96.1	48.7
61.8	58.5	60.9	65.5	74.5	79.9	84.2	86.6	87.9	89.6	90.4	90.2	81.3	94.8	56.8
63.3	60.8	64.1	70.2	75.6	80.0	82.8	83.8	85.9	87.3	87.9	89.2	81.5	96.3	57.6
77.2	75.9	75.4	77.8	82.6	86.2	86.2	86.3	86.2	86.2	87.0	87.7	85.2	92.9	70.9
57.9	56.0	56.7	59.8	64.9	70.1	75.6	78.9	81.6	83.3	84.7	86.1	76.4	93.4	51.9

Uebersicht über den täglichen Gang der Sonnenscheindauer.

Monat	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12
Jänner	—	—	—	—	6·5	15·6	18·7
Februar	—	—	0·5	2·0	4·8	7·9	8·7
März	—	—	1·4	8·3	13·0	16·8	17·1
April	—	2·0	8·5	13·7	16·8	17·6	19·3
Mai	2·5	11·1	14·2	14·6	14·4	15·9	15·7
Juni	2·8	7·9	11·1	15·4	16·8	17·7	16·2
Juli	2·7	8·8	12·4	17·6	20·7	19·8	21·4
August	0·3	15·0	22·0	25·4	27·3	25·3	24·3
September	—	—	6·4	18·8	21·6	25·2	25·7
October	—	—	0·9	7·3	12·4	15·8	18·3
November	—	—	—	2·7	11·2	17·9	18·8
December	—	—	—	—	1·8	8·6	12·4
Jahr	8·3	44·8	78·0	125·8	167·3	204·1	216·6

Darstellung des täglichen Ganges des Luftdruckes durch die Besselsche Formel.

$$y = M + p_1 \cos x + q_1 \sin x + p_2 \cos 2x + q_2 \sin 2x \\ = M + a_1 \sin (A_1 + x) + a_2 \sin (A_2 + 2x).$$

Monat	M	p ₁	q ₁	p ₂	q ₂	a ₁	a ₂	A ₁	A ₂
Jänner	720·61	0·267	0·473	0·213	—0·403	0·543	0·456	29°4	152°1
Februar	710·37	0·091	0·320	0·235	—0·317	0·333	0·394	15°8	143°4
März	705·73	0·250	0·388	0·167	—0·261	0·461	0·310	32°8	147°4
April	709·13	0·453	0·783	0·164	—0·353	0·904	0·389	30°1	155°0
Mai	708·28	0·403	0·794	0·093	—0·287	0·890	0·301	26°9	162°1
Juni	711·61	0·490	0·865	0·155	—0·277	0·994	0·317	29°5	150°7
Juli	713·12	0·510	0·869	0·073	—0·342	1·008	0·349	30°4	168°0
August	714·44	0·290	1·113	0·175	—0·380	1·150	0·418	14°6	155°3
September	715·00	0·316	0·919	0·191	—0·441	0·972	0·480	19°0	156°6
October	710·33	0·255	0·601	0·133	—0·465	0·653	0·484	23°0	164°1
November	710·6	0·183	0·386	0·133	—0·412	0·427	0·433	25°3	162°2
December	717·35	—0·054	0·232	0·136	—0·318	0·238	0·345	346°8	156°8
Jahr	712·22	0·288	0·650	0·151	—0·352	0·711	0·383	23°8	156°8

Uebersicht über den täglichen Gang der Sonnenscheindauer.

Monat	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	Summe	Procente der möglichen Dauer
Jänner . . .	18·6	17·4	16·7	10·7	0·4	—	—	104·6	51 ⁰ / ₀
Februar . . .	13·0	10·8	10·4	8·7	5·2	—	—	72·0	30 „
März	17·5	16·8	16·3	15·9	7·5	0·1	—	130·7	38 „
April	18·4	16·5	16·3	14·0	12·0	3·2	—	158·3	42 „
Mai	16·9	15·4	14·1	13·0	8·8	5·3	0·7	162·6	38 „
Juni	16·3	15·7	14·0	12·2	9·6	5·8	2·5	164·0	38 „
Juli	21·9	16·2	16·3	12·6	10·1	7·2	3·1	190·8	44 „
August	23·3	23·4	25·6	21·6	19·8	9·9	0·9	264·7	65 „
September . .	26·9	24·8	23·0	23·7	18·7	2·8	—	217·4	62 „
October	17·7	19·4	20·0	19·0	11·4	—	—	142·2	48 „
November . . .	17·6	16·6	17·1	13·8	2·3	—	—	118·0	54 „
December . . .	15·3	18·6	19·1	7·2	—	—	—	83·0	45 „
Jahr	223·4	211·6	208·9	172·4	105·8	34·3	7·2	1808·4	46 „

Die
astronomische Standuhr
des
physikal. Institutes der Universität Innsbruck.

Von
Prof. Dr. Paul Czermak.

Das physikalische Institut der Universität besitzt eine astronomische Standuhr, welche sowohl in mechanischer als auch historischer Hinsicht von grossem Interesse ist. Da insbesondere die bisher bekannten historischen Daten über dieselbe sehr spärlich und zum grössten Theile unrichtig waren, so habe ich es im Folgenden unternommen alles mir zugängliche Materiale, welches mit diesem Werke im Zusammenhange steht zu sammeln, um den Werth dieses seltenen Stückes in's richtige Licht zu setzen. Es soll aber auch die Mechanik des Werkes soweit im Detail besprochen werden, als es nötig ist um daraus das Verdienst des damaligen Erfinders beurtheilen zu können.

1. Beschreibung der Uhr.

Die Uhr ist eine Standuhr von 2 $\frac{1}{2}$ Meter Höhe und ist das Werk in einem eingelegten Kasten im Roccocostyle untergebracht. Die Ausstattung ist einfach, jedoch macht die ganze Uhr, wie die Abbildung auf Tafel I zeigt einen sehr harmonischen Eindruck. Die grosse Zeigerplatte (Tafel II) trägt elf verschiedene Zifferblätter. Zu oberst befindet sich die gewöhnliche Uhr, welche mittlere (bürgerliche) Ortszeit angibt. Unterhalb derselben ist eine fingirte Sonnenuhr, wo ein flacher Zeiger den Schatten einer Sonnenuhr markirt und von 6 Uhr Früh von links über Mittags, auf 6 Uhr Abends nach rechts hinüber wandert. Ist der Zeiger daselbst angelangt, so springt er

auf 6 Uhr Früh zurück und macht in den Nachtstunden denselben Weg noch einmal durch.

Rechts und links von der Mittlerenzeituhr sind zwei kleine Zifferblätter mit je einem Doppelzeiger angebracht, von welchen der linke mit seinem obern Ende die Declination der Sonne und mit dem untern Ende den Sonnenaufgang angibt, während der rechte Zeiger oben die Länge des Tages und unten jene der Nacht zeigt.

Zu beiden Seiten der Sonnenuhr sind zwei wichtigere Zifferblätter angebracht. Links befindet sich der Datumzeiger, welcher mit dem längeren Zeiger den Monatstag und mit dem kürzeren den Monat zeigt. Der längere Zeiger geht längs einer von 1 bis 31 bezifferten Theilung, welche einen Halbkreis einnimmt und springt derselbe wenn er den jeweiligen Letzten eines Monats erreicht hat, auf den Ersten zurück. Der Monatszeiger geht längs einer Theilung, die sich in vier Quadranten wiederholt und zwar gilt der erste Quadrant für das Schaltjahr und die andern für die drei gemeinen Jahre. Das Ziffernblatt rechts von der Sonnenuhr lässt an einem längeren Zeiger die Zeitgleichung ablesen, das heisst um wie viel die wahre Sonnenzeit der mittleren vor oder nach ist. Ein kürzerer Zeiger zeigt dann an einer inneren Theilung, welche aber nur von 5 zu 5 Tagen getheilt ist, das rohe Datum an.

Das wichtigste und das interessanteste Zifferblatt ist aber das grosse mittlere. Es stellt den Thierkreis mit seinen 12 Bildern dar und bewegen sich längs derselben 5 Zeiger. Das Blatt trägt auf seiner Innenseite eine Theilung in 360 Graden, während es nach Aussen zu die 365 Tage des Jahres aufgetragen hat und sind die Monate darüber geschrieben und die Tage von 5 zu 5 beziffert. Es sind eigentlich 4 Tagestheilungen übereinander gestellt, welche immer um $\frac{1}{4}$ Tag gegeneinander vorge-schoben sind, wodurch der Schalttag seine Berücksichtigung findet. Die innere Gradtheilung hat ihren Null-

punkt an der Stelle, welche dem 21. März der äussern Theilung gegenüber liegt; markirt also den Frühlingspunkt, so dass sie die Längen der Gestirne angibt.

Der längste von den 5 Zeigern trägt ein vergoldetes Scheibchen, welches die Sonne vorstellt und bewegt sich derselbe in einem Jahre im Thierkreise herum. Ein kürzerer Zeiger, welcher an einer Excenterscheibe sitzt trägt das Mondscheibchen und vollführt derselbe seine Umläufe so, dass er die Längen des wahren Mondes angibt, während der mit ihm durch ein sternförmiges Schräubchen verbundene vergoldete Doppelzeiger die mittleren Längen weist. Das Mondscheibchen bleibt daher entweder hinter dem goldenen Nachbarzeiger zurück oder es eilt ihm etwas vor. Beide Zeiger brauchen gegen $27 \frac{1}{3}$ Tage zu einem Umlaufe.

Ein vierter Zeiger, der auch nach beiden Seiten verlängert ist und die vergoldeten Buchstaben A (pogäum) und P (erigäum) trägt, gibt die Lage der Erdferne und Erdnähe des Mondes an, während der fünfte Zeiger die Richtung der Knotenlinie der Mondbahn gegen die Ekliptik angibt. Er ist als breiter vergoldeter Drache dargestellt, welcher auf einer Seite den Drachenkopf, (aufsteigender Knoten) und auf der andern Seite den Drachenschweif (absteigender Knoten) trägt. Der Apsidenzeiger muss daher $8 \frac{1}{2}$ Jahre und der Drachenkopf $18 \frac{1}{2}$ Jahre zu einem Umlaufe brauchen.

Aus der Stellung dieser 5 Zeiger gegeneinander kann man daher alle Constellationen von Sonne und Mond entnehmen.

In den Ecken um dieses Hauptzifferblatt sind noch vier kleine angebracht von untergeordneter Bedeutung. Links oben sind 7 verschiedene Musikstücke angegeben, welche ein Glockenspiel eine Minute vor Beginn des Stundenschlagwerkes abspielt. Dieselben sind genau so, wie sie von den Hämmern auf länglichen Stahlparallelepiped angeschlagen werden, auf dem beigegebenen

Notenblatte, Tafel III., niedergeschrieben. *) Wenn dieselben auch thematisch nicht so sehr hervorragend sind, so glaube ich doch, dass ihnen wegen der Originaltreue ein gewisses historisches Interesse zukommt.

Rechts gegenüber sind die Wochentage, links unten der Sonntagsbuchstabe des Kalenders und rechts gegenüber das Mondesalter mit den Vierteln angegeben.

Schliesslich ist noch die Jahreszahl in 4 Ausschnitten ersichtlich und stellt die Uhr die Einheiten und Zehner automatisch weiter, während die Hunderter und Tausender mit der Hand gerichtet werden müssen. Auf dem Plättchen für die Tausender sind die Zahlen 1, 2 und 3 enthalten, so dass der gute Pater noch auf ein Functioniren des Werkes im Jahre 3000 gehofft hat.

2. Historischer Theil.

In der Mitte des oben erwähnten grossen Zifferblattes unterhalb der concentrischen 5 Zeigerachsen, befindet sich folgende Inschrift: „Pater Aurelius a Sancto Daniele August. Discalc. p. t. captivorum curatus invenit et propriis manibus elaboravit. Vienne 1775.“ Ferners ist noch am Rande des Thierkreises eine Gravirung angebracht, welche lautet: „Pater Aurelius Aug. excudit“.

Wir erfahren also daraus, dass ein Pater aus dem Augustiner Baarfüsserorden zu Wien, welcher auch Gefangenencurat war, diese Uhr im Jahre 1775 erfunden und selbst verfertigt, sowie, dass er die Gravirung der sehr sorgfältig getheilten Zifferblätter auch selbst ausgeführt hat.

*) Bei dieser, wegen der Verstimmung einiger Stahllammellen und Verbiegung mancher Spielstifte auf der Walze, nicht so leichten musikalischen Aufgabe hat mich Collega Prof. F. Hillebrand auf's beste unterstützt, wofür ich Ihm hier bestens danke.

Ausser dieser Inschrift fanden sich nur unter den älteren Schriftstücken des physikalischen Institutes eine Beschreibung der Uhr mit Anweisungen für den Uhrmacher bei einer eventuellen Reinigung oder Reparatur derselben; ferner eine Anweisung für die astronomische Einstellung der Zeiger. Das erstere Schriftstück ist von Pater Aurelius selbst verfasst und wie sich herausstellte eine Abschrift, das zweite ist von dem damaligen Physik-Professor Ignatz Weinhart geschrieben. Beide Schriftstücke tragen weder Datum noch Unterschrift.

Die einzige Stelle nun, wo dieser Uhr Erwähnung gethan wird, findet sich in einem der zahlreichen statistischen Werke von Ignatz de Luca, dem so verdienstvollen Historiker der Innsbrucker Universität.

In dem Werke: „Ignatz's de Luca, kaiserl. königl. Rath und Professors, Journal der Literatur und Statistik. Erster Band. Innsbruck mit Akademischen Wagner'schen Schriften 1782. Literatur. Versuch einer akademischen Gelehrten - Geschichte von der kaiserl. königl. Leopoldinischen Universität zu Innsbruck“, wird bei Besprechung der philosophischen Fakultät § 71, p. 85 angeführt:

„Zur nähern Erweiterung des physikalischen und mathematischen Studium wurde unter dem würdigsten Prof. Ignatz von Weinhart ein Museum angelegt, welches durch die besondere Ob-
sorge des itzigen Professors der Mathematik, D. v. Zallinger, schon viele Erweiterung erhalten hat. Auch für die Astronomie sind Instrumente hinzugekommen, da D. v. Zallinger beschäftigt ist, verschiedene astronomische Beobachtungen zu machen.

I. (werden einige physikalische Apparate aufgezählt).

II. (Werden die beiden berühmten, jetzt im Ferdinandeum aufgestellten, Globen des Peter Anich beschrieben).

III. Eben daselbst steht eine astronomische Uhr, die keiner weiteren Empfehlung bedarf, da sie von dem geschickten Mechaniker Fr. David vom h. Cajetan Augustiner Barfüsserordens zu Wien verfertigt ist. Die verklarte Monarchin M. Theresia hat sie vor einigen Jaren dem Musäum geschenkt. Der eigentliche Name des Fr. David ist: Cajetan Rutschmann, er ward zu Lämbach im Schwarzwalde am 5. Oktober 1726 geboren, betrieb das Schrei-

nerhandwerk, und trat 1751 zu Mariabrunn in Niederösterreich in den Orden, im folgenden Jar am 22. März legte er die Profess ab. In seinem Orden widmete er sich ganz dem mechanischen Studium, und seinen glücklichen Fortgang darinnen zeigen am schönsten seine Werke, deren einige sein Kloster verwart. Man sehe des I. B. II, St. des gel. Oest. S. 296.*

Ein grosser Irrtum de Lucas fällt sofort auf, indem er die sehr deutliche und wohlerhaltene Inschrift der Uhr ganz ignorirt. Dass Pater Aurelius a Sancto Daniele und nicht Frater David a Sancto Cajetano der Erzeuger dieser Uhr war, ist auf Grund der Inschrift nicht zu bezweifeln. Es wird auch gezeigt werden, dass diese zwei verschiedene Personen sind. Dass aber de Luca den Fr. David für den Verfertiger hielt, ist andererseits auch sehr begreiflich, da gerade zu dieser Zeit Fr. David der berühmteste Erfinder solcher astronomischer Uhren war und sich ebenfalls zu Wien im Augustiner Baarfüsserkloster befand.

Die Schenkung durch Maria Theresia hingegen hat sich als richtig herausgestellt, wodurch auch die Identität der durch de Luca erwähnten Uhr mit der vorliegenden gesichert ist.

In der Bibliothek des hiesigen Museums, Ferdinandeum, fanden sich nämlich*) die Rechnungen des physikalischen Kabinetes aus den Jahren 1751 bis 1780 im Manuskripte vor und zwar in dem Bande:

Dipaulliana 1003, überschrieben als:

Rationes Accepti et Expensi pro adornando auditorio, lectionibus physico experimentalibus destinato in Universitate Oenipontana 1751—1780.

Rechenbuch der Lehrkancel für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck 1751—1780.

*) Ich verdanke deren Fund der freundlichen Nachforschung meines Collegen Prof. W. Wirtinger, welchem ich hier meinen besten Dank ausspreche.

Zum Schluss der Rechnungen erscheint der Abschnitt:

Quae armario donata fuere:

1776. Horologium astromaticum pretiosissimum, Viennae ab Augustiniano constructum et ex Munificentia Aug.^{mae} nostrae per Excell.^{um} D. Gubernii praesidem circa initium Septembris Museo donatum.

Geschenke an die Sammlung:

1776. Eine sehr wertvolle astronomische Uhr, welche von einem Augustiner-mönche zu Wien verfertigt und durch die Huld unserer Kaiserin im Wege des h. Statthalterei-Präsidiums zu Anfang September an das Cabinet geschenkt worden ist.

Unter den Rechnungsposten finden sich nun weiters folgende Stellen:

1776. Per describenda Instructione tractandi horologii Viennae missi . 26 kr.

1776. Horologopego in additamentum mercedis pro impensa saepius opera horologii Viennense per itineris concussiones non nihil laesum plene reparandi, interim 2 fl. 6 kr.

1777. Pro 3 Ponderibus plumbeis eorumque fulcro 1 fl. 10 kr.

1777. Pro notabili augmento ponderum horologio Viennensi adjiciendorum (nempe 8 circiter librarum) pro ijs fundendis et nova

1776. Für Abschreiben der Anweisung wie die aus Wien geschickte Uhr zu behandeln sei . . . 26 kr.

1776. Dem Uhrmacher als Löhnungszulage für die öftere Bemühung um die durch den Transport beschädigte Wiener-Uhr vollständig zu repariren, einstweilen 2 fl. 6 kr.

1777. Für 3 Bleigewichte u. deren Gehäuse 1 fl. 10 kr.

1777. Für eine beträchtliche Vermehrung der Gewichte an der Wiener Uhr (um ungefähr 8 Pfund) für das Giessen derselben und

capsa eorum aurichalcina
4 fl. 20 kr.

1777. Horologopego ter
quaterve motum illius horo-
logii restituenti . . . 1 fl.

1778. In reparandum et
a pulveribus expurgandum
Viennense Horologium, vo-
lente Excell.^{mo} Gubernio et
laboris huius hoc pretium
approbante . 13 fl. 24 kr.

1780. Horologopego pro
frequentiore opera ad horo-
logium Viennense*) . 1 fl.

für ein neues Gehäuse der-
selben aus vergoldeter Bronze
4 fl. 20 kr.

1777. Dem Uhrmacher
für drei- oder viermalige
Reparatur der Uhr. . 1 fl.

1778. Für Reparatur der
Wiener-Uhr und Reinigung
derselben von Staub, nach
Auftrag der h. Stattbalterei,
welche auch die Höhe der
Kosten bewilligte. . 13 fl.
24 kr.

1780. Dem Uhrmacher
für wiederholte Arbeit an
der Wiener-Uhr. . . 1 fl.

Aus diesen Aufzeichnungen erfahren wir zunächst die Schenkung durch Maria Theresia zu Anfang September 1776, also ein Jahr nach ihrer Fertigstellung und stimmt dies mit der Angabe von de Luca, der im Jahre 1782 sagt, „vor einigen Jahren“, vollkommen überein. Ferners wird der Abschrift einer Beschreibung und Anweisung für den Uhrmacher, Erwähnung gethan. Von diesem Schriftstücke war früher die Rede und ist in demselben auch erwähnt, dass die Uhr ohne Gewichte versandt wird, der Bequemlichkeit wegen und sind die ungefähren Gewichte derselben in Pfunden angegeben. Daraus erklärt sich der Rechnungsposten für die drei Gewichte.

Am wichtigsten jedoch ist die Angabe der Beschädigung der Uhr beim Transporte und die fortwährenden Versuche der Uhrmacher das Werk in Gang zu setzen.

*) Bei der Uebersetzung dieser Stellen unterstützte mich Prof. E. v. Ottenthal auf das wirksamste, wofür ich Ihm hier meinen besten Dank ausspreche.

Es zeigten sich nämlich, als ich die Uhr ganz zerlegte, Verbiegungen an so massiven und wesentlichen Theilen, dass es sehr gut möglich ist, dass dieselben noch von der Reise vor 120 Jahren herrührten. Nach Beseitigung dieser Fehler war auch das Werk sofort in Gang gebracht und geht dasselbe nun schon über ein Jahr. Aus der sehr geringen Abnützung der Lager und Zapfen ist sogar ziemlich sicher zu vermuthen, dass die Uhr in Innsbruck überhaupt nie längere Zeit gegangen ist.

Wenn wir nun auf die Person des Constructeurs unserer Uhr näher eingehen wollen, so sehen wir, dass aus den hier vorhandenen Daten gar nichts über denselben zu erfahren ist und uns de Luca auf einen falschen Weg führt.

Trotzdem wollen wir diesen letzteren Weg verfolgen und wir werden sehen, dass er uns zur Beurtheilung des Werthes der Uhr und der Werthschätzung ihres Erzeugers von Wichtigkeit ist.

Zunächst folgen wir dem Citate von de Luca: Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch; des ersten Bandes zweites Stück, gedruckt mit von Ghelenschen Schriften. 1776. Es findet sich dort unter dem Abschnitte: „Die izt lebenden Künstler in den k. k. Staaten p. 269.

David vom h. Cajetan, Laienbruder aus dem Orden der Baarfüsser Augustiner in Wien, gebohren in Schwaben. Er ist der Verfertiger eines künstlichen Uhrwerkes, welches in der Bibliothek seines Klosters sich befindet und wovon Hr. Rendler eine gedruckte Beschreibung 1771 geliefert hat. „Unter vielen astronomischen Uhrwerken, die bisher an verschiedenen Orten verfertigt werden, verdient diese nicht darum den Vorzug, weil sie von einem Manne herrührt, der das Uhrmacherhandwerk nie erlernt hat, der von Jugend auf nur das Schreinerhandwerk sein Gewerbe seyn liess und seine Einsicht in dieser Kunst allein seinem unermüdeten Fleisse und seiner eigenen Anwendung zu verdanken hat; sondern auch darum, weil sie an Richtigkeit und Genauigkeit in der Berechnung alle andern übertrifft“.

Ausführlicheres findet sich im biographischen Lexikon d. Kaisert. Oesterreich v. Dr. C. Wurzbach p. 177, 3. Theil, dort heisst es unter:

David vom h. Cajetan (Augustinermönch und Mathematiker) geb. zu Lembach im Schwarzwalde 5. October 1726, gest. Wien 4. Februar 1796, kam als reisender Tischlergeselle nach Wien. Die damalige Klosterverfassung ordnete an, dass jedes Kloster in seinen Laienbrüdern die nöthigen Handwerker besitze. Seine Geschicklichkeit bewirkte es nun, dass er im Kloster zu Maria Brunn nächst Wien aufgenommen und am 22. März 1754 zur Ablegung des Gelübdes zugelassen wurde. Er besass seltene Fertigkeit in mechanischen Arbeiten und in seiner Neigung für ernste Studien machte er sich an den Bau einer astronomischen Uhr, wobei seine Pünktlichkeit und Genauigkeit in den Berechnungen die Vollendung eines Werkes förderte, das seiner Zeit und später von Fremden und Einheimischen bewundert wurde. Wie Gräffer meldet, war das Meisterwerk eine Zierde des Wiener Augustinerklosters, nun (1835) befindet es sich verkäuflich in Privathänden, da die nahe Auflösung des Ordens eine öffentliche Versteigerung veranlasste. Ueber D.'s Bedeutung als Mechaniker geben zwei in jener Zeit erschienene Schriften näheren Aufschluss. Die von J. Rendler ausgegebene „Beschreibung und Erklärung der astronomischen Uhr von David a. S. Cajetano“ (Wien 1771, 4^o, mit 2 K. K.) und „Nachtrag“ (1778): — und „Neues Rädergebäude oder Auflösung der Aufgabe, wie eine ununterbrochene Bewegung durch Räderwerk ausgeführt werden kann“. (Wien 1791. gr. 8^o. mit K.) David war zuletzt Laienbruder bei den Augustinern nächst der Burg in Wien.

(De Luca) das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch (Wien 1776, Ghelen. 8^o) I. Bds., 2. St., S. 296. — Oesterreichs Walhalla (Wien 1849, A. Pichler, Kl. 8^o) S. 20, 59. — Oester. National-Encyklopädie (von Gräffer u. Czikan). (Wien 1835, 6 Bde) I. Bd. S. 688.

Aus diesem zuletzt citirten Werke hat Wurzbach seinen Text fast wörtlich abgeschrieben. Im 27. Theile des biograph. Lexikon findet sich aber noch:

Rutschmann, David. Dies der Familienname des als Mathematikers und Mechanikers seiner Zeit berühmten Augustinermönches David vom h. Cajetan, dessen Biographie schon unter diesem Namen im III. Bd., S. 177 dieses Lexikons mitgetheilt wurde. Hier werden nur mehr einige Quellen, welche nähere

Nachrichten über diesen merkwürdigen Mann geben und sein Bildnis nachgetragen.

(Hofstäter) Magazin für Literatur und Kunst (Wien Kl. 8^o) IV. Jahrgang (1796) Bd. III. S. 278, Bd. IV. S. 250.

Kunitsch (Michael) Biographien merkwürdiger Männer der österr. Monarchie (Gratz 1805. Tanzer 8^o) Bdehn. I. S. 71.

— Porträt Unterschrift: Frat. David Rutschmann. Ohne Angabe des Zeichners und Stechers (Wien, Medaillonformat, in Johns Punctirmanir von Putz?).

In diesen von Wurzbach citirten Werken ist nichts wesentliches enthalten, was dieser nicht selbst in sein Lexicon aufgenommen hätte nur zwei Quellen wären noch erwähnenswerth. In der österreich. Zeitschrift für Geschichte und Staatskunde, II. Jahrg. von Kaltenbäck. Wien 1836, ist in einem Aufsatz: „Scene aus dem Leben des Frater David a. S. Cajetano“, ausser den bereits bekannten biographischen Daten noch erwähnt, dass Frater David nach seinem Eintritt in das Augustinerkloster in Wien zuerst die grosse Stadtuhr, deren Reparatur bereits früher viele Meister vergeblich versucht hatten, neu herstellte. Er demonstrirte die im bürgerlichen Zeughause aufgestellte Uhr der Kaiserin Maria Theresia und dem Kaiser Josef in Anwesenheit des ganzen Hofes.

Noch ausführlicher ist dies in der Geschichte der Klerisey (Austria sacra) von Marian, Priesters des reformirten Ordens der Augustiner Barfüsser am Hofkloster zu Wien, Wien 1788, dargestellt. Dasselbst wird aber noch einer zweiten astronomischen Uhr Erwähnung gethan, welche von Fr. David reparirt oder eigentlich umgebaut wurde. Es heisst dort p. 4:

... „Ich meyne das im J. 1754 von Johann Georg Nestfeld in dem Maynzischen etc. neu erfundenes und glücklich zu Stande gebrachtes Kunst- und Meisterstück, das so berühmte Systema Copernicanum, welches er von allen Reichsfürsten nur für den K. K. Wienerhof um etliche Tausend Gulden zum ewigen Andenken seiner erfurchtsvollen Ergebenheit bestimmt und gewidmet wissen wollte, und welches auch bis auf die letzten 15 J. J. her immerfort seinen ungehemmten Lauf machte, nun aber von meinem

Mitbruder, dem schon berühmten Mechaniker Fr. David à. S. Cajetano, einem Schwarzwälder etc., Augustiner Barfüsser, in dem k. k. Hofkloster an der Burg, wiederum in den vorigen Gang und vollkommenen Stand hergestellt und auf Kosten der k. k. Bibliothek ganz durch ihn zurecht gebracht ward, obschon dasselbe ausser dem Chronologisch- und Geographischen (welches auch er eben vor einigen Jahren erst zurecht gebracht und wieder hergestellt hatte) alles das übrige Triebwerk, selbst mit Vermissung der Zähne, bereits ganz verlohren hatte“.

Ueber die Zeughausuhr findet sich aber p. 204:

... „Jedennoch folgt hier ein kurzer Auszug von der grossen und gewiss kostbaren Uhr, welche im Jahre 1702 von dem Kleinuhrmacher Christoph Schener in Augspurg zwar verfertigt worden ist, bis nun zu aber wegen der inzwischen geschehenen oftmaligen Uebertragung von Orte zu Orte niemals einige Dienste geleistet, sondern schon vom Jahre 1747 gar ohne Gang und Bewegung gestanden; als sie dann endlich (nach vielen immer vergeblich angestellten, kostbaren Versuchen von andern hie und da) eben durch den vorgedachten Fr. David à. S. Cajetano (welcher sich nur zur Beyhilfe den hiesigen bürgerlichen Grossuhrmacher Paul Hartmann ausgesucht und bey solchem Werke nicht nur allein viel altes, undienstbares abgethan, sondern auch die innerlichen Haupt- und Triebwerke vom Grunde aus neu gemacht, und auch Zeiger nach chronologisch- und astronomischen Diensten auf das genaueste berechnet und vermehret hatte) im Jahre 1770 wieder ganz neu hergestellt wurde. [Hier folgt die detailirte Beschreibung der Uhr, welche ich übergehe. Marian fährt dann fort]:

Diese nun nach 23jährigem Stillstande wieder ganz neu hergestellte und bereits volle 40 Jahre immer gut fortgehende probhaltende Kunstuhr gehöret eben dem löblichen Stadtmagistrat in Wien, der es in dem bürgerlichen Zeughause stäts aufgestellt bewahren und in der Woche nur einmal aufziehen lässt, allwo auch im Jahre 1770 selbst Se. Majestät der Kaiser Josef II. unser itzt glorwürdigst regierender Monarch, wie auch die damals regierende K. K. M. Theresia, höchst sel. Angedenkens grosse Frau! samt dem Erzherzog und dem Grossherzoge von Toskana und dessen Gemahlin, Infantin von Spanien etc. den allergnädigsten Augenschein davon zu nehmen, und sich alles von dem Frater David, als dem künstlichen Wiederhersteller etc. genau erklären, sodann in einem herablassendsten Gespräche Ihre beyderseitige ausnehmendste Zufriedenheit und huldreichste Gewogenheit zu erkennen zu geben geruheten.“

Zum Schlusse erwähnt Marian noch die grosse Davidsche Uhr, welche im Bibliotheksaale der Augustiner seit 1769 aufgestellt war.

Aus diesen Berichten ergibt sich unmittelbar der Bildungsgang Fr. Davids. Durch die Reparatur und theilweise Reconstruction der astronomischen Uhren von Christof Schener aus dem Jahre 1702 und von Johann Nestfeld vom Jahre 1754 war er auf dieses Gebiet gelenkt worden und verfertigte inzwischen selbständig die grosse im Jahre 1769 vollendete Uhr der Augustiner Klosterbibliothek. Eine weitere David'sche Uhr beschreibt Regierungsrath Dr. Ilg in seinem Prachtwerke über das Palais Schwarzenberg am Heumarkt in Wien (Wien 1895, J. Löwy). Ilg hielt diese Uhr für die Augustiner Klosterbibliotheksuhr, welche verschollen war, und die sich jetzt im Besitze des hochw. Abtes von Zwettl befinden soll *).

In dem Monatsblatte des Altertums-Vereines zu Wien V. Bd., Nr. 4, April, 13. Jahrg. 1896 theilt nun Centralarchivsdirector des Fürsten Schwarzenberg Dr. A. Mörath mit, dass sich in der Hauptcassarechnung vom Jahre 1793 sowohl ein Posten von 700 fl. für den Bildhauer Vogl fand, welcher den „Uhrkasten von Mahoni-Holz zur künstlichen Uhr“ verfertigt hatte, als auch ein Posten von 2000 fl. für den Uhrmacher Joseph Ruetschmann „für die nach Angabe des Frater David von Augustinern verfertigte und ordentlich zusammengesetzte mathematische Uhr“ vorkommt. In der Quittung des Uhrmachers ist auch die Uhr genau beschrieben und der Anfertigungsauftrag durch den Fürsten Schwarzenberg angeführt. Es ist dadurch sichergestellt, dass sowohl diese Uhr noch

*) Wie ich eben erfahre befindet sich diese Uhr seit dem Jahre 1866 daselbst, nachdem sie vorher ein ungarischer Magnat besessen hatte, von welchem sie der Wiener Uhrmacher Lutz erwarb. Von diesem gieng sie, reparirt und renovirt, um den niedrigen Preis von 1200 fl. in den Besitz des hochw. Herrn Prälaten von Zwettl A. Steininger über.

die letzte David'sche ist, da dieser drei Jahre später starb, als auch, dass alle die früheren Historiker den Uhrmacher Jos. Ruetschmann, welcher in der letzten Zeit unter Anleitung David's arbeitete, mit diesem selbst zusammenwarfen. Der Irrtum wurde durch den Italiener Freddy hervorgerufen, welcher in seiner „Descrizione della citta di Vienna“ daselbst 1801 I. pag. 158 den Uhrmacher Rutschmann bespricht und ihn David Rutschmann nennt und die Biographie Fr. Davids beilegt *).

Wenn wir nun noch den Irrtum de Lucas hinzunehmen, der unsern Pater Aurelius unbewusst mit dem Fr. David identificirt hat, so hätten wir gar drei verschiedene Personen für den Fr. David.

Durch diese vielfachen ausführlichen Quellenangaben und Citate ist jedenfalls gezeigt, dass Fr. David ein seltenes mechanisches Talent und bei seinen Zeitgenossen genügend bekannt und gewürdigt war.

Es muss daher Wundernehmen dass Pater Aurelius zur gleichen Zeit im selben Kloster befindlich ein gleiches Talent gewesen sein soll und von keinem seiner Zeitgenossen erwähnt wird. Insbesondere hätte man von Marian, welcher bestrebt war jeden seiner Mitbrüder, der in irgend einer Weise bemerkenswerth war, hervorzuheben, eine Andeutung erwarten sollen. Da Pater Aurelius Gefangenencurat war, so hoffte ich in den Wiener-Archiven in einem Personalregister oder Ordensverzeichnisse wenigstens die Sicherstellung der Person desselben zu erfahren. Leider musste ich mich überzeugen, dass gerade über diesen Zeitabschnitt fast nichts zu erfahren ist. Nach den mühsamsten und umständlichsten Nachforschungen und Umfragen erfuhr ich, durch die gütige Vermittlung

*) Nach neueren Umfragen, die ich eben eingeleitet habe, scheint der Familienname Fr. Davids doch Rutschmann zu lauten und der Uhrmacher Jos. Ruetschmann ein Onkel David's und Bruder dessen Vaters Sebastian Rutschmann gewesen zu sein.

des Herrn Centralarchivdirectors Dr. A. Mörath, von dem besten Kenner der Geschichte des Augustinerordens dem hochw. Herrn Pater Cölestin Wolfgruber im Schottenstifte folgende Stelle aus den Protocollen über Kloster, Sacristei und Pfarre: „Nach der Aufhebung des Jesuitenordens übernahmen es die Augustiner, die Stelle des Armen-Sünder-Paters zu besetzen. Der Erste war Pater Aurelius, welcher am 13. October 1773 die Besuchung dieser Gefangenen in dem Amthaus angefangen hat.“ Dadurch ist wohl jeder Zweifel über die Existenz unseres Paters in seiner Eigenschaft als p. t. captivorum curatus behoben. Ueber sein mechanisches Talent müssen wir seiner selbst verfassten Inschrift so viel Glauben schenken, dass er das Werk selbst verfertigt hat. Wie viel aber von demselben auf das „invenit“ zu schieben ist, können wir erst bei der genauern Besprechung der Construction entscheiden.

Ich hatte Gelegenheit in die Schrift von J. Rendler über die grosse Fr. David'sche Uhr der Augustinerbibliothek Einsicht zu nehmen und besichtigte ich auch die Uhr im Palais Schwarzenberg in Wien. Ich ersah daraus, dass unsere Uhr ganz nach den Principien der David'schen Uhren gemacht ist. Gerade zwei mechanisch schwierig zu lösende Probleme, die Construction des Datumanzeigers und der Zeitgleichung sind in identischer Weise ausgeführt. Ebenso findet sich die vierfache Theilung der Tage für die drei gemeinen und das Schaltjahr am äussern Rande des Thierkreises genau ebenso an den David'schen Uhren. Es wäre nun doch zu merkwürdig, dass zur selben Zeit im selben Kloster zwei Constructeure in ganz unabhängiger Weise so complicirte Aufgaben in ganz gleicher Art gelöst hätten.

Da nun Fr. David zweifellos ein mechanisches Genie war, so denke ich mir Pater Aurelius als seinen gelehrigen und gewiss auch sehr talentvollen Schüler. Wie wir später sehen werden sind Einzelheiten vorhanden,

welche ich auch der eigenen Erfindung des Pater Aurelius zuschreiben will, jedenfalls sind aber wesentliche Aenderungen in der Gruppierung und Wahl der darzustellenden astronomischen Daten gegenüber den David'schen Uhren vorhanden. Daraufhin fühlte er sich auch berechtigt sich den Erfinder dieses Werkes zu nennen.

Durch den Vergleich mit den David'schen Uhren bekommen wir aber auch ein Urtheil über den damaligen Werth unserer Uhr. In den Dimensionen und den astronomischen Daten ähnelt dieselbe der Schwarzenberg-Uhr am meisten, nur ist die Ausstattung eine bescheidenere. Berücksichtigt man aber, dass die Schwarzenberg-Uhr 2700 fl. gekostet hat, so können wir für unser Werk mindestens 1500 und für den Kasten 300 fl. veranschlagen, so dass dieselbe damals sicher auf 2000 fl. bewerthet wurde.

3. Beschreibung des Werkes.

Das ganze Werk gruppirt sich in zwei Theile; den drei Triebwerken, welche zwischen zwei grossen massiven Messingplatten untergebracht sind und dem astronomischen Werke, welches sich zwischen dem Ziffernblatte und der ersten Messingplatte der Triebwerke befindet.

Die drei Triebwerke sind: links für das Spielwerk, in der Mitte für das Gehwerk und rechts für das Schlagwerk. Ihnen entsprechen die drei grossen 12 bis 15 Kilo schweren Gewichte, welche an dicken Darmseiten alle 8 Tage aufgezogen werden. Dieser Theil der Uhr ist sehr solide und kräftig gebaut und ganz in der Weise gearbeitet, wie man es jetzt noch bei grossen Uhren findet. Das Schlagwerk ist ein Repetierwerk und setzt jede Stunde immer zuerst das Spielwerk eine Minute früher ein und nach Ablauf desselben schlägt die Glocke die Stunde ab. Die Hemmungen sind Windfänge, genau

so wie sie noch üblich sind und zeigt die Ausführung eine solche Gleichmässigkeit und Solidität, dass ich sie für die Arbeit eines Fachuhrmachers halte. Dieser Theil des Werkes scheint auch später wiederholt gereinigt worden zu sein, da er auffällig gegen das astronomische Werk abstach.

Wesentlich anders ist der zwischen Zifferblatt und erster Standplatte untergebrachte astronomische Werktheil. Dies ist Dilettantenarbeit und ist insbesondere die Gleichmässigkeit der Zähne an manchen Rädern keine gute, wodurch auch die Bewegungen der Zeiger leiden und sind ausserdem grössere tote Gänge vorhanden, was bei starken Uebersetzungen sehr störend wirkt. Bei fachmännischer Ausführung hingegen müsste auch dieser Theil des Werkes tadellos functioniren.

Das ganze astronomische Räderwerk ist nun theils an der Rückseite und theils an der massiven Standplatte auf Stiften aufgesteckt und nur ab und zu sind kleine Träger für Räder mit Zapfenlagern angebracht. Dieser Theil des Werkes war ungemein vernachlässigt und enthielt auch jene Verbiegungen, welche ich noch dem Transporte vom Jahre 1776 zuschreibe.

Von dem mittleren Triebwerke, dem Gehwerke, geht nun ein Gestänge direct zur obern mittleren Zeituhr, welche noch mit der Sonnenuhr und dem Datumzeiger verbunden ist. Alle andern Zeiger erhalten ihren Antrieb von einer andern Stelle des Gewerkes.

Durch die massive Standplatte ragt nämlich eine einzige Achse des Gehwerkes hindurch, auf welche ein Zahnrad mit 12 Zähnen gekeilt ist. Dieses dreht sich in einer Stunde einmal herum und gibt den Antrieb für alle astronomischen Zeiger; es soll das Stundenrad heissen.

Die Uebertragung von diesem Rade weiter, geschieht durch Vermittlung eines Zwischenrades, welches auf einem Hebel sitzt, den man heranschieben oder wegrücken

kann. Ist der Hebel emporgezogen, so ist die Verbindung des Gehwerkes mit den astronomischen Zeigern aufgehoben und man kann diesen Werktheil beliebig vor und zurück drehen, ohne den Gang der Uhr zu beeinflussen. Es hat dies den grossen Vorthail, dass man sich die Stellungen der Zeiger für beliebige Zeiten vorher oder nachher einstellen und so alle Constellationen, Mondesviertel, Finsternisse etc. beobachten kann. Dreht man das Werk, und zwar geschieht dies an dem Zeiger des kleinen Zifferblattes rechts mit den Wochentagen, dann wieder auf den eben herrschenden Zeitmoment, drückt den Hebel herab, so geht alles wieder seinen richtigen Gang weiter.

Man kann leicht das Schema entwerfen, wie die vier Hauptzeiger des grossen Thierkreisziſferblattes mit dem Stundenrade in Verbindung stehen. Im folgenden Schema sollen immer die Ziffern, welche in einer Reihe nebeneinander stehen, die Zahl der Zähne von Zahnkränzen bedeuten, welche auf derselben Achse sitzen. Von den untereinander geschriebenen Zahlen sollen dann immer jene durch einen Pfeil mit der oberen verbunden werden, welche als Zahnkränze ineinandergreifen.

Es folgen dann aufeinander:

	das Stundenrad	.	12.	
			↓	
	das verrückbare Hebelrad	.	10, 48.	
			↓	
1.	Zwischenrad	.	19, . . . 60, . . .	12.
			↓	
2.	Zwischenrad	.	57, 36.	1. Zwischenrad . 48, 19.
			↓	
3.	Zwischenrad	.	24, 60.	2. Zwischenrad . 18, 22.
			↓	
4.	Zwischenrad	.	67, 6.	Mondrad . 73, 32.
			↓	
Sonnenrad	.	.	157.	1. Zwischenrad . 18, 45.

		↓
2. Zwischenrad	.	72, 18.
		↓
3. Zwischenrad	.	20, 86.
		↓
Apogäumrad	.	88, 62.
		↓
1. Zwischenrad	.	24, 31.
		↓
Knotenrad	.	101.

Es ergeben sich daraus auch sofort die Uebersetzungs-Verhältnisse und kann man da nachsehen wie weit die Zeiten für die Bewegungen der Zeiger eingehalten sind.

Für den Sonnenzeiger folgt als Verhältniß zum Stundenrade:

$$\frac{157}{6} \times \frac{67}{24} \times \frac{60}{36} \times \frac{57}{19} \times \frac{60}{10} \times \frac{48}{12} = 8765.833 \text{ Stunden}$$

oder 365 Tage, 5 Stunden, 50 Min. es sollten aber sein
365 Tage, 5 Stunden, 48 Min. 48 Sec.

Der Zeiger geht also in einem Jahre um 1.2 Min. zu spät und würde dies in 50 Jahren erst eine Stunde und in 1200 Jahren einen Tag ausmachen. Auf dem Thierkreiszifferblatte beträgt diese letztere Abweichung aber weniger als 1 Grad in Länge.

Der Mondzeiger ergibt:

$$\frac{73}{18} \times \frac{22}{19} \times \frac{48}{12} \times \frac{60}{10} \times \frac{48}{12} = 655.7193 \text{ Stunden}$$

oder 27 Tage, 7 St., 43 Min. 9 Sec. es sollten aber sein
27 Tage, 7 St., 43 Min. 5 Sec., also bleibt dieser
Zeiger bei einem tropischen Umlaufe des Mondes um
4 Sec. zurück. Dies würde erst in ca. $67 \frac{1}{3}$ Jahren
eine Differenz von einer Stunde ausmachen, was auf der
Ekliptik gegen $\frac{1}{2}$ Grad in der Länge des Mondes be-
trüge.

Der Apogäumzeiger braucht:

$$\frac{88}{20} \times \frac{86}{18} \times \frac{72}{18} \times \frac{45}{32} = 118.25 \text{ Mondumläufe}$$

oder 8 Jahre, 309 Tage, 19 Stunden und er sollte

8 Jahre, 308 Tage, 15 Stunden brauchen.

Der Zeiger eilt also bei einem Umlaufe um 20 Stunden vor; dies macht ungefähr 0.1 Grad in Länge aus, so dass er erst nach circa 80 Jahren um 1 Grad abweichen würde.

Der Knotenzeiger schliesslich ergibt für seine Umlaufszeit:

$$\frac{101}{24} \times \frac{31}{62} = 2.10417 \text{ Apsidenumläufe} = 163155 \text{ Stund.}$$

oder 18 Jahre, 229 Tage, 16 Stund. und es sollten sein


18 Jahre, 224 Tage, 8 Stund., so dass er nach einem Umlaufe um 5.3 Tage verspätet ist. Dies würde in circa 76 Jahren eine Differenz von 1 Grad in Länge bedeuten.

Man kann also sagen, dass die Zeiger in 100 Jahren erst eben merkbare Abweichungen zeigen werden. Da nun dieselben aber alle nur durch Friction auf ihre Achsenhülsen gesteckt sind, so wird es genügen, wenn man dieselben einmal in dieser Zeit etwas verbessert.

Ich will nun noch zwei Constructionen, welche sich auch in gleicher Weise an den David'schen Uhren vorfinden, besprechen. Es sind dies der Datumzeiger und die Zeitgleichung, welche mit der Declination verbunden ist.

Der Datumzeiger Fig. 1 besitzt ein grosses Zahnrad B auf dessen Achse auch der lange Zeiger, welcher die Tage vom 1. bis 31. zeigt, gesteckt ist. Dieses Rad wird durch ein anderes A., welches sich in 24 Stunden einmal herum dreht, um 12 Uhr Mitternachts stets um einen Zahn weiter geschoben. Die Sperrklinke c verhindert ein Zurückdrehen des Rades B, welches durch die Feder g dies anstrebt. Es rückt nun das Rad so lange täglich um einen Zahn weiter, bis die Nase d, welche nach rückwärts eine scharfe Kante vorstehen hat an die Walze w des Nachbarrades C stösst. In dieser

Stellung zeigt der Zeiger aussen auf 31. Jetzt schlägt die Klinke *d* mit ihrem langen flachen Arme die Sperre *c* an dem Stifte *i* in die Höhe und hält dann der Hebel *b* die Sperrklinke *c* an demselben Stifte *i* ständig



in die Höhe. Dadurch ist das Rad *B* frei und wird es von der aufgewickelten Feder *g* zurückgeschnellt, bis die Nase *e* an den Anschlag *f* stösst. In dieser Stellung

zeigt der Zeiger auf 1. Er ist also nach Ablauf eines Monats von 31 Tagen, auf den 1. zurückgesprungen. Vor dem Zurückspringen hat aber der Stift *h* den Hebel *a* gehoben, wobei ein beweglicher Zahn *k* desselben hinter den nächsten Zahn des Rades *C* gekommen ist. Beim Zurückspringen von *B* reisst dann der Stift *h* den Hebel *a* nach rechts, wobei sein Zahn *k* das Rad *C* um einen Zahn vorschiebt. Das Rad *C* steht nun in Verbindung mit dem kleinen Zeiger des Datumzeigers und weist dieser dann auf den nächsten Monat.

Auf dem Rade *C* sind aber concentrisch mit der Achsenwalze *w* eine Reihe von Stiften eingesetzt. Ist der nächste Monat ein solcher von 30 Tagen, so steht ein Stift der Nase *d* im Wege und sie stösst daher um einen Tag früher an, so dass sich das Zurückspringen auf den 1. und der Monatswechsel bereits am 30. ereignet. Beim folgenden Monat geht die Nase wieder zwischen zwei Stiften hindurch und stösst erst an der Welle *w* an. Vier Stifte sind nun noch weiter vom Centrum des Rades angebracht und zwar drei fast am Rande desselben und einer etwas näher. Es sind dies die drei Februlare der gemeinen Jahre mit 28 Tagen und der vierte ist der Februar des Schaltjahres mit 29 Tagen; darum sind am Datumzeiger die Monate in vier Quadranten wiederholt. Ebenso sind die Stifte am Rade *C* viermal wiederholt, mit der Abweichung des Februarstiftes im Schaltjahre.

Der Mechanismus für die Darstellung der Zeitgleichung und Declination der Sonne, ist in Fig. 2 angegeben. Mit einem Zahnrade *A*, welches sich in einem Jahre einmal herum dreht, sind zwei Schablonen *B* und *C* aus starkem Bleche verbunden. Die Schablone *B* hebt und senkt an der Gleitrolle *r*₁ eine Zahnstange *z*₁, die in einer Führung *cc* nur auf- und abgehen kann. An einer durchgehenden Achse *a*, welche aussen den Zeiger trägt, sitzt ein Trieb, der in die Zahnstange greift. Die Schablone ist nun so geformt, dass die hin- und her-


gehende Zahnstange die Zeigerachse von einer Nullstellung aus nach vor- oder rückwärts im Sinne der positiven oder negativen Zeitgleichung im Jahre bewegt.


Die Schablone C ist nur eine excentrische Scheibe und schiebt dieselbe den Hebelarm H an der Gleitrolle r_2 hin und her, so dass eine kleine Zahnstange z_2 die Zeigerachse b vor- und zurückdreht im Sinne der wachsenden oder abnehmenden Declination der Sonne während eines Jahres.

Das vis à vis liegende Zifferblatt mit der Tag- und Nachtlänge ist mit dem Declinationszeiger parallelgekoppelt, so dass diese Zeiger sich stets parallel bleiben, da ja Sonnenaufgang, Tages- und Nachtlänge für einen bestimmten Ort nur von der Declination der Sonne abhängen.

Wenn auch aus dem Werke das Ingenium Frater David's uns entgegenleuchtet, so müssen wir doch ebenso die Geschicklichkeit, den Fleiss und die Begabung unseres Paters Aurelius bewundern; besonders wenn wir bedenken wie schwierig zur damaligen Zeit bei primitiven und schwer zugänglichen Bildungsmitteln, eine solche Fachkenntnis, wie sie die Construction und Ausführung eines solchen Werkes erfordert, zu erlangen war. Das physikalische Institut kann sich glücklich schätzen im Besitze eines so kostbaren und ingenieusen Kunstwerkes zu sein.

Innsbruck im Februar 1899.






Die 7 Menuete der astronomischen Uhr des Pater Aurelius, vom Jahre 1775.


I. Menueto arioso.



II. Menueto tedesco.




III. Menueto galante.




IV. Paesano.




V. Pastorella.



VI. Gustoso.



VII. Pomposo.



I n h a l t.

A. Vereinsnachrichten.

	Seite
I. Bericht über die im Jahre 1897/98 vom Vereine abgehaltenen Sitzungen	III
Prof. Dr. Hochstetter: Ueber die Schlagadern des Darmkanals der Saurier	III
Prof. Dr. Müller: Ueber das Experiment in den physikalischen Studien der Griechen	V
Prof. Dr. Klemencic: Ueber Contrastfarben	VI
Prof. Dr. Czermak: Einige Aufnahmen aus der Röntgenpraxis	VII
Prof. Dr. Blaas: Ueber Quellen	IX
Prof. Dr. Klemencic: Ueber Telegraphie ohne Draht	X
Prof. Dr. Heider: Ueber einen merkwürdigen Pa- rasiten aus der Gruppe der Trematoden	XII
Prof. Dr. Hammerl: Ueber Transformatoren	XIII
Prof. Dr. Czermak: Ueber die astronomische Uhr des physikalischen Institutes vom Jahre 1775	XV
II. Bericht über die im Jahre 1898/99 vom Vereine ab- gehaltenen Sitzungen	XIX
Prof. Dr. Klemencic: Ueber die Elektrizitätswerke in Tirol und Vorarlberg	XX
Prof. Dr. Heinricher: Ueber das Reviviscenz- und Regenerationsvermögen der Farne	XXI
Prof. Dr. Zehenter: Düngungsversuche	XXIII
Prof. Dr. Hammerl: Ueber die Verflüssigung der Gase der Luft nach Linde	XXIV

	Seite
Prof. Dr. Blaas: Ueber Wasserversorgung und Kanalisation	XXV
Prof. Dr. Lode: Neue Versuche betreffend die Ste- rilisirung des Wassers durch Zusatz von Clorkalk	XXVII
Prof. Dr. Dimmer: Ueber die Sehnervenbahnen .	XXX
III. Verzeichnis der Akademien, Gesellschaften u. s. w.	XXXII
IV. Personalstand des Vereines	XLI

B. Abhandlungen.

Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre: Die hermaphro- diten und gynandromorphen Hymenopteren . . .	1
P. Magnus: Die Erysipheen Tirols	97
Beobachtungen am meteorologischen Observatorium der k. k. Universität Innsbruck im Jahre 1898 .	123
Prof. Dr. P. Czermak: Die astronomische Stand- uhr des physikal. Institutes der k. k. Universität Innsbruck	193

BERICHTE
des
naturwissenschaftlich - medizinischen
VEREINES
in
INNSBRUCK.

XXIV. Jahrgang 1897/98 und 98/99.

INNSBRUCK.
Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung.
1899.



Es wird gebeten, alle Zuschriften und Sendungen an den „Naturwissenschaftlich-medizinischen Verein in Innsbruck“ zu richten.

MBL WHOI Library - Serials



5 WHSE 02748

